

LA RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* NICHEUSE EN LOIRE-ATLANTIQUE : UNE NOUVELLE ESPÈCE POUR LA BRETAGNE

Hubert Dugué
Julien Foucher

INTRODUCTION

La rémiz penduline niche dans les régions méridionales du Paléarctique occidental, de la péninsule Ibérique à la Chine. Son aire de nidification européenne occupe l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, ainsi que la région méditerranéenne (Clergeau & Pascal, 2003). En France, depuis 2007, la rémiz penduline ne niche plus avec certitude qu'en Moselle.

Migrateur régulièrement observé en Pays de la Loire, notamment en Loire-

Atlantique, la rémiz penduline a niché avec certitude dans l'estuaire de la Loire. Des juvéniles ont été capturés sur le camp de baguage de Donges en 2010 et 2012.

MODE DE VIE

La rémiz penduline occupe les dépressions humides et apprécie le voisinage des cours d'eau, des bras morts, des étangs, des canaux et fossés, dans les marais bordés de ripisylves, de fourrés et de bosquets.

Le site de nidification en Loire-Atlantique n'est pas connu avec précision mais les juvéniles ont été capturés au sein d'une vaste roselière.

Les mâles se cantonnent fin mars mais surtout courant avril et se mettent à construire aussitôt leur nid, souvent situé au-dessus de l'eau, de préférence dans un endroit très ombragé. L'espèce est très fidèle à son site de nidification, souvent réoccupé d'une année sur l'autre (Anonyme, 2012). Les données de rémiz penduline en Pays de la Loire sont très rares en période de reproduction mais elle est observée presque chaque année en Loire-Atlantique (estuaire de la Loire, lac de Grand-Lieu, Marais breton, Guérande, etc.), au moment de la migration postnuptiale et en hivernage. Elle fait notamment l'objet de captures régulières sur les camps du Massereau et de Donges : 5 individus en octobre 2007, 9 en octobre 2008, 3 le 30 septembre 2010 et 11 en octobre 2012.

SON STATUT ACTUEL

Les effectifs européens, estimés entre 210 000 et 420 000 couples, sont considérés comme stables (BirdLife International, 2004). En France, sa répartition et ses effectifs semblent fluctuants. Il ne subsisterait plus que 50 couples en Moselle alors que la population nationale était estimée à

environ 150 couples à la fin des années 1990, répartis en Alsace, en Lorraine et en Languedoc-Roussillon (Dubois *et al.*, 2008 ; Anonyme, 2012).

En Loire-Atlantique, aucune mention historique ne fait état de sa reproduction. Les captures de juvéniles en 2010 et 2012, avec un plumage en pousse (présence de fourreaux), attestent d'une reproduction certaine à proximité du site de baguage de Donges. Ces cas demeurent anecdotiques même s'ils renforcent l'intérêt de l'observation d'une femelle sur le lac de Grand-Lieu le 14 juin 2011. Malgré sa mobilité et sa capacité à coloniser de nouveaux sites (Wassmer, 1999), il est peu probable qu'une population pérenne s'installe dans ces secteurs, surtout que les populations les plus proches sont à plusieurs centaines de kilomètres.

CONCLUSION

En danger de disparition en France (BirdLife International, 2012) en raison des faibles effectifs, la rémiz penduline est une acquisition nouvelle pour l'avifaune départementale et régionale. Ces deux cas de reproduction nécessitent la mise en place d'inventaires ciblés dans les années à venir afin d'appréhender au mieux une éventuelle installation et d'envisager des mesures de conservation.



Photo 1 & 2 : juvéniles de rémiz penduline capturés à Donges (Donges - Loire-Atlantique, 27 juillet et 7 août 2012). J. Foucher

BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme, 2012. Rémiz penduline. In *Cahier d'habitat Nature 2000. La documentation française*. Tome 8. Oiseaux. Volume 3 : 200-203
- BirdLife International, 2004. *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. Cambridge, UK, BirdLife International (BirdLife Conservation Series n°12) : 374 p.
- BirdLife International, 2012. Rémiz pendulinus, in IUCN, 2013. *IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2013.1. www.iucnredlist.org
- Clergeau P. & Pascal M., 2003. La Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (Linné, 1758), in Pascal M., Lorvelec O., Vigne J.-D., Keith P. & Clergeau P. (coord.) *Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions*. Institut National de la Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique & Muséum National d'Histoire Naturelle. Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (Direction de la Nature et des Paysages) : 250-251
- Dubois P. J., Le Maréchal P., Olivos G. & Yésou P., 2008. *Nouvel Inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé : 560 p.
- Wassmer B., 1999. La Rémiz penduline *Remiz pendulinus*, nouvelle espèce nicheuse dans l'avifaune d'Alsace : une acquisition durable ? *Nos Oiseaux*, 46-2 : 61-80

Hubert Dugué
(ACROLA)
10, avenue de la paix
44480 Donges

Julien Foucher
(ACROLA)
10, avenue de la paix
44480 Donges
