

En Bref...

Bilan des contrôles de mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* en baie de Douarnenez et dans la région du Conquet pendant l'hivernage 2012-2013

En vue d'obtenir une meilleure connaissance de l'hivernage et la migration de cette espèce, nous effectuons chaque année des lectures de bagues sur deux sites particulièrement attractifs de la pointe de Bretagne.

Voici présentés les résultats de nos lectures effectuées durant l'hivernage 2012-2013.

En baie de Douarnenez, nous totalisons 1176 lectures qui correspondent à 303 bagues différentes. Les pays d'origine se répartissent comme suit :

France (147), Belgique (79), Pays-Bas (8), Allemagne (22), Hongrie (24), Pologne (17), Serbie-Monténégro (3), République Tchèque (1), Lituanie (1) et Espagne (1).

Au Conquet, nous avons réalisé 352 lectures correspondant à 167 oiseaux différents. Leurs origines couvrent 8 pays : France (80), Belgique (42), Pays-Bas (9), Allemagne (22), Hongrie (6), Pologne (4), Serbie-Monténégro (3), République Tchèque (1).

Dans les deux cas, les oiseaux français constituent à peu près la moitié des oiseaux.

Sur le site de la ra du Conquet, les effectifs sont toujours en augmentation, et cet hiver un effectif record de 450 individus a été atteint le 19 novembre 2012.

A. Le Dreff & G. Coulomb



Photo : groupe mixte de mouettes mélanocéphales et de mouettes rieuses (ria du Conquet - Finistère, février 2013). T. Quelennec

Reproduction avec succès du héron pourpré *Ardea purpurea* en Morbihan

Lors d'une visite sur les étangs de Kervran et Kerzine (Plouhinec, 56) le 21 juillet 2013, un juvénile de héron pourpré s'est laissé observer pendant environ 1 heure. L'oiseau présentait un plumage bien avancé, sans duvet apparent, et potentiellement volant. Pourtant, bien que son plumage et la date puissent laisser penser à un individu en dispersion post-nuptiale, la surprise fut grande d'observer un adulte venir le nourrir. Le juvénile s'est essayé à battre des ailes en sautillant, sans succès d'envol. Cette observation laisse raisonnablement penser que le héron pourpré a niché avec succès cette année sur l'étang

de Kervran.

Des individus sont chaque année observés au printemps et en fin d'été sur le secteur. Toutefois, les possibilités d'observations sont très limitées sur les marais, il n'est donc pas étonnant qu'un couple reproducteur puisse y passer inaperçu.

L'habitat est principalement composé d'une phragmitaie non gérée ainsi que de formations d'hélophytes telle que l'iris des marais *Iris pseudacorus*. Les pièces d'eau libre sont en régression dans la logique d'un atterrissement naturel. Ce processus est d'autant plus visible par la présence de quelques saules au cœur de la roselière. L'ensemble est bordé de haies de saules et prunelliers, ainsi que de parcelles

agricoles. La structure paysagère du site laisse supposer une nidification au sol dans la roselière, plutôt que dans un arbre. L'ensemble du site des étangs de Kervran et Kerzine s'étend sur environ 100 hectares.

À l'échelle du département du Morbihan, aucun des atlas régionaux (1970-1975 ; 1980-1985 ; 2004-2008) n'a montré d'indice de nidification pour l'espèce (Guermeur & Monnat, 1980 ; GOB, 2012). Il faut remonter à la fin des années 1950, époque à laquelle « deux oiseaux dont un juvénile présentant encore des traces de duvet furent tués dans les roselières de Lannenec (Lorient, 56) à l'ouverture du 14 juillet » (Guermeur

et Monnat, *op. cit.*).

Guermeur, Y. & Monnat, J-Y., 1980. *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*. SEPNB / COB - Ar Vran, Aurillac : 240 p.

GOB (coord.), 2012. *Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne*. Groupe Ornithologique Breton, Bretagne Vivante-SEPNB, LPO 44, Groupe d'Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor. Delachaux et Niestlé : 512 p.

M. Diraison



Photo : héron pourpré juvénile (Ouganda, juillet 2013). T. Quelennec