

PREMIER CAS DE REPRODUCTION DU COUCOU GEAI *Clamator glandarius* EN LOIRE-ATLANTIQUE

Pascal Bellion

LES FAITS

Le 4 août 2012 Daniel Perdriau observe trois oiseaux nourris par des pies qui l'interpellent sur la commune côtière de La Baule. Après avoir reçu des images, je lui confirme qu'il s'agit de juvéniles de coucou geai. Cette donnée constitue la première preuve de nidification de l'espèce pour la Loire-Atlantique et la plus septentrionale pour la France. La découverte concerne trois juvéniles nourris par un couple de pies bavardes *Pica pica*, aucun adulte de coucou geai n'a été vu à cette époque à proximité. Les jeunes ne fréquentaient pas plus de quatre

jardins au cours de la journée, passant une grande partie de leur temps dissimulés dans la frondaison de robiniers faux-acacia, de pins et de cyprès, attendant les pies pour la becquée. En dehors des moments de nourrissage durant lesquels ils étaient très loquaces, les coucous étaient extrêmement discrets et silencieux. Ils ont été revus ensuite par plusieurs ornithologues locaux jusqu'au 18 août, à chaque fois dans les mêmes conditions de nourrissage par les pies. À cette dernière date les ravitaillements étaient très espacés, les pies ne revenaient donner la becquée pas plus d'une à deux fois par heure. Daniel Perdriau ne les a

plus vus à partir du 19 août et ils n'ont pas été retrouvés par les ornithologues présents sur le secteur.

LE CONTEXTE HORS LOIRE-ATLANTIQUE

En Europe sa présence est limitée au pourtour du bassin méditerranéen. Il en est de même en France où la nidification est limitée à quelques départements du midi (Languedoc, Bouches-du-Rhône principalement) (Dubois *et al.*, 2008). Les cas de nidification en dehors du contexte méditerranéen sont rares. Concernant la région Pays-de-la-Loire, deux autres cas de nidification ont été confirmés en Vendée : un cas en 1992 sur la réserve de la pointe d'Arçay, les jeunes étaient nourris par un couple de corneilles noires *Corvus corone*. L'autre cas concerne deux juvéniles nourris par un couple de pies bavardes du 27 mai au 10 juin 2009 sur la commune de Champagné-les-Marais. En 2012, trois observations se rapportant à cette espèce ont été réalisées en Vendée durant le mois d'avril sur une même commune, concernant peut-être un seul et même individu.

LA SITUATION EN LOIRE-ATLANTIQUE

L'espèce est vue presque tous les ans dans ce département depuis une

Ar Vran (2014) 25-1

dizaine d'années. En Loire-Atlantique, les observations de coucou geai reste très rares mais annuelles depuis 2009, à proximité du littoral. Concernant l'année 2012, un individu est vu le 5 avril à Guérande puis un possible couple, à partir du 26 avril jusqu'au 2 mai, à approximativement cinq kilomètres du site de nidification découvert. Vue la rareté d'une telle observation, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agisse des parents des juvéniles observés. Cependant, la sortie des jeunes du nid fin juillet-début août place la ponte des œufs à la fin juin, ce qui laisse une période de presque deux mois durant laquelle la femelle n'aurait pas pondu. À moins qu'il ne s'agisse d'une seconde ponte ? En 2013, aucun coucou geai n'a été observé en Loire-Atlantique, les très mauvaises conditions météorologiques, au printemps, peuvent expliquer cette absence.

Évènement isolé ou extension de l'aire de nidification sur la façade nord-ouest de l'Atlantique ? L'avenir nous le dira.

REMERCIEMENTS

Merci à Daniel Perdriau pour avoir transmis son observation et pour l'accueil sur place et à André Robert pour avoir relayé l'information. Merci également à Julien Sudraud et Hugo Touzé pour les précisions concernant les observations vendéennes.

BIBLIOGRAPHIE

Dubois P. J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé : 559p.

www.atlas-ornitho.fr
www.faune-loire-atlantique.org/
www.faune-vendee.org/

Pascal Bellion
La Bourassière
49110 Saint-Rémy-en-Mauges
