

Nuz M. & Votier S.C., 2014. Individual differences in searching behaviour and spatial foraging consistency in a central place marine predator. *Oikos*, 123 : 33-40

Pettex E., Bonadonna F., Enstipp M.R., Siorat F. & Grémillet D., 2010. Northern gannets anticipate the spatio-temporal occurrence of their prey. *Journal of Experimental Biology*, 213 : 2365-2371

Provost P. & Bentz G., 2013. Rapport d'activités de la Réserve Naturelle Nationale, LPO

Provost P., 2013. Séminaire oiseaux marins nicheurs, ressources halieutiques et environnement marin du 14 janvier 2013 - Pleumeur-Bodou - RNN des Sept-Iles/LPO. Ar Vran, 24-2 :

Wakefield E.D., Dodey T.W., Bearhop S., Blackburn J., Colhoun K., Davies R., Dwyer R.G., Green J.A., Grémillet D., Jackson A.L., Jessopp M.J., Kane A., Langston R.H.W., Lescroël A., Murray S., Le Nuz M., Patrick S.C., Péron C., Soanes L.M., Wanless S., Votier S.C. & Hamer K.C., 2013. Space partitioning without territoriality in gannets. *Science*, 341-6141 : 68-70

- Présentation 6 -

ADAPTATION DE L'HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* AUX SITES « TRÈS ARTIFICIELS » EN BRETAGNE : ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

Sébastien Nédellec

L'hirondelle de rivage est éclectique sur le choix de son support de nidification. Falaises maritimes, dunes érodées, talus d'arène granitique, carrières sont parmi les sites habituellement utilisés par l'espèce

dans la région. D'autres sites, qualifiés de « très artificiels » par Malher (2003), peuvent également être utilisés, en particulier des supports durs : des drains dans un mur de soutènement ou un quai

bétonné le long d'un cours d'eau et des interstices dans un mur de pierres. À l'examen des données bibliographiques et suite à des observations fortuites ou des recherches spécifiques, il ressort que 33 sites de nidification, répartis en 22

localités (Finistère, Côtes-d'Armor et Morbihan), sont connus à ce jour dans des sites « très artificiels ». À l'échelle nationale, la Bretagne est très probablement la région qui abrite le plus de cas d'adaptation dans ce genre de supports durs.

- Présentation 7 -

LE BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* EN BRETAGNE, SUIVI D'UNE POPULATION EN MER D'IROISE

Bernard Iliou
Benjamin Guyonnet

Le bécasseau violet est une espèce qui hiverne sur l'ensemble du littoral breton. À ce jour peu d'éléments sont disponibles sur la biologie de l'espèce en période hivernale. Un travail appuyé par un programme couleur a été instauré en mer d'Iroise depuis 2008. La démarche a pour objectif

d'accroître les connaissances sur l'origine des populations, la fidélité au site, les rythmes journaliers et le régime alimentaire ainsi que les mouvements entre les diverses populations. À ce jour, plus d'une centaine d'oiseaux ont été marqués.