

bétonné le long d'un cours d'eau et des interstices dans un mur de pierres. À l'examen des données bibliographiques et suite à des observations fortuites ou des recherches spécifiques, il ressort que 33 sites de nidification, répartis en 22

localités (Finistère, Côtes-d'Armor et Morbihan), sont connus à ce jour dans des sites « très artificiels ». À l'échelle nationale, la Bretagne est très probablement la région qui abrite le plus de cas d'adaptation dans ce genre de supports durs.

- Présentation 7 -

LE BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* EN BRETAGNE, SUIVI D'UNE POPULATION EN MER D'IROISE

Bernard Iliou
Benjamin Guyonnet

Le bécasseau violet est une espèce qui hiverne sur l'ensemble du littoral breton. À ce jour peu d'éléments sont disponibles sur la biologie de l'espèce en période hivernale. Un travail appuyé par un programme couleur a été instauré en mer d'Iroise depuis 2008. La démarche a pour objectif

d'accroître les connaissances sur l'origine des populations, la fidélité au site, les rythmes journaliers et le régime alimentaire ainsi que les mouvements entre les diverses populations. À ce jour, plus d'une centaine d'oiseaux ont été marqués.



Photo : bécasseau violet dans les rochers (Finistère, mai 2013). B. Iliou

- Présentation 8 -

AVIFAUNE NICHEUSE DE 3 ZONES AGRICOLES DU NORD FINISTÈRE

Martin Diraison
Thomas Zgirski

INTRODUCTION

Les paysages agricoles dominent largement le panorama breton. 60 % de ce territoire est influencé par

l'agriculture ou plutôt les agricultures. À cela s'ajoute l'intensification des pratiques agricoles associée à la régression des terres cultivées et la perte de 1 % du bocage par an en