



Des bourdons aux couleurs variables

Le fait qu'une même espèce de bourdon puisse présenter plusieurs formes de coloration rend la détermination plus difficile. Même si une forme de coloration domine généralement, il n'est pas rare de trouver l'autre forme. C'est le cas en Loire-Atlantique pour *Bombus terrestris*, *B. hypnorum*, *B. pascuorum*, *B. ruderarius* et *B. sylvarum* (photos ci-dessous et ci-contre à comparer avec

celles des monographies). À côté de cela, il peut aussi exister pour toutes les espèces des aberrations de couleur plus exceptionnelles. Par exemple, *Bombus pratorum* avec les poils noirs au bout de l'abdomen (photo page 83 bas). C'est pourquoi le recours à des critères morphologiques qui ne sont visibles qu'à la loupe binoculaire est souvent nécessaire.■



© G. Mañé



© G. Mañé

Haut : *Bombus terrestris lusitanicus*. Le Pallet (FR44), avril 2011. Nombreux poils roux notamment sur les pattes.
Bas : *Bombus ruderarius montanus*. Blain (FR44), avril 2011. Bandes de poils clairs sur le thorax et l'abdomen.

© G. Mahé



© G. Mahé



© G. Mahé



Haut : *Bombus hypnorum*. Le Loroux-Bottereau (FR44), mai 2011. Thorax à poils noirs.
Milieu gauche : *Bombus pascuorum floralis*. Dréfféac (FR44), août 2007. Nombreux poils noirs sur l'abdomen.

Milieu droit : *Bombus sylvarum nigrescens*. Chéméré (FR44), août 2002. Nombreux poils noirs sur tout le corps.

Bas : *Bombus pratorum*. Pontchâteau (FR44), mai 2011. Bout de l'abdomen à poils noirs.