

AR VRAN - MORBIHAN

Groupe
Ornithologique
Breton

B.P 38 29 281 BREST

Groupe Ornithologique
Breton
Boite Postale 38
29281 BREST



Bretagne Vivante
Bibliothèque S.E.P.N.B.

N°15 ANNEE 1998

Sommaire du numéro 15 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 mars 1997 à 15 novembre 1997	page 5
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 12
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierrre à collier	page 16
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 24
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 30
Activités du G.O.B Morbihan	page 40
Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés, dunes de Plouharnel (56), printemps 1997	page 40
Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés et Chevaliers gambettes gambettes, étier d'Ambon (56), printemps 1997	page 44
Comptages des oiseaux d'eau en rivière de Pénerf, hiver 1997 -1998	page 46
Recherche de l'avifaune nicheuse de la forêt de Camors, printemps 1998	page 50
Note de Terrain	
Observation d'une Bergeronnette citrine (<i>Motacilla citreola</i>) sur l'île Téviec, presqu'île de Quiberon	page 53
Documents	
Comptages WETLANDS INTERNATIONAL	page 55

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 MARS 1997 à 15 NOVEMBRE 1997

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises : Jean-Pierre ARTEL, René BOZEC, Michel CHAUCHEPRAT, Jacques CORBIÈRE, Pierre CORLOU, Eric DÉRIAN, Gwénaél DÉRIAN, Gérard ERMEL, Guillaume EVANNO, Guillaume GÉLINAUD, Jean-Marc GILLIER, Alain GOUBERT, Stéphane GUÉRIN, Loïc HAMET, Bernard ILIOU, Laurent LE GALL, Françoise LEMONNIER, Jean-Luc LEMONNIER, Yann MOUCHEL, Patrick PHILIPPON, Sébastien PROVOST, Thierry QUÉLENNEC, Matthieu QUILLERÉ, Ronan QUILLERÉ, Jacques ROS, Georges SABATIER, Alain TESTARD, Franz URVOAZ. S'ajoutent à cette liste, les deux observateurs L.B et L.D...

Les observateurs de la Société pour l'ÉTUDE et la PROTECTION de la NATURE en BRETAGNE (SÉNÉ) ont également fourni des informations : Jean-Pierre ARTEL, Guillaume EVANNO, Guillaume GÉLINAUD, Jean-Marc GILLIER, Stéphane GUÉRIN, Bernard GUILLEMOT, Bernard HORELLOU, Jean-François ROBIC.

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte L.G.N)	commune effectif		remarques
9005	12/11/1997	Les Forges	78	4	deux adultes construisent un nid, deux autres plus loin branchés

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Il ne reste plus qu'à souhaiter de belles observations hivernales !

AR VRAN MORBIHAN N°15

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeur arctique *Gavia arctica* (1 donnée)

Le premier de la saison est noté à Kerpenhir/Locmariaquer le 19/10/1997.

Plongeur imbrin *Gavia immer* (2 données)

Le 20/10/1997 entre Houat et Hoëdic, 1 individu et le 14/11/1997 à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon un adulte est observé en plumage nuptial.

Plongeur sp (1 donnée)

Le 27/04/1997 à Kerpenhir/Locmariaquer, 2 individus.

Grèbe castagneux *Podiceps ruficollis* (76 données)

De nombreuses données littorales établissent une reproduction certaine :

* un jeune dès le 12/05/1997 à Kerguelen/Larmor-Plage.

* marais de Trély/Béganne, 2 couples avec 1 et 3 jeunes le 12/07.

* 2 couples producteurs de jeunes au marais de Volutraz/Le Tour-du-Parc en juillet.

* encore un nid occupé au lagunage du Hézo le 13/08.

D'autres pièces d'eau accueillent de possibles ou probables nicheurs, dont la carrière de Trémelin/Grand-Champ.

Les rassemblements :

étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon

Date	17/08	21/08	25/08	14/09	04/10
Effectif	40	110	100	20	100

A Pen Mané/Locmiquélic, on note jusqu'à 40 castagneux le 14/09, au Hézo ils sont 95 sur l'étang le 13/10. Nous disposons d'une donnée insulaire : 3 individus le 27/10 au Bois Roc'h à Belle-Île.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (42 données)

Sur l'étang de Coët-Rivas/Kervignac, trois couples ont couvé, un seul a élevé deux jeunes (vus à partir du 15/06/1997).

Un couple a produit trois jeunes sur les étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy (voir AR VRAN - MORBIHAN N°14).

Notons encore 5 couples le 27/03 à l'étang au Duc de Ploërmel et un couple à Pont-Grandic/Noyal le 13/04 et 2 jeunes d'origine non précisée le 25/08 à Saint-Jean/Locoal-Mendon.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (1 donnée)
Entre Houat et Hoëdic, 1 le 20/10/1997.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* (3 données)
Il s'agit d'un (plusieurs ?) individu observé dans la rade de Lorient entre le 15/09/1997 et le 07/10, à Pen Mané/Locmiquélic et sur l'étang du Ter/Ploemeur.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (9 données)
L'espèce est d'abord contactée à Pen en Toul/Larmor-Baden, 2 individus le 18/07/1997 puis sur l'étang du Ter/Ploemeur avec un individu en plumage intermédiaire le 26/07. Le premier est noté sur la rivière d'Etel le 20/08.
En fin de période : 12 à Gâvres le 01/11 et 12 en amont du Drennec/Damgan le 11/11/1997.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (3 données)

Puffin cendré *Calonectris diomeda* (1 donnée)
Le 08/10/1997 au moins 80 individus passent devant Port-Maria / Quiberon, un jour de tempête. Cet oiseau est rarement observé de la côte puisque depuis 1990 le fichier morbihannais du G.O.B ne rapporte qu'un individu, le 12/08/1993 en baie de Vilaine. D'autres Puffins cendrés doivent être visibles plus au large.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (3 données)
Là encore, la saison est fructueuse puisqu'un Puffin fuligineux est observé entre Pénérf/Damgan et Hoëdic le 06/08/1997, un autre à la pointe de Kervoyal/Damgan le 08/09 et un troisième de Port-Maria / Quiberon le 08/10. Les précédentes mentions dans nos actualités remontent au 15/09/1994 à Penvins, 3 oiseaux, et au 22/8/1991 à Hoëdic, 1 oiseau.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (1 donnée)
Par tempête, le 08/10/1997, un grand nombre de Puffins des Anglais est visible de Port-Maria / Quiberon.

Puffin de Yelkouan *Puffinus yelkouan* (9 données)
Un observateur à la pointe de Kervoyal/Damgan entre le 28/06/1997 et le 03/10 note un maximum de 90 individus. Il observe également 3 oiseaux à l'Apothicaierie/Belle-Île le 07/09 puis 15 Puffins de Yelkouan le 31/08 à Beg er Goalenec/Quiberon, 6 individus le même jour à la pointe du Conguel/Quiberon.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (5 données)
Un individu descend la rade de Lorient le 11/05/1997. Le guet à la mer à la pointe de Kervoyal/Damgan en note plus de 50 le 01/07/1997 et au moins 3 le 05/07. A la pointe de Penvins/Sarzeau, le 30/08/1997, 5 O. tempêtes sont observés, entre 16h et 17h, en vol vers le nord-est. Enfin, cette tempête du 08/10 déjà pourvoyeuse de belles observations amène un Océanite tempête à Port-Maria / Quiberon.

Fou de Bassan *Morus bassanus* (16 données)

466 passent en deux heures à la pointe du Conguel/Quiberon le 24/04/1997 vers le nord-ouest.

En fin d'été : Apothicairerie à Belle-Ile, 500 individus passent en une heure vers le nord, le 07/09.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (45 données)

63 individus garnissent encore les mâtures du port militaire à Lorient, le 09/04/1997.

Les retours sont enregistrés en septembre avec 50 environ en rivière d'Etel le 06/09, 150 au port militaire de Lorient le 20/09, puis 39 au barrage d'Arzal le 18/10/1997.

Dortoirs hivernaux : en rivière d'Etel, 295 Grands Cormorans le 02/11 et 480 le 03/11/1997; le 01/11/97, la rade de Lorient totalise 366 Grands Cormorans

Il y a aussi quelques reposoirs dans l'intérieur du Morbihan comme à Saint-Adrien/Saint-Barthélémy avec 16 oiseaux le 29/10/97 dont un oiseau bagué au Danemark qui avait été déjà contrôlé en juin 1996, 35 au dortoir sur les bords de l'Oust, la basse Née/Saint-Marcel, le 09/11.

A Belle-Ile, l'espèce est présente, y compris à proximité des nids de Cormorans huppés.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (3 données)

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (2 données)

1 immature sur la plage du port à Damgan, le 25/08/1997 et 1 à Léveno/Sarzeau, le 2/10/1997.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (90 données)

Nidification : 2 couples probables nicheurs à Beg-Lann/Sarzeau; 25 à 30 couples en colonie mixte au Tour-du-Parc; 1 seul couple à Kerzo/Port-Louis, il produit 3 jeunes volants.

Rassemblements : 63 au marais de Volutraz /Le Tour-du-Parc le 11/07/1997; 57 à Pen Mané/Locmiquélic le 14/09, 70 à Truscat/Sarzeau; 112 à l'Île longue/Larmor-Baden le 20/09; 84 le 13/10 à Bailleron/Saint-Armel.

Héron cendré *Ardea cinerea* (91 données)

Nidification : à Pencadennic/Le Tour-du-Parc, dans la colonie mixte, 10 couples sont installés le 23/03/1997, ils sont 26 le 08/06. Dans la réserve de Quintin/Sarzeau un couple est nicheur probable le 03/05, 3-4 couples à Banaster/Sarzeau le 09/06. A Kerzo/Port-Louis, 12 couples nicheurs produisent environ 20 jeunes à l'envol.

Rassemblements : Boderhaff/Le Tour-du-Parc, 47 le 17/08/1997; Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, 14 le 04/10, le niveau d'eau est ce jour inhabituellement bas; à Kerboulico, ils sont au moins 90 le 17/08; à Quélisoye/Larmor-Plage, 29 le 0/10; 29 à Truscat/Sarzeau le 17/09.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (1 donnée)

4 individus en vol au dessus de Kerplouz/Auray pourraient être d'origine domestique (parc animalier de Branféré ?).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (35 données)

19 à 20 couples s'installent dans la colonie de hérons de Pencadennic/Le Tour-du-Parc. 101 individus au Listy d'en haut/Ambon, le 16/03/1997; le 29/03, Lasné/Saint-Armel, 21 Ibis sacrés dont un oiseau bagué à Grand-Lieu; 121 se regroupent en dortoir au Léveno/Sarzeau le 30/10.

Rassemblements et reproduction sont à suivre, l'espèce a déjà montré sa capacité d'adaptation, d'autres lieux, voire d'autres habitats pourraient à leur tour tenter l'Ibis sacré.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (41 données)

En dehors du Golfe et de la presqu'île de Rhuy : 1 adulte à Kersahu/Gâvres, le 29/03/1997; 1 immature bagué en Allemagne est contrôlé à Pen Mané/Locmiquélic, le 03/10/97.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (30 données)

22 individus le 22/10/197 à Saint-Colombier/Sarzeau.

Un couple se reproduit à Pen Mané/Locmiquélic, il y en a certainement d'autres ailleurs dans le département.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* (1 donnée)

L'individu qui a hiverné au Grand Loc'h/Guidel (voir AR VRAN - MORBIHAN N°14) s'attarde jusqu'au 17/03/1997.

Oie cendrée *Anser anser* (3 données)

Ces trois observations proviennent de Saint-Colombier/SARzeau avec 36 Oies cendrées le 22/10/1997, 2 le 28/10 et une seule le 29/10.

Bernache du Canada *Branta canadensis* (5 données)

Sur la commune de Sarzeau, à Suscinio, elles sont 6 le 03/04/1997 et 3 le 10/04, deux Bernaches du Canada sont observées le 11/05 à l'étang de la Brousse puis 2 le lendemain à Beg Lann, enfin 8 à Saint-Colombier, cette fois en fin d'été, le 01/09/1997.

Bernache cravant *Branta bernicla* (22 données)

Quelques unes sont encore visibles en avril : 8 le 13/04/1997 en rivière de Pénerf.

En octobre, les premiers contingents arrivent dans le Golfe, 970 à Kergoerget/Sarzeau le 01/10/07; en baie de Vilaine 755 Bernaches cravants le 18/10 à Pénestin, 85 en Petite Mer de Gâvres le 19/10 puis 650 le 01/11; 970 en baie de Plouharnel le 28/10/97.

Tadorne de Belon (160 données)

Sur l'ensemble du Morbihan, l'effectif nicheur avoisine les quatre centaines de couples dont trois cent et plus dans le Golfe.

Nous n'avons pas reçu de données de reproduction en provenance de la rivière d'Etel ni de sites franchement intérieurs comme des bassins d'irrigation, de lagunage ou des carrières inondées.

Comptage des Tadornes de Belon dans la réserve SEPNE
de Pen En Toul/Larmor-Baden (mars - novembre 1997)

Date	Effectif	Date	Effectif
22/03/1997	238	03/05/1997	4
28/03/1997	207	12/09/1997	2
06/04/1997	215	19/09/1997	3
06/04/1997	30	16/10/1997	9
08/04/1997	170	16/10/1997	8
08/04/1997	66	17/10/1997	9
12/04/1997	116	18/10/1997	22
13/04/1997	146	20/10/1997	21
14/04/1997	213	25/10/1997	50
16/04/1997	153	27/10/1997	150
16/04/1997	129	28/10/1997	17
22/04/1997	150	31/10/1997	69
26/04/1997	2	05/11/1997	25
27/04/1997	1	12/11/1997	80
03/05/1997	245	13/11/1997	17

Canard siffleur *Anas penelope* (19 données)

Les Canards siffleurs arrivent en nombre à la fin du mois de septembre dans le Golfe : 822 à Kerbodec/Sarzeau, le 25/09/1997 et 1 300 au sud-ouest de Bailleron/Saint-Arme le 30/09.

Ailleurs quelques faibles groupes sont notés, ainsi 10 canards à l'étang de Saint-Jean/Lochal-Mendon, le 04/10/1997, 10 en Petite Mer de Gâvres le 19/10, 10 aussi sur l'étang du Ter le 23/10 jusqu'à un maximum de 32 le 05/11.

Canard chipeau *Anas strepera* (1 donnée)

Un couple est vu sur les marais de Suscinio/Sarzeau, le 23/03/1997.

Chaque année, ou presque, les observations printanières proviennent de la presqu'île de Rhuys (Calzac, la Brousse, Toulvern, Léveno ...) mais aucune reproduction n'est attestée dans la décennie en cours.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (24 données)

Il n'y a pas de données printanières au delà du 13/04/1997, étang du Léveno/Sarzeau, 10 individus. Nous retrouvons les Sarcelles d'hiver dans la première moitié de septembre, il y en a déjà 304 à Saint-Colombier/Sarzeau le 30/09/97.

Ailleurs : étang de Saint-Jean, 15 le 04/10, étang du Pérello/Ploemeur, maximum de 18 le 05/11.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (75 données)

La première reproduction est rapportée de l'étang de Lannéac/Ploemeur le 08/04/1997, un couple accompagne 10 canetons du jour, la dernière provient de Coët-Rivas/Kervignac, le 27/07/97, une femelle et 4 canetons.

Composition des familles de Canard colvert

Morbihan 1997 (Total = 20)

nombre de canetons	Effectif (familles)
4	1
6	3
7	1
8	1
9	1
10	3
12	3
13	1

Comptages des Canards colverts sur la réserve SEPNE de Pen en Toul, mars - novembre 1997

Date	Effectif	Date	Effectif	Date	Effectif
22/03	23	27/04	50	04/07	78
28/03	38	05/05	26	11/07	67
06/04	39	23/05	32	18/07	130
06/04	19	27/05	50	12/09	1
08/04	11	30/05	35	19/09	1
08/04	58	02/06	56	09/10	2
12/04	6	06/06	78	16/10	1
14/04	35	10/06	13	20/10	2
14/04	35	18/06	35	31/10	6
16/04	18	27/06	40		
16/04	14	28/06	27		

Comptages des Canards colverts à Saint-Colombier/Sarzeau, 1997

22/08	23/08	24/08 ouverture de la chasse	25/08	...	01/10
111	810	0	1 100	...	670

Canard pilet *Anas acuta* (11 données)

A Pen en Toul/Larmor-Baden, 2 le 22/03/1997, 1 le 28/03/97, 3 le 06/04, 2 le 08/04, 2 le 23/05.

A Saint-Jean/Lochal-Mendon, 1 mâle et 1 femelle sont présents le 02/06.

Aucune observation estivale ne nous est parvenue. Dès le 17/09/1997, 2 pilets sont signalés à Truscat/Sarzeau, 2 à Saint-Colombier/Sarzeau le 18/09 et ils sont déjà 150 à Kerbodec/Sarzeau, le 25/09.

Il y en a aussi 2 sur l'étang du Ter/Ploemeur, le 22/10 et 2 à Pen en Toul, le 25/10.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (10 données)

Les arrivées sont notées dans la seconde quinzaine de mars : le 19/03/1997, 4 Sarcelles d'été sur la réserve naturelle de Séné, 3 mâles à Pen Mané/Locmiquélic, le 20/03...

Un couple sur un bassin à Bodaval/Sarzeau, le 19/05 ne suffit pas à affirmer une nidification.

Tardivement, 13 femelles passent le 13/11 sur l'étang de Lannénec/Ploemeur.

Canard souchet *Anas clypeata* (19 données)

Un maximum de 15 Canards souchets est observé à Saint-Colombier/Sarzeau, le 23/10/1997. Aucun indice de nidification ne vient relayer ceux de 1994 où deux couples avait couvé à Falguérec/Séné.

Fuligule milouin *Aythya ferina* (9 données)

Les Fuligules milouins réapparaissent dès le 16/10/1997 sur l'étang du Ter/Ploemeur. Ils sont 119 le 04/11 dont 71,5% de mâles et 156 dont 72,5% de mâles le 14/11 sur l'étang au Duc/Vannes.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (9 données)

1 mâle est déjà sur l'étang du Ter/Ploemeur le 16/10/1997 et une femelle au barrage d'Arzal le 18/10.

Macreuse noire *Melanitta nigra* (9 données)

670 Macreuses noires évoluent au large de Bétahon/Ambon, le 05/04/1997; 180 en baie de Vilaine, le 26/04/97 à la pointe de Kervoyal, 200 le 08/10 et 300 le 24/10.

Harle piette *Mergus albellus* (9 données)

Une femelle s'attarde à Pen en Toul/Larmor-Baden jusqu'à l'ouverture de la chasse.

Harle huppé *Mergus serrator* (14 données)

Quelques Harles huppés isolés sont vus à Pen en Toul, Suscinio, l'île longue, la pointe de Kervoyal entre fin mars et fin octobre.

AR VRAN MORBIHAN N°15

Groupe n°2 Des rapaces aux rallidés

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (18données)

A partir du 13/04/1997 des observations sur les communes de Guidel, Cléguer, Sérent, Langonnet, Locoal-Mendon, Landaul, Saint-Laurent, Vannes, Hennebont, Séné et Noyal, surtout d'oiseaux isolés, la dernière intervenant le 19/09/1997.

A Landaul, cependant, deux adultes et un jeune sont repérés.

Milan noir *Milvus migrans* (51 données)

Cette espèce peu représentée bénéficie sans conteste de l'intérêt des observateurs.

Le premier est observé le 18/03/1997, il n'y a plus de données au delà du 07/08/97.

La presqu'île de Rhuys a accueilli au moins 3 couples dont 2 nicheurs; le couple reproducteur de Landaul reste le plus occidental du département, il aura produit un jeune volant.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (51 donnés)

Les observations littorales n'ont, en fait, pas permis de localiser de nombreux couples. Il serait pourtant intéressant de quantifier la reproduction dans le département.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (20 données)

Les couples sont repérés sur des landes et tourbières intérieures (Sérent, Néant-sur-Yvel, Carentoir) ou littorales (Plouhinec, Belle-Ile, Hoëdic).

Au minimum, 6 couples se reproduisent.

Busard cendré *Circus pygargus* (8 données)

Seulement 4 couples nicheurs sont connus, dans les Montagnes Noires et les landes de Campénéac.

Epervier d'Europe (36 données)

Observations urbaines : 1 femelle chasse les hirondelles le 01/08/1997 au centre d'Etel, 1 femelle supposée en août et septembre dans le quartier Nouvelle-Ville/Lorient et encore au port de pêche le 03/10/97, 1 mâle dans le bourg de Limerzel le 02/11.

Buse variable *Buteo buteo* (43 données)

Nidification certaine : Sarzeau, Theix, Belz, Landaul (1 jeune), Surzur.

Nidification possible ou probable : Plouay, Quistinic, Carentoir.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus* (1 donnée)

Un Aigle botté de forme sombre est observé dans les Montagnes Noires entre le 24/04/1997 et le 19/06.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (21 données)

Printemps : 1 oiseau à er Pondic/Landaul, le 27/05/1997 est attaqué par un couple de Buses variables.

Un oiseau effectue des vols de parade au Cranic/Landaul et à l'étang de Saint-Jean/Lochal-Mendon au mois de juin.

A l'automne les secteurs habituels sont fréquentés : entre Noyalo et la rivière de Penerf, il y a entre le 25/08/97 et le 30/10 jusqu'à 3 oiseaux en même temps.

La rivière d'Etel, du 20/08 au 30/09, accueille 1 à 2 Balbuzards pêcheurs.

Par ailleurs : 1 à Pen en Toul/Larmor-Baden le 20/09, 1 sur le Blavet maritime le 24/09.

Faucon crécerelle *Falco tinnuncullus* (27 données)

Nidification :

- 3 couples au moins à la carrière de Trémelin/Plumelin, le 30/03/1997, un couple nichera.
- un couple donne 5 jeunes volants à Kergyst/Vannes, le nid est dans un pin.
- à Sainte-Barbe/Plouharnel, dans une tour en béton, 1 couple a 4 jeunes volants.
- un jeune à peine volant à Quévern/Guidel, autour de l'aire, dans un bosquet au milieu de cultures.
- au Duer/Sarzeau, un couple donne 3 jeunes à l'envol.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (3 données)

- 08/04/1997 Bout du Havre/Erdeven, 1 femelle.
- 08/06/1997 Coët er Lann/Erdeven, 1 femelle se pose dans un landier.
- 20-24/10/1997, Hoëdic, 2 femelles ou juvéniles.

Les deux observations printanières, intéressantes, ne peuvent pas constituer des indices probants de nidification.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (15 données)

Les premiers sont vus le 28/04/1997 à Saint-Aignan et Monteneuf. Un couple s'installe dans la forêt de Quénécen, lieu qui n'était pas signalé dans l'atlas des nicheurs 1980-1985, et au Cranic/Landaul.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (4 données)

- 18/03/1997, Pouldon/Belle-Ile, 1 adulte dans la falaise.
- 09/06/1997, champ de tir/Gâvres, 1 juvénile en vol.
- 21/09/1997, réserve du Duer/Sarzeau, 1 vers le nord.
- 02/11/1997, Erdeven, 1 effectue des piqués dans une bande d'étourneaux.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (1 donnée)

16/03/1997, Kerminihy/Erdeven, 1.

Perdrix grise *Perdix perdix* (5 données)

- 02/04/1997, Sainte Barbe/Plouharnel, 2.
- 03/05/1997, Sainte Barbe/Plouharnel, 1.
- 19/05/1997, Kervanic/Pluvigner, 2.
- 02/06/1997, dunes d'Etel, plusieurs chants au petit matin.
- 09/07/1997, Kervam/Ploemeur, 2.

Caille des blés *Coturnix coturnix* (3 données)

Les données sont rares, même si l'espèce est parfois recherchée : le 30/04/1997 à Kemper/Saint-Jean-Brévelay, 2; le 07/05/97 à Mané Roz/Le Bono 1 et de probables cris de femelles sur le schorre; le 16/06 à la Ville Gleuhuel/Guégon, 1.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (2 données)

- 05/04/1997, dans l'étier d'Ambon, 1 mâle chanteur.
- 31/05/1997, à Cruguellic/Ploemeur, 1 mâle s'enfuit devant l'observateur.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (21 données)

Dès le 31/03/1997, des chants sont entendus au Crucuno/Erdeven. Le Râle d'eau est présent à Hoëdic. Un poussin est vu au Petit Loc'h/Guidel, le 14/05.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* (16 données)

- 16/05/1997, à la carrière de Trémelin/Grand-Champ, 3 couples défendent un territoire.
- 15/07, Tallen/Baud, dans un petit étang, 1 couple et un poussin de quelques semaines.
- 20/07, sur l'étang de Coët-Rivas à Kervignac, 1 juvénile.

Foulque macroule *Fulca atra* (64 données)

Nidification :

- étang de Calzac/Sarzeau, 11/05/1997, 1 adulte et 2 jeunes, 1 adulte et 1 jeune, 1 couple suivi de 4 jeunes et un oiseau couveur.
- étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon, le 13/05, 3 couples accompagnés chacun de 3 jeunes, 1 couple et 5 jeunes.
- étang du Pérello/Ploemeur, le 19/05, 1 adulte et 1 jeune, 1 adulte et 4 jeunes.
- Crucuno/Erdeven, un couple niche, le 20/05.
- étang de la Brousse/Sarzeau, 2 adultes avec, l'un et l'autre, 1 jeune.
- étang du Ter/Ploemeur, le 07/06, 3 poussins et les adultes.
- étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, 2 juvéniles le 21/06.

Rassemblements :

277 sur l'étang du Ter/Ploemeur, le 02/07/1997; 502 et 70 sur deux bassins des marais de Trély/Ambon, le 12/07; 700 à Kervoyal/Damgan, le 31/07 et 890 à Bonnavo/Theix le 13/08

...

Grue cendrée *Grus grus*

(2 données)

Deux observations de Grues cendrées ont été effectuées le même jour en deux points distincts du département : 5 oiseaux (3 adultes et 2 immatures) paissent le 23/10/1997 dans la prairie du Grand Loc'h/Guidel, ils sont visibles jusqu'en fin d'après-midi. Selon des riverains, 12 grues étaient arrivées le matin.

A Hoëdic, un vol de 7 individus s'éloigne vers le sud, il est 17h15.

AR VRAN MORBIHAN N°15

Groupe n°3 De l'Huitrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Jean-Marc Gillier

Huitrier pie *Haematopus ostralegus* (13 données)

Aucune observation entre le 28/04/1997 et le 01/09, aucune nouvelle des reproducteurs de Houat et Belle-Île.

Maximum printanier de 61 le 04/04 à Bétahon/Ambon. A l'automne, 66 le 13/10 à la pointe de Penerf/Damgan, 51 aux Saisies/Larmor-Plage le 15/11. Environ 30 à Hoëdic le 22/10. Dans le Golfe du Morbihan, un seul groupe de 28 individus est noté à la pointe de Bénance/Sarzeau.

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (74 données)

Première observation à Pen en Toul/Larmor-Baden, le 22/03/1997, avec 1 individu.

La population nicheuse est proche du dernier recensement (voir AR VRAN MORBIHAN 12) avec 23-24 couples découverts (sans les marais de Séné) :

Bétahon / Ambon	1 couple
Marais du Trély / Ambon	2 couples
Kersahu / Gâvres	3 couples
Pen en Toul / Larmor-Baden	2 couples
Kerpenhir / Locmariaquer	3 couples
Pen Mané / Locmiquélic	2 couples
Pont Caden / Sarzeau	1 couple
Kerboullico / Sarzeau	1-2 couples
Suscinio / Sarzeau	2 couples.

Maximum de 39 individus le 08/08 dans l'étier de Kerboullico/Sarzeau. Un dernier individu est encore observé 04/10 à Locmiquélic.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (39 données)

Du marais de Pen en Toul/Larmor-Baden provient la majorité des observations. Ce site accueille un maximum de 26 individus le 23/05/1997 et l'installation de six couples reste malheureusement sans suite.

En période de reproduction, 3 puis 4 couples sont observés le 08/04 et le 09/04 à Boderhaff/Le Tour-du-Parc; 1 couveur noté le 29/04 à Kerboullico/Sarzeau n'est pas revu le 19/05; 2 le 11/05 au Duer/Sarzeau; 2 le 26/07 et 7 le 06/07 à Pont-Caden/Sarzeau.

Rassemblement postnuptial de 95 individus à Truscat/Sarzeau le 10/09. Absence entre les 18/09 et 10/11. Premiers hivernants en rivière de Penerf le 11/11 avec 16 individus.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* (14 données)

Deux couples sont cantonnés à Erdeven et Plouharnel. Aucun jeune n'est observé mais le nid du premier couple (Erdeven) est vide le 23/05 alors que les adultes sont présents. Trois individus sont observés à Erdeven le 15/04. Un individu est vu à Plouhinec le 13/04, sans suite, faute de prospection ultérieure.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (23 données)

Première observation de deux individus le 30/03/1997 dans une carrière à Plumelin. 4 à Pen Mané/Locmiquélic constituent le seul "rassemblement" prénuptial.

Une seule nidification a été notée, au port de commerce/Lorient : couveur noté à partir du 03/5 mais la ponte disparaît, elle est remplacée (couveur le 07/06) et trois poussins sont vus avec les adultes le 11/06.

Dernière observation le 30/08, 3 sur le Blavet dans la rade de Lorient.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (26 données)

Aucune donnée entre le 26/05/1997 et le 05/08.

Maximum printanier ou de fin d'hivernage de 74 le 16/03 à la pointe de Bécudo/Sarzeau. Les concentrations les plus importantes sont notées à Penvins/Sarzeau : au moins 300 le 19/08, 450 le 02/09 et 360 le 16/09. Le 02/09 deux individus blessés par du plomb à Banaster/Sarzeau démontrent malheureusement la nécessité de fournir un statut clair à chaque espèce (en France, le Grand Gravelot fait partie des quelques espèces qui ne sont ni chassables ni protégées... presque virtuelles!).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (23 données)

Première observation le 23/03/1997 sur la plage de Penvins/Sarzeau. 12 le 06/04 à Kerminihy/Erdeven, 11 le 11/05 à Penvins/Sarzeau.

Reproduction : sur Erdeven, trois sites avec respectivement deux, un et un couples. A Ambon, deux couples sont cantonnés dont l'un a trois oeufs au 15/06; trois couples se reproduisent à Suscinio/Sarzeau avec respectivement 1, 2 et 3 jeunes le 07/06.

Dernière observation d'un individu le 21/10 à Hoëdic.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (5 données)

Première observation de l'automne le 05/10/1997 à la pointe de Bégüero/Ambon, 2 individus. Un sur Hoëdic les 22 et 23/10. 80 à Pénerf/Damgan le 15/11.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (15 données)

Aucune observation entre le 07/06/1997 et le 05/09.

118 à la pointe de Bécudo/Sarzeau le 16/03, 11 à Pen en Toul/Larmor-Baden le 03/05.

Environ 100 à Linès/Plouhinec le 20/09.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (103 données)

Nidifications certaines :

Bétahon / Ambon	1 couple
Kerouriec / Erdeven	1 couple
Kersahu / Gâvres	3 couples
Grand Loc'h / Guidel	1 couple
Pen Mané / Locmiquélic	2 couples
Sables Blancs / Plouharnel	11 couples (deux sites : 2 et 9 couples)
Suscinio / Sarzeau	1 couple
Le Duer / Sarzeau	1 couple.

Nidifications probables ou possibles :

Etier / Ambon	2-3 couples
Vazen / Belle-Île	1 couple
Antourteau / Belle-Île	1 couple
Kerminihy / Erdeven	2-4 couples
Le Listrec / Locoal-Mendon	1 couple
Kervran / Plouhinec	8 couples
Kerzine / Plouhinec	3 couples
Bodaval / Sarzeau	2 couples
Quintin / Sarzeau	2 couples
Pont Caden / Sarzeau	1 couple
Susciniio / Sarzeau	1 couple
Boderhaff / Le Tour-du-Parc	1-2 couples

Au total, 21 couples nicheurs certains et 25-29 couples nicheurs possibles ou probables.

Premier rassemblement postnuptial de 81 le 26/06 à Pen en Toul/Larmor-Baden. Maximum de 583 individus le 20/10 au même endroit et 425 sur la rivière de Pénerf le 11/11.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (9 données)

Des migrateurs sont observés jusqu'au 11/05/1997. Signalé ensuite à partir du 02/09, avec un petit maximum de 21 à Linès/Plouhinec le 20/09.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (5 données)

Seule donnée printanière : environ 10 en vol le 25/05/1997 (rivière d'Etel). Observé à partir du 02/09 (1 à Penvins/Sarzeau), maximum d'environ 460 le 05/10 au Port de Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon.

Bécasseau minute *Calidris minuta* (9 données)

La migration prénuptiale ne retient qu'un individu le 11/05/1997 au Duer/Sarzeau. En automne, la situation redevient plus normale après le fort passage de 1996 (voir AR VRAN MORBIHAN 13; LAROUSSE, 1998) : les premiers individus sont là fin-juillet (2 le 28 dans les marais de Noyal et 2 le 30 à Boderhaff/Le Tour-de-Parc). Puis six données de septembre avec au maximum 19 le 07/09 et 11 le 20/09 à Pen Mané/Locmiquélic.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (1 donnée)

Une seule donnée d'un individu le 14/04/1997 à Falguérec/Séné.


Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (12 données)

Un petit passage est noté au début de mai : 2 le 03/05/1997 à Pen Mané/Locmiquélic et 6 à Penvins/Sarzzeau le 11/05. Le passage postnuptial débute le 29/08 avec un juvénile à Quélisoye/Larmor-Plage. Un petit maximum est enregistré à Pen en Toul/Larmor-Baden le 10/09 et la dernière donnée est de 3 individus le 03/10.

Bécasseau variable *Calidris alpina* (44 données)

Il n'y a aucune donnée entre les 01/06/1997 et 07/07. Le maximum printanier provient de Pen en Toul/Larmor-Baden, avec 130 le 16/04. Par la suite, les chiffres les plus forts sont enregistrés en fin de période avec l'établissement des hivernants (388 le 05/11 à Pen en Toul et 413 le 11/11 en rivière de Pénerf).

Bécasseaux variables, données printemps-été 1997, Morbihan



Combattant varié *Philomachus pugnax* (24 données)

Le passage est sensible du 28/03/1997 au 16/04 (13 données pour 57 individus cumulés, maximum de 17 le 31/03 à Pen Mané/Locmiquélic). Seulement deux individus sont notés en mai. Deux individus le 12/07 au marais de Trély/Ambon constituent les premiers migrateurs postnuptiaux. Le maximum est de 8 le 22/08 à Brouel/Séné, les derniers datent du 29/10.

Bécassine sourde *Lymnocyrtes minimus* (1 donnée)

Un individu est observé le 04/04/1997 à Pontglaz/Locoal-Mendon.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (36 données)

Les effectifs maximaux sont de la première quinzaine d'avril à Pen en Toul/Larmor-Baden : 32 le 06/04/1997. Aucune donnée n'est enregistrée du 28/04 au 24/08. En automne, maximum de 20 à Falguérec/Séné le 15/09.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (2 données)


1 dans le bois de Saint-Bily/Plaudren le 22/03/1997 et 1 sur Hoëdic le 23/10.

Barge à queue noire *Limosa limosa* (54 données)

Le passage de printemps est bien suivi à Pen en Toul/Larmor-Baden, avec un maximum de 244 le 12/04/1997. En dehors de ce lieu, notons 81 individus à Brouel/Séné le 22/03.

L'observation de 8 individus le 18/06 concerne probablement les premiers migrateurs postnuptiaux.
Aucun indice de reproduction n'est recueilli.

Stationnements prénuptiaux 1997 des Barges à queue noire
à Pen en Toul Larmor-Baden, Morbihan; réserve S.E.P.N.B



Les données sont ensuite régulières à partir du 02/07. Trois lieux retiennent l'essentiel des observations : secteur de Truscot, de Bénance à Saint-Colombier/Sarzeau, du 02/07 au 12/11 avec un maximum de 190 le 12/11; Pen en Toul du 11/07 au 05/11 avec un maximum de 158 le 17/10; rivière de Sarzeau (Boderhaff et le Pont-Neuf/Le Tour-du-Parc) du 27/07 au 19/08 avec un maximum de 80 à cette dernière date.

Barge rousse *Limosa lapponica* (24 données)

La Barge rousse est notée régulièrement jusqu'au 26/04/1997 avec un maximum de 35 individus en baie de Plouharnel le 26/04. Une observation est faite en mai et une en juillet à Pen Mané/Locmiquélic : 2 le 31/05 et 68 le 23/07.

Elle est ensuite observée à partir du 02/09. Le secteur de la rivière de Pénerf/Le Tour-du-Parc retient le plus grand nombre d'individus avec un maximum de 24 au Pont-Neuf/Le Tour du Parc le 09/09 et 29 pour l'ensemble de la rivière le 11/11.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (22 données)

Les migrateurs printaniers sont notés du 20/03/1997 au 17/05 (17 données). Un pic de passage se dessine dans la dernière décade d'avril et les premiers jours de mai : 25 le 20/04 à Larmor/Damgan, 10 dans la baie de Plouharnel le 25/04, 14 sur l'étier d'Ambon/Ambon et 56 au pont de Banaster/Sarzeau le 26/04, 12 à Saint-Pierre/Locmariaquer le 27/04. Une intéressante observation intérieure fait état d'**au moins 40** individus dans un champ le 02/05 à Kervamic/Pluvigner.

Les données postnuptiales du 08/07 au 15/09 sont moins nombreuses en juillet (4 données avec un maximum de 30 en Petite Mer de Gâvres le 28/07) et en septembre (des cris sont entendus à Erdevén le 15/09).

Courlis sp (1 donnée)

100 individus sont notés en soirée à Brec'h le 23/07/1997.

Courlis cendré *Numenius arquata* (20 données)

Aucune donnée entre les 16/04/1997 et 27/07.

Il y a 44 Courlis cendrés en baie de Plouharnel le 13/03. Au Duer - Saint-Colombier/Sarzeau, 241 le 18/09 et 207 le 05/10. En Petite Mer de Gâvres, on en compte 70 le 28/07 et 68 le 04/10; 82 à la pointe de Bégüero/Le Tour-du-Parc le 05/10 et 70 à Pencadenic/Le Tour du Parc le 06/11.

Le 23/10, environ 15 Courlis cendrés sont vus à Hoëdic.

L'individu albinos noté de janvier à mars 1996 (voir AR VRAN MORBIHAN 12) est observé de nouveau le 01/11 sur le même lieu, Pénerf/Damgan.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (17 données)

Aucune donnée avant le 13/04/1997 et entre le 30/04 et le 27/07.

Des isolés sont vus jusqu'au 09/09. Le secteur de Truscat/Sarzeau (Bénance à Saint-Colombier) retient les plus gros effectifs : 6 le 10/09, 35 le 17/09 et le 10/10, 70 le 23/10.

Ailleurs : 28 le 10/09 dans les anciens marais salants de Suscinio (la Brousse/Sarzeau) et 18 au Hézo/Saint-Armel.

A Pen en Toul/Larmor-Baden, 7 au maximum le 18/10.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (86 données)

Aucun rassemblement prénuptial de quelque importance n'est retenu : 27 à Pen en Toul/Larmor-Baden le 22/03 et 35 le 31/05 à Suscinio/Sarzeau.

Des indices de reproduction sont recueillis sur quatre sites :


- | | |
|-------------------------------------|--|
| · Etier d'Ambon/Ambon | 3 couples nicheurs possibles le 17/05 |
| · marais de Bétahon/Le Tour-du-Parc | 1 couple avec jeunes (combien ?) le 29/06 |
| · Boderhaff/Le Tour-du-Parc | 3 couples notés en avril et mai |
| · Kersahu/Gâvres | un couple est cantonné les 31/05 et 19/06. |

Les premiers rassemblements postnuptiaux sont visibles à Pen en Toul fin juin : 19 les 27 et 28/06. Un passage notable prend place dans la troisième décade d'août avec notamment 75 à Saint-Colombier/Sarzeau le 20/08, 30 à Pen en Toul le 21/08 et 171 à Pen Mané/Locmiquélic le 22/08. Ensuite les chiffres les plus importants sont notés à partir de mi-septembre sans pic particulier jusqu'à mi-novembre et l'établissement des hivernants. Retenons 143 le 21/09 à Quélisoye/Larmor-Plage, 110 à la pointe de Bénance/Sarzeau le 10/10 et 108 le 17/10 à Pen en Toul.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (47 données)

Le passage prénuptial est noté du 24/03/1997 au 11/05. Hormis 14 individus le 24/03 à Saint-Colombier/Sarzeau, le marais de Pen en Toul/Larmor-Baden constitue le seul site de stationnements notables avec un maximum de 19 du 06/04 au 16/04.

Données postnuptiales de Chevalier aboyeur, 1997, Morbihan



Le passage postnuptial est observé à partir du 16/07. Un premier pic est repéré dans la troisième décade d'août. Le passage le plus important a lieu cependant en octobre. Maximum de 28 les 18/10 et 05/11 à Pen en Toul.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (23 données)

Des isolés notés ponctuellement jusqu'au 01/05/1997 sont le seul signe d'un passage printanier. Le passage postnuptial commence début juillet avec notamment 5 individus le 08/07 au marais de Voluraz/Le Tour-du-Parc et 7 au marais de Trély/Ambon le 12/07. Ensuite 11 sont notés à Banaster/Sarzeau le 19/08 et 18 individus le 20/09 à Falguérec/Séné constituent l'effectif maximum et, curieusement, la dernière observation de la période.


Chevalier sylvain *Tringa glareola* (2 données)

Deux individus sont observés en juillet : 1 le 12/07/1997 au marais du Trély/Ambon et 1 le 28/07 dans les marais de Noyalo.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (42 données)

Le Chevalier guignette est observé lors du passage prénuptial du 06/04/1997 au 15/05 avec notamment 3 à l'étang de Saint-Jean/Lochal-Mendon et 3 à l'étang du Ter/Ploemeur le 15/05.

Données postnuptiales de Chevalier guignette, 1997, Morbihan



Le passage postnuptial est logiquement plus fourni. Il débute fin juin et se poursuit jusqu'à la fin de septembre avec un pic de passage dans la dernière décade de juillet et des stationnements relativement importants en août (le faible effectif de la deuxième décade de ce mois est probablement dû à la pression d'observation estivale... modérée). Les maxima sont à Truscat/Sarzeau les 28/07 et 20/08 avec respectivement 17 et 25 individus et à Suscinio avec 17 le 06/08.

Deux oiseaux attardés ou débutant leur hivernage sont encore visibles à l'étang au Duc/Ploërmel le 10/11.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* (11 données)

L'espèce n'est pas notée du 12/05/1997 au 01/09. 40 à Penvins/Sarzeau le 02/09, 31 à Locqueltas/Larmor-Plage et 30 sur Hoëdic le 24/10.

BIBLIOGRAPHIE SPECIFIQUE


DUBOIS P.J. & MAHÉO R. (1986). Limicoles nicheurs de France. Ministère de l'Environnement/LPO/BIROE. 291 p + Annexes.

LAROUSSE A. (1998). Afflux de Bécasseaux minutes *Calidris minuta* en France à l'automne 1996. Ornithos 5 (2) : 49-53.

RECTIFICATIFS aux numéros précédents d'AR VRAN MORBIHAN :

A propos du N° 15, page 23, le graphique concernant le Chevalier guignette est remplacé par celui-ci :

Données postnuptiales de Chevalier guignette, 1997, Morbihan



A propos du N° 16, page 28, le Hibou des marais signalé à l'étang de Lannénec date du 08/12/1997 et non du 08/11/1997.

AR VRAN MORBIHAN N°15

Groupe n°4 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Jean-Luc Lemonnier.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (3 données)

Seulement deux oiseaux observés :


- 1 le 31/08/1997 vu au large de Beg er Goallennec / Quiberon,
- 1 juvénile le 22/10/1997 à Hoëdic.

La troisième donnée se rapporte à la pointe de Kervoyal / Damgan où aucun Labbe pomarin n'a été repéré malgré onze séances de guet à la mer entre juillet et octobre.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (15 données)

L'essentiel des données provient de séances régulières de guet à la mer à la pointe de Kervoyal / Damgan :

Labbe parasite, été - automne 1997, pointe de Kervoyal / Damgan, Morbihan



L'espèce est également observée en d'autres points avancés du littoral :

- pointe de Penvins / Sarzeau : 1 en une heure de guet (16 h à 17 h) le 29/08/1997,
- pointe du Conguel / Quiberon : 1 en 45 minutes de guet (9 h 45 à 10 h 30) le 31/08/1997 puis 1 le 09/10.
- dans la rivière de La Trinité-sur-Mer, 1 individu le 07/10.

Remarque : on ajoutera aux données précédentes l'observation d'un Labbe pomarin ou parasite, en vol vers le nord-ouest le 27/04/1997 à la pointe du Conguel / Quiberon, seule mention printanière pour ces deux espèces.

Grand Labbe *Catharacta skua* (1 donnée)

Cette unique donnée concerne un individu vu depuis le Talud / Ploemeur le 24/09/1997.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (7 données)

A l'exception d'un groupe de 10 à 15 oiseaux présent à Suscinio / Sarzeau en avril 1997, les données ne concernent que des oiseaux isolés ou en très petits groupes :

- 2 le 27/05/1997 à Pen en Toul / Larmor-Baden,

- 2 adultes le 13/07/1997 au Grand Huernic / Baden,
- 3 le 16/07/1997 à Birhit / Noyal,
- 1 adulte le 15/10/1997 à l'Ile longue / Larmor-Baden,
- 2 les 21 & 22/10/1997 sur la plage d'Etel.

Mouette pygmée *Larus minutus* (5 données)

Aux cinq données enregistrées entre le 22/02 et le 10/03/1997 (voir AR VRAN - MORBIHAN N°14) s'ajoutent encore quatre données printanières :

- 1 le 19/03/1997 au Petit Loc'h / Guidel,
- 1 adulte ou subadulte le 22/03/1997 à l'étang de Lannéec / Ploemeur,
- 1 le 12/04/1997 à Pen Mané / Locmiquélic,
- 3 (2 adultes et 1 immature de deuxième année) le 26/04/1997 à la pointe de Kervoyal / Damgan.

Enfin, une seule mention pour l'automne :

- 3 adultes et un oiseau de première année le 9/10/1997 à l'étang de Lannéec / Ploemeur.


Mouette de Sabine *Larus sabini* (4 données)

- 1 subadulte le 7/06/1997 à la pointe de Penvins / Sarzeau,
- 1 juvénile le 30/08/1997 vu depuis la même pointe en une heure de guet à la mer,
- entre Pénérif / Damgan et Hoëdic, 30 individus environ le 06/09,
- 1 le 24/10/1997 entre Houat et Hoëdic.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* (49 données)

La plupart des chiffres sont issus des recensements réguliers effectués sur la réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul / Larmor-Baden, où le pic d'effectif est enregistré à 515 oiseaux le 11/07/1997.

Mouette rieuse, mars - novembre 1997, Pen en Toul / Larmor-Baden, Morbihan, réserve S.E.P.N.B.



Si des juvéniles sont notés régulièrement dès le 18/06/1997, il faut retenir l'apparition précoce d'un très jeune oiseau accompagné d'un couples d'adultes le 07/06/1997 sur le marais de Suscinio / Sarzeau.

Sur toute la côte, les premiers rassemblements d'importance ont lieu dès fin juin, début juillet, par exemple :

- le 8/07/1997, un premier rassemblement de 200 individus sur la vasière de Quélisoye / Larmor-Plage,
- 300 le 12/07/1997 en reposoir sur le marais de Trély / Ambon.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* (1 donnée)

L'hivernant de l'étang du Ter / Ploemeur (voir AR VRAN - MORBIHAN N°14) est encore présent le 21/03/1997.

Goéland cendré *Larus canus* (2 données)

Toujours aussi peu de données pour cette espèce !

- 13 le 14/09/1997 au passage de l'île Berder / Larmor-Baden,
- 1 le 31/10/1997 à Pen en Toul / Larmor-Baden.

Goéland brun *Larus fuscus* (31 données)

Retenons pour ce printemps 1997 le chiffre de 33 couples nicheurs sur l'ensemble des ports de Lorient.

Relevons encore les effectifs de 50 adultes présents le 23/06/1997 en ria d'Etel / Locoal-Mendon.

L'observation, le 26/10/1997, à l'étang de Lannénec / Ploemeur, d'un adulte amputé du pied droit semble indiquer que cette espèce n'est pas à l'abri des meurtrissures par engins de pêche.

La seule donnée intérieure provient des étangs de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy où 1 individu est présent le 09/07/1997.

Enfin, la plupart des données sont fournies là encore par les recensements réguliers sur la réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul / Larmor-Baden, fréquentée régulièrement par 1 à 6 oiseaux sur toute la période.

Goéland argenté *Larus argentatus* (9 données)

Environ 600 couples de Goélands argentés nichent sur l'ensemble des ports de Lorient, les constructions de nids ayant été observées à compter du 30/03 ce printemps 1997.

Quelques rassemblements importants sont également notés au cours de cette période :

- 200 individus le 19/05/1997 sur les bassins en arrière de la déchetterie de la Lande du Matz/Sarzeau,
- 1 100 individus le 19/08/1997 sur le lagunage de Damgan et encore 1 010 le 18/09/1997 sur ce même site.

Goéland leucophaea *Larus cachinnans* (1 donnée)

Cette unique (!) observation concerne un individu isolé le 13/08/1997 au lagunage de Saint-Armel.

Goéland marin *Larus marinus*

(6 données)

Les ports de Lorient accueillent 11 couples nicheurs au printemps 1997.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

(3 données)

In extenso :

- 2 adultes en vol vers le nord ouest en deux heures de guet à la mer (10 h à 12 h) le 27/04/1997 à la pointe du Conguel / Quiberon.
- 1 immature le 28/10/1997 à la pointe de Penvins / Sarzeau,
- 2 immatures le 09/11/1997 à Porh Puns / Gâvres durant un fort coup de vent de noroît.


Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

(38 données)

Aucun cas de reproduction n'est mentionné dans ces données morbihannaises.

Les groupes d'oiseaux notés en mars n'excèdent pas la dizaine d'individus. Il faut attendre le 06/04/1997 pour que 50 à 60 Sternes caugeks soient observées ensemble, au-dessus de la barre d'Etel / Erdeven, puis le 08/04/1997 avec 60 individus présents au Fort-Bloqué / Guidel et encore 150 individus à la pointe de Kervoyal / Damgan le 26/04/1997. Le suivi régulier en ce dernier site permet de situer la fin du passage post-nuptial dans la première décade d'octobre :

Sterne caugek, mars - novembre 1997, pointe de Kervoyal / Damgan, Morbihan



La dernière donnée de cette période (1 le 11/11/1997 au Dendec, Damgan / rivière de Pénér) sera certainement suivie d'observations postérieures au 15/11/1997.

Sterne de Dougall *Sterna dougallii* (11 données)

Cette année encore, le passage postnuptial des Sternes de Dougall en Morbihan n'a pu être détecté qu'aux abords des îlots de Larmor-Baden (Berder, Ile longue, er Lannic, Gavrinis) et d'Arzon (Hent Tenn) dans la partie ouest du golfe.

Sterne de Dougall, passage post-nuptial 1997, Golfe du Morbihan

13/08	21/08	31/08	05/09	14/09	27/09
10	11	34	12	15	2
maximum					

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (63 données)

La première donnée de ce printemps est datée du 23/03/1997 avec un oiseau vu à Suscinio / Sarzeau. Il faut attendre le 11/05/1997 pour la première donnée de reproduction : 4 nids au Duer / Sarzeau. On compte ensuite 9 nids sur ce même site le 07/06, date à laquelle y sont observés les 2-3 premiers jeunes.

Dans le golfe du Morbihan, un dénombrement mené le 02/07/1997 avec la S.E.P.N.B. laisse apparaître un bilan plutôt mitigé, les sternes s'installant sur des pontons et des barges d'exploitation ostréicole. Ce recensement a permis de découvrir de très nombreuses pontes dont beaucoup étaient abandonnées ; ainsi dans l'anse de Baden, une barge accueillait 12 pontes pour un seul couple présent. Non loin de là, on pouvait assister aux alarmes insistantes de 11 pierregarins au-dessus... de l'eau, ce qui laisse penser que la barge supportant les nids avait tout simplement été déplacée. Citons encore le cas d'un adulte retrouvé mort, piégé dans un casier de pêche entreposé à 20 cm du nid. La visite de 12 barges ou pontons abritant des nids et répartis entre Irus, la baie de Kerdelan, l'anse de Baden, Reno, l'Ile-aux-Moines et Locmariaquer n'a permis la découverte que de :

- > 51 - 62 couples reproducteurs,
- > 10 poussins vivants âgés de quelques jours ou plusieurs semaines (un seul à l'envol), et 2 poussins morts,
- > d'un nombre considérable d'oeufs hors des nids, notamment dans des cordages.

Rares sont les autres sites où ont été signalés de quelconques indices de reproduction :

- 5 jeunes prennent leur envol le 10/07/1997 au marais de Voluraz / Le Tour du Parc,
 - 1 jeune volant le 26/07/1997 à Quélisoye / Larmor-Plage,
 - 1 jeune volant nourri le 27/07/1997 à Pen Mané / Locmiquélic...
- ... mais ces deux derniers jeunes ne sont vraisemblablement pas nés dans la rade de Lorient.

Pour cette période, les deux dernières observations sont en date du 24/10/1997 et ne concernent que des individus isolés, l'un à Houat, l'autre à Quiberon.

Sterne arctique *Sterna paradisaea* (2 données)

- 1 au moins le 11/05/1997 à la pointe de Penvins / Sarzeau,
- 3 dont 1 immature le 30/08/1997 sur le Blavet / rade de Lorient.

Sterne naine *Sterna albifrons* (6 données)

- 19 adultes le 11/05/1997 à la pointe de Penvins / Sarzeau,
- 4 le 27/05/1997 à Pen en Toul / Larmor-Baden,
- 2 adultes le 01/07/1997 à la pointe de Kervoyal / Damgan,
- 1 le 13/09/1997 au Fort-Bloqué / Guidel,
- 1 juvénile le 21/09/1997 à Kernicol / Theix.

Guifette noire *Chlidonias niger* (8 données)

Toutes les données sont littorales (de Damgan au Blavet) et ne mentionnent jamais plus de deux guifettes. Au printemps, 3 données entre le 17/05 et le 17/06/1997. Le passage post-nuptial est détecté entre le 13/08 et 07/09/1997.

Alcidés sp. (1 donnée)

Le 27/04/1997, deux heures de guet à la mer (10 h à 12 h) à la pointe du Conguel / Quiberon permettent d'enregistrer le passage vers le nord ouest de 55 alcidés, les Pingouins tordas étant plus nombreux que les Guillemots de Troil.

Guillemot de Troil *Uria aalge* (1 donnée)

Un individu est retrouvé mort, pris dans un filet de pêche, au Foso / Saint-Pierre Quiberon le 16/03/1997.

Pingouin torda *Alca torda* (10 données)

Chacune des données ne concerne que des oiseaux isolés ou par deux. L'espèce n'est pas observée du 26/05 au 21/10/1997.

AR VRAN MORBIHAN N°15

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick Philippon

Pigeon biset *Columba livia* (1 donnée)
1 individu le 21/10/1997 à Hoedic

Pigeon colombin *Columba oenas* (4 données)
2 couples paradent à Plumelin le 30/03/1997. 5 sont notés à Sarzeau le 18/10

Pigeon ramier *Columba palumbus* (3 données)
Il serait intéressant de noter les concentrations hivernales

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (1 donnée)

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (12 données)
Une première est arrivée le 18/04/1997 à Ploemeur.....et déjà en parade. Vue et entendue le 26/04 à Séné et Le Tour-du-Parc. Dernière observation notée le 07/08 au Duer / Sarzeau.

Coucou gris *Cuculus canorus* (14 données)
Premiers chants le 30/03/1997 à Plumelin, le 01/04 à Sarzeau. Noté en mai et juin sur l'ensemble du département, dont une forme rousse à Erdeven le 08/06, dernière mention pour la période.

Effraie des clochers *Tyto alba* (12 données)
42% des données concernent des heurts avec véhicules (voies express ou départementales) entre les 18 et 25/03/997. Repérée à Baden, Guidel, Locoal-Mendon, Sarzeau, Vannes...

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (4 données)
Guidel, 1 chanteur le 18/04/1997 à Kermartin, 1 chanteur à Saint-Déron / Ploemeur les 15 et 21/07 et 1 entendue le 13/11/97 au même endroit.

Chouette hulotte *Strix aluco* (8 données)
1 mâle chanteur à Auray le 25/03/1997 et 4 couples sont repérés en quatre lieux d'Arradon le 26/03.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

(6 données)

1 à Pluvigner le 02/05/1997 et 1 juvénile volant nourrit par 1 adulte le 30/06 à Bailleron / Saint-Armel.

Hibou des marais *Asio flammeus*

(6 données)

Le 09/04/1997, 2 individus occupent le site de Sainte-Barbe / Plouharnel. Les données de mai à juillet concernent un individu à chaque fois dans le secteur dunaire de Erdevén (Kerminihy, la Roche Sèche).

Migration observée le 22/10/97 à Hoëdic avec 1 individu.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

(12 données)

En 1995 et 1996, 9 sites avaient été visités en mai et juin : Baud, Brec'h, Bubry, Erdevén, Landévant, Languidic, Larmor-Plage, Ploemeur, Plouhinec.

En 1997, 9 sites s'ajoutent dans la période mai-juillet : Campénéac, Camors et Meucon (déjà connus), Plumergat, Pluvigner, Saint-Avé, Sulniac, Theix et Vannes avec une moyenne de plus de 3 données par site (31 chants).

Martinet noir *Apus apus*

(7 données)

Les premiers sont observés le 12/04/1997 : 4 à Kerouriec / Erdevén et 12 le 13/04 au lagunage de Damgan, puis sur le littoral entre le 16 et le 22/04.

Le 30/07/97, les dernières rondes sont vues à Lorient. (époque « normale de départ »).

En août (le 11) une bande est vue à Etel, chassant les insectes.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

(18 données)

Avant le 01/05/1997 aucune observation sauf à Saint-Barthélémy (étangs de Saint-Adrien) où 1 à 3 individus sont vus. Est-ce la conséquence du froid de 1996 ?

L'espèce n'est pas notée en juin, les données de juillet à novembre (17 dont 6 en novembre) se concentrent sur les sites de Pen en Toul / Larmor-Baden, l'étang du Ter / Ploemeur, le Duer / Sarzeau puis Vannes et Theix.

Huppe fasciée *Upupa epus*

(12 données)

La première est notée le 18/03/1997 à la pointe Saint-Marc / Belle-Ile puis le 23/03 à Caudan.

2 le 13/04 à Quelenec / Noyal et le 06/07 au marais de Trély / Ambon.

1 individu est vu régulièrement du 27/05 jusqu'au 09/06 à Lann-Dourel / Plumergat.

La dernière donnée date du 18/07 à Pen en Toul / Larmor-Baden.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

(1 donnée)

1 en migration à Hoëdic le 23/10/1997. En 1996, 5 observations en septembre et octobre autour d'Auray et à Hoëdic.

Pic vert *Picus viridis* (4 données)

Reproduction constatée à Brec'h et Plouharnel.

Pic noir *Dryocopus martius* (17 données)

Les données se multiplient, en particulier sur la côte.

Les sites forestiers sont occupés et la nidification prouvée : nid et jeune en forêts de Quénécan, de Lanvaux en mai 1997.

Mais encore, dans des bois moins étendus : à Erdeven 1 adulte et 1 jeune le 23/05 à Kéravéon et à Kervam / Ploemeur 1 jeune trouvé mort le 02/06 indiquent une probable reproduction locale

Peut-être en a-t-il été autant à Saint-Jacut-les-pins où 3 individus dont 1 mâle sont vus le 12/06, à Cléguer ? à Landévant ?

Kervignac, Baden et Crac'h voient sans doute des erratiques les 14/09, 18/09/1997 et 07/11.

Pic épeiche *Dendrocopos major* (6 données)

1 loge occupée au Bois d'amour / Plouharnel le 21/05/1997, nicheur à Landaul, Merlevenez...

Pic mar *Dendrocopos medius* (1 donnée)

1 couple alarme en forêt de Quénécan le 25/05/1997.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (12 données)

Noté régulièrement sur la commune de Sarzeau de juin à octobre. Présent sur les communes de Vannes, Brec'h, Ploemeur.

Cochevis huppé *Galerida cristata* (1 donnée)

L'espèce est présente sur toute la période au port de commerce à Lorient

Alouette lulu *Lullula arborea* (4 données)

2 données de chanteurs en mai (Crac'h et Brec'h) et 2 en octobre à Lizio et Sérent

Alouette des champs *Alauda arvensis* (4 données)

La migration est remarquée entre le 18 et le 21/10/1997 à Hoëdic, à Etel et Larmor-Baden.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (16 données)

Les 7 premières vues le sont à l'étang de Lannénec / Ploemeur le 18/03/1997 et à 2 à Kergolay / Belle-Île. A partir du 19/03, elles sont notées partout, en particulier entre le

19 et le 28/03 avec 40 le 27/03 à l'étang au duc / Ploërmel, plusieurs centaines au dessus de l'étang de Lannénec / Ploemeur le 28/03.

La reproduction est notée à la pointe de Kervoyal / Damgan le 28/06, en juillet à la carrière de Baud, Coët-er-Mar / Quistinic, Larmor-Plage.

Dernière observée le 14/09 à Pen en Toul / Larmor-Baden.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (17 données)

Les premières sont notées le 18/03/1997 à Sarzeau, sur site de nidification le 31/03 à Pénerf / Damgan.

Plus de 300 le 11/09 sur les fils à Saint-Déron / Ploemeur et 5 le 02/11 au-dessus des marais de Suscinio.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* (8 données)

Vannes en accueille 8 le 08/04/1997 et la dernière est vue à Hoëdic le 24/10.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (3 données)

1 le 05/04 /1997 à Sérent et une nidification le 26/06 à la Lande du Matz / Sarzeau.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (8 données)

4 chanteurs le 12/06/1997 dans les dunes de Plouharnel.

5 données à partir de septembre avec 50 individus le 06/09 dans le centre de Bangor et un passage sur les dunes de Plouhinec le 20/09, le 21/10 un passage est constaté au-dessus de la ria d'Étel.

Pipit maritime *Anthus petrosus* (2 données)

1 nourrissage le 29/06/1997 à Port-Louis.

Bergeronnette printannière *Motacilla flava* (6 données)

2 le 06/04/1997 à Kerminihiy / Erdeven; notée en juin et juillet à Sarzeau, Larmor-Baden, Le Tour-du-Parc et la dernière le 15/09 à Guidel.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (10 données)

Le long du Scorff à Pont-Callek 5 contacts sont établis le 16/03/1997 sur 2 500 de rivière et 9 contacts dont 3 couples le 14/04 sur 1 200 m.

Elle est aussi notée aux étangs de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy (1 couple vu régulièrement après le 29/04), Pontivy, Camors, Allaire.

Erratisme, passage ou migration fin octobre : les 20/10 à Ploemeur (10), à Hoëdic le 22/10 (1) et à Sarzeau (2) le 24/10.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (12 données)

Nidification à Sarzeau, Saint-Barthélémy en mai

A partir du 13/10/1997 observations de B. de Yarrell à Penvins (1), Larmor-Plage, Hoëdic et plusieurs dizaines mêlées aux B. grises le 02/11 sur 13 km de route entre Kerpape / Ploemeur et Le Pouldu / Guidel.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (1 donnée)

1 chanteur à Kerboulico / Le Tour-du-Parc le 26/04/1997.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (17 données)

Le premier chanteur se fait entendre le 16/03/1997 à Kerminihy / Erdeven puis d'autres sur les sites connus du 25/03 jusqu'au 08/06 (Saint-Armel, Sarzeau, le Tour-du-Parc, Locmiquelic, Gâvres).

Dernière observation à Léveno / Sarzeau le 07/09.

Rougequeue noir *Phoenicurus phoenicurus* (9 données)

7 individus le 17/03/1997 à la Pointe du Talus / Belle-Ile.

50 environ à Hoëdic le 24/10.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (4 données)

1 chanteur le 25/05 /1997 en forêt de Quénécan (Les Forges) puis 3 données migratoires d'un individu à chaque fois à Truscat / Sarzeau le 17/09, réserve de Falguérec / Séné le 19/09 et 1 mâle à Hoëdic le 24/10.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (4 données)

Toutes les données concernent la période de migration, soit entre le 10 et le 28/09/1997 à Ludre / Saint-Armel, Kernaud / Surzur, Pen Mané / Locmiquelic, Truscat / Sarzeau

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (7 données)

Nourrissage dès le 12/04/1997 à Gâvres, des jeunes le 29/06 à Suscinio et 4 couples le 02/11 à Sarzeau dans le marais de Suscinio

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (21 données)

10 couples du 16 au 21/03/1997 sur la côte sud de Belle-Ile, puis le premier à Sainte-Barbe / Plouharnel le 31/03. 1 mâle tué par un véhicule à La Chapelle-Caro (RN 165) le 03/04.

Observé en petit nombre (1 à 2 individus par donnée) sur la côte entre le 08/04 et le 12/06, date à laquelle 2 jeunes sont vus à Plouharnel.

La migration post-nuptiale débute le 26/08 à Le Tour-du-Parc (2), 30 sont vus sur la Côte Sauvage / Quiberon et St-Pierre-Quiberon et 18 à la Pointe du Conguel le 31/08; et 10 le même jour à Erdeven (2 observateurs différents)

Un deuxième passage entre le 24 et le 27/09 à Ploemeur et Saint-Pierre Quiberon, enfin dernier le 13/10 à la Pointe de Penvins.

Traquet du désert *Oenanthe deserti* (1 donnée)
Observation d'un mâle en premier hiver au Vieux Port à Hoëdic le 26/10/1997.

Merle à plastron *Turdus torquatus* (2 données)
Encore Hoëdic ! 3 le 21/10/197 et 2 autres sur un autre site le 23/10.

Grives litorne (*Turdus pilaris*), **mauvis** (*T. iliacus*), **musicienne** (*T. philomelos*)
Les trois espèces sont observées le 24/10/1997 à Hoëdic, à raison de plus de 100 individus pour chacune d'entre elles.

Grive mauvis *Turdus iliacus* (3 données)
Le passage se poursuit en novembre, avec 28 en vol le 06/11 à/1997 à Pencadénié / Le Tour-du-Parc et 90 le 13/11 à Saint-Colombier / Sarzeau.

Grive draine *Turdus viscivorus* (5 données)
En avril et mai nidifications avec jeunes à l'envol à Ploemeur en différents endroits, à Sainte-Hélène en juin.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (17 données)
Du 26/03/1997 au 21/09 les chanteurs sont repérés sur la côte (Auray, Plouharnel, Erdeven, Locol-Mendon, Noyalo, Locmariaquer, Saint-Philibert, Sarzeau, Le Tour-du-Parc)... et à Sainte-Barbe / Plouharnel.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (12 données)
9 données en avril et mai dans les marais de la côte (Guidel, Sarzeau, Plouharnel, Le Tour-du-Parc). Le premier est noté le 02/04/1997 au Grand Mare / Sarzeau.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (1 donnée)
1 chanteur le 25/06/1997 à Saint-Avé.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (9 données)
6 chanteurs égayent une promenade de 750 m le 31/03/1997 à l'étang de Lannénec / Ploemeur, 4 au même endroit le 08/04... mais sur 100 m ; puis 5 chanteurs le 12/04 à Kersahu / Gâvres sur un hectare.
Dernier noté le 07/09 au marais de Léveno / Sarzeau.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (10 données)

3 chanteurs au Lévenio / Sarzeau le 13/04/1997. Entendue en mai et juin à Auray, Sarzeau, à Keranroué / Erdeven 8 chants minimum le 08/06 et à Séné. Un adulte et un jeune le 08/08 au marais de Kerdé / Le Tour-du-Parc.

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* (7 données)

Les Landes Rennaises / Campénéac fournissent la première observation. le 09/05/1997... et le 14/06 un nicheur est repéré à Néant-sur-Yvel. Auray, Larmor-Baden, Séné, Sarzeau hébergent cette espèce.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (10 données)

Notée dans tout le département du 16/03/1997 au 24/10 : Belle-Ile, Campénéac, Erdeven, Gâvres, Gourin, Hoëdic avec 3 individus le 24/10, Landévant, Sérent, Vannes dans les landes du Vincin où 2 jeunes volants accompagnent les reproducteurs.

Fauvette grisette *Sylvia communis* (6 données)

Le premier chant n'est noté que le 07/04/1997 à Rouvran / Le Tour-du-Parc; 2 mâles chantent à Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon le 24/04; 3 chanteurs le 11/05 à Falguérec / Séné.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (3 données)

1 chanteur à Kernaoud en Surzur le 16/04/1997.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (6 données)

Mai voit les jeunes sortir du nid le 19/05/1997 aux Landes du Vincin / Vannes. Les 23 et 24/10 un passage est noté à Hoëdic (plus de 10 individus).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (2 données)

Merci les îles ! 1 individu à Hoëdic le 23/10/1997 et peut-être un à Belle-Île du 25/10 au 3/11.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (5 données)

Passage à Hoëdic du 23/10/1997 au 03/11 : plus de 100 le 23/10; 3 de la sous-espèce *tristis* le 23/10 et 2 le 24/10.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (4 données)

Premier chanteur le 05/04/1997 au lagunage / Damgan.
4 le 10/09 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc et 1 le 23/10 à Hoëdic

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus* (1 donnée)

Passage : 30 le 24/10 à Hoëdic.

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (2 données)

Hoëdic : 1 individu entre les 21 et 23/10/1997. Boderhaff / Le Tour du Parc : 2 le 10/09.

Il n'y a aucune mention d'une reproduction.

Gobemouche noir *Muscicapa hypoleuca* (3 données)

Peu de données pour le passage automnal. En septembre, entre le 10 et 16 1 individu à Bindre / Séné et 3 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc, 1 entre les 21 et 23/10 à Hoëdic.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (7 données)

Pen Mané / Locmiquélic fournit la première donnée : 1 le 31/03/1997 et la reproduction : 1 jeune le 08/07, 7 adultes et juvéniles le 07/08. 6 individus le 22/09 au Petit Loc'h / Guidel; 1 à Kerminihiy / Erdeven et 2 à Léveno / Sarzeau le 31/10.

Mésange nonnette (*Parus palustris*) (2 données); **Mésange noire (*P. ater*)** 3 données); **Mésange bleue (*P. caeruleus*)** (2 données); **Mésange charbonnière *P. major*** (1 donnée).

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (1 donnée)

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (1 donnée)

Nicheur à Beg er Lann / Merlevenez le 29/04/1997.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) (1 donnée); **Pie Bavarde (*Pica pica*)** (1 donnée).

Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (1 donnée)

2 à Belle-Île entre les 25/10/1997 et 03/11.

Choucas des tours *Corvus monedula* (5 données)

3 sites : La Garenne / Vannes avec au moins 12 individus présents régulièrement; Ploeren : 1 couple le 14/04/1997; 21 le 31/10 à Ploemeur.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (2 données)

2 le 02/07/1997 sur l'île Réno / Baden; erratisme de 2 individus à Lizio le 31/10.

Corneille noire *Corvus corone* (5 données)
300 le 30/05/1997 à Meudon / Theix.

Grand Corbeau *Corvus corax* (3 données)
Les couples reproducteurs du Morbihan sont installés à Gourin (1 couple) et à Belle-Île (? couples). Ajoutons 1 couple à Groix.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (3 données)
Premier groupe de jeunes le 13/05/1997 à Tréauray / Auray et un passage très important noté à Erdevén vers Plouhinec le 02/11.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (3 données)
Migration à Hoëdic : 20 le 22/10/1997; plus de 100 le 24/10.

Pinson du nord *Fringilla montifringilla* (3 données)
Premier individus le 18/10/1997 à Larmor-Baden, noté fin octobre à Hoëdic (21 au 24/10) et le 08/11 à Lizio.

Serin cini *Serinus serinus* (5 données)
Des données de mars à mai en presqu'île de Rhuy. 10 du 21 au 24/10 à Hoëdic.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (4 données)
Passage le 21/10/997 à Etel.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (5 données)
Le premier groupe de 25 migrants apparaît à Damgan le 25/09/1997, puis à Larmor-Baden (20 le 20/10) et à Hoëdic (plusieurs groupes du 20 au 24/10).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (5 données)
Erratisme estival ? 2 sites fournissent des données du 12/06/1997 au 10/10 :
· Moustoir-Ac, dans un parc privé boisé à Kerguerh
15 les 12 et 13/06
5-6 le 27/06 et du 04 au 18/07
3 le 10/10.
· Le Faouët : plus de 30 le 19/06 dans le bourg.
A noter la coïncidence des dates entre ces 2 endroits en milieu de juin.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (23 données)
1 chanteur le 25/02/1997 à Pen en Toul / Larmor-Baden..

Un recensement partiel permet de dénombrer 8 couples et 3 chanteurs sur la commune de Ploemeur entre le 15 et 28/04. Les données de mai et juin concernent des couples (Sarzeau, Erdeven).

Hoëdic connaît une fréquentation de 7 à 8 oiseaux entre les 21 et 24/10.

3 le 15/11 à Pencadéniac / Le Tour-du-Parc.

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (3 données)

Toujours noté en couple en mai 1997 (Langonnet, Pluvigner...)

Bruant zizi *Emberiza circlus* (6 données)

Présence d'adultes en mai et juillet 1997 sur les communes de Ploemeur, Sarzeau, Pluvigner.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (8 données)

Passage le 16/03/1997 à Kerminihy / Erdeven avec 3 mâles, puis 1 seul chanteur est noté sur le même site les 06 et 12/04. Présence de chanteurs à Ambon, Saint-Barthélémy, Sarzeau et Vannes entre le 29/06 et le 09/07. 2 à Hoëdic le 23/10

Bruant proyer *Miliaria calandra* (14 données)

Toutes les données proviennent de Belle-Île à compter du 15/03 /1997 où 12 individus sont comptabilisés en 3 endroits (Borgroix, Domois, Kerivlahouen). En Avril, le 16, 8 chanteurs (5 à l'aérodrome de Bangor, 3 en 3 endroits de Sauzon) et 3 chanteurs sur le trajet Le Palais-Les Grands Sables. Seule donnée continentale : 1 à Kervinio / Ploemeur le 16/04. 1 le 23/10 à Hoëdic.

ACTIVITES DU G.O.B MORBIHAN

Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés, dunes de Sainte-Barbe, Plouharnel (56), printemps 1997

Françoise et Jean-Luc LEMONNIER

I - Le site :

- localisation :

- ⇒ commune de Plouharnel, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon (56).
- ⇒ zone dunaire s'étendant entre le hameau de Sainte-Barbe et l'océan (voir carte).

- paysage :

- ⇒ Le site est inclus dans un très long cordon dunaire ancien s'étendant de la ria d'Etel au fort de Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon, soit sur plus de quatorze kilomètres.
- ⇒ Sous le hameau de Sainte-Barbe, la dune présente une large plaine coupée par un rempart de béton datant de la IIème Guerre Mondiale. Cette plaine présente la même végétation rase et très riche en lichens que les dunes de faible hauteur (5 à 10 mètres) qui la cernent.
- ⇒ En sa partie nord-est, le site est bordé de prairies marécageuses peu pâturées et non fauchées.

- site et abords:

D'est en ouest et depuis la route départementale 768 reliant Plouharnel à Quiberon, on rencontre en se dirigeant vers le site retenu :

- ⇒ une fosse de ball-trap,
- ⇒ une décharge municipale ne devant accueillir en théorie que des déchets végétaux et sur laquelle est entretenu en quasi-permanence un feu couvert,
- ⇒ une aire d'aéromodélisme,
- ⇒ la plaine où se reproduisent les vanneaux,
- ⇒ la route menant à la plage,
- ⇒ une zone de tir air-sol.

- délimitation du secteur suivi :

Le secteur est approximativement un triangle délimité...

- ⇒ au nord-ouest, par la route très fréquentée joignant le hameau de Sainte-Barbe à la plage,
- ⇒ au sud-ouest, par le rempart au pied duquel passe un chemin carrossable fréquenté,
- ⇒ au nord-est, par un chemin peu fréquenté reliant le hameau de Sainte-Barbe à la décharge.

Les terrains attenants ont été parcourus à plusieurs reprises et notamment les prairies, mais ces visites n'ayant pas permis de découvrir de vanneaux reproducteurs, la surveillance proprement dite ne s'est appliquée qu'au secteur décrit ci-avant.

- période du suivi :

Entre les mois de février et juillet 1997, le site a fait l'objet de 23 visites, la plupart comprise entre le 31 mars et le 14 mai.

- critères ayant conduit à retenir ce site :

- ⇒ Ce site avait déjà accueilli la reproduction du Vanneau huppé.
- ⇒ Son exiguïté associée à la présence d'un rempart le dominant permet de repérer facilement les oiseaux sans aucun dérangement. La photographie du secteur (page 3) a été prise depuis le point d'observation au sommet du rempart.
- ⇒ Enfin, il est soumis à des dérangements multiples et variés...

II - Bilan de la reproduction :

Le suivi a permis la découverte de douze nids de Vanneau huppé sur ce site de Sainte-Barbe / Plouharnel au printemps 1997 :

nid	découvert le...	taille de la ponte	succès / échec	compléments
1	31/03	4	Ecllosion d'au moins 2 poussins le 25/04 ; cette famille a quitté le site le 30/04.	Un photographe dépose un repère dès le début de la couvaison. Nid très proche de la route. Ex. : 56 min. / 2h15 le 05/04 (σ).
2	02/04	?	Abandon du nid dès le 23/04. Aucun poussin à l'éclosion. Parades et accouplements observés en ce point du site dès le 24/04, aucune nouvelle installation cependant.	Ex. : 43 min. / 1h40 le 06/04, 49 min. / 1h45 le 09/04 (σ).
3	05/04	?	4 poussins le 03/05, non revus ensuite.	Couveurs assidus.
4	02/04	?	Nid d'observation difficile, abandonné dès le 30/04 ; production possible cependant.	
5	31/03	?	4 poussins le 23/04, non revus ensuite.	Repère planté par un ornitho le 31/03. Couveurs assidus.
6	31/03	4	3 poussins le 23/04, tous revus le 24/04 mais sans cesse harcelés par 2 pies. Seulement 2 poussins en vie le 25/04.	
7	31/03	?	2 poussins le 03/05.	Absence "record" d'une heure consécutive le 06/04 pour cause de moto-cross...
8	02/04	?	3 poussins le 23/04, tous revus les 24 & 25/04, mais un seul encore présent les 30/04 et 08/05.	
9	09/04	?	Nid abandonné dès le 30/04 ; production très peu probable.	
10	23/04	?	Ce nid un peu à l'écart de la zone suivie a longtemps été suspecté sans jamais être découvert. Cependant, le 23/04, une femelle entraîne 3 poussins (1 - 2 jours) vers les prairies attenantes.	
11	08/05	?	Nid abandonné dès le 14/05.	
12	08/05	?	Nid abandonné dès le 14/05.	

A compter de la mi-mai les conditions météorologiques se dégradent considérablement avec de fortes précipitations. Peu à peu les vanneaux désertent le site :

Plus un seul poussin n'est observé après le 08/05 y compris dans les prairies attenantes.

Quant aux adultes, seuls 8 fréquentent encore le site le 14/05, 6 le 21/05 et un seul le 28/06.

Il est remarquable qu'à une date comparable, le 29/06/94, 4 adultes et 2 poussins occupaient encore le site.

III - Dérangements des oiseaux :

Les causes de dérangement sur ce site sont multiples et affectent différemment la quiétude des reproducteurs. Toutes les conséquences en sont amplifiées par l'exiguïté de la zone de reproduction :

⇒ tout dérangement, même ponctuel, est souvent ressenti par l'ensemble de la colonie,

⇒ la concentration des oiseaux les rend aisément repérables, tant par les prédateurs que par les personnes fréquentant ce site.

La plupart des causes de perturbations enregistrées au long de ce suivi sont récapitulées ci-après et sont accompagnées d'un exemple ou d'une synthèse des répercussions engendrées :

Aéromodélisme

Les modèles réduits ne survolent jamais la zone de reproduction proprement dite. Sans effets.
Exercices militaires de tirs air-sol La zone étant interdite d'accès lors de ces exercices, il est impossible d'en mesurer les effets.

Passage ou stationnement de véhicules sur les routes et chemins entourant le site
Sans effets.

Passage de piétons sur les routes et chemins entourant le site

Seuls les couveurs les plus proches des voies sont dérangés, quittant le nid sans alarme de quelques minutes à plus d'1/4 d'heure selon l'agitation du groupe de piétons.

Promeneurs traversant le site, présence d'ornithos sur le site

L'envol des couveurs est général et les alarmes nombreuses provoquant souvent un plus long stationnement des piétons dans la zone de reproduction. Les oiseaux restent absents du nid longtemps après la fin du dérangement, cette absence pouvant dépasser une demi-heure.

Photographie

La présence régulière d'observateurs sur le site pourrait bien avoir découragé certains projets concrétisés par la mise en place de repères à proximité immédiate de nids. Ces projets semblent toutefois avoir été reportés sur un site voisin.

Chiens courants

Les intrusions des chiens sont assez régulières sans doute du fait de riverains du site. Le dérangement est bien sûr global. Les oiseaux restent absents du nid longtemps après la fin du dérangement, cette absence pouvant dépasser une demi-heure.

Motocross

Cette pratique semble exceptionnelle et n'a été constatée qu'une fois en périphérie de la zone de reproduction. Bien que cette séance ne se soit pas poursuivie plus de dix minutes, nombre de couveurs ont déserté le site une heure durant.

Prédateurs

Les couveurs ne réagissent pas uniformément au survol du site par un prédateur potentiel : la plupart des couveurs manifeste dans ce cas une légère inquiétude sans s'éloigner du nid, l'attaque éventuelle étant menée par l'autre partenaire. Toutefois, quelques exceptions ont été observées : 25 min. d'abandon du nid suite à une attaque conduite par un couveur sur une Corneille noire, 3 min. pour une Buse variable.

Aucune manifestation belliqueuse n'a été observée à l'encontre des nombreux goélands survolant le site.

Une seule attaque contre un Faucon crécerelle, pourtant reproducteur sur le site (« observatoire »), a été constatée.

Les Pies bavardes discrètes durant la couvaison deviennent omniprésentes sitôt les premières éclosions et semblent être à l'origine de la majeure partie des disparitions de poussins sur le site. Les attaques continuelles des pies accaparent les deux adultes et contribuent certainement à ce qu'aucun deuxième pont ne soit déposé.


Les situations les plus critiques pour les familles de vanneaux sont engendrées par un dérangement humain se cumulant aux attaques des pies.

IV - Site voisin dit des « Sables blancs » :

Ce site est approximativement situé à 3 kilomètres du précédent. Le biotope est sensiblement le même : dune ancienne sensiblement altérée par des infrastructures lourdes : route départementale, voie ferrée, chemin carrossable, terrain de camping, bassins ostréicoles. Ce site s'ouvre sur l'anse de Plouharnel.

Deux nids sont découverts sur ce site :

- ⇒ L'un est occupé au flanc d'une dune ancienne dès le 02/04, le nombre de poussins à l'éclosion est inconnu mais un cadavre de juvénile est découvert à proximité le 01/07.
- ⇒ L'autre est découvert le 21/05 : le couveur est installé sur la crête d'une dune ancienne et est très visible d'un chemin côtier passant à trente mètres. Le 28/06, un affût est découvert à un mètre du nid. Les deux poussins âgés de 3 semaines environ observés le 01/07 au bord d'un bassin ostréicole proche sont cependant vraisemblablement éclos dans ce nid.



Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés et Chevaliers gambettes, étier d'Ambon, Ambon (56), printemps 1997.

Loïc HAMET et Franz URVOAZ

I - Le site :

- localisation :
 - ⇒ commune d'Ambon (56), en sortie d'agglomération, en direction de Damgan.
 - ⇒ partie de l'étier immédiatement située à l'ouest de la route départementale 140.
- paysage :
 - ⇒ Le site est constitué d'un herbu et d'anciens marais salants à l'extrémité amont de la rivière de Pénerf.
 - ⇒ Il est divisé en trois parcelles (16 ha, 14 ha, 20 ha). La première et la plus intéressante se compose de prés salés et d'une mare plus ou moins étendue suivant marées et précipitations. Les deux autres sont d'anciens marais salants, herbeux.
- ⇒ période du suivi :

date et horaire des visites		météo
16/03/1997	08:50 - 09:30	beau temps, ciel nuageux
05/04/1997	09:00 - 10:15	beau temps
26/04/1997	14:35 - 16:00	beau temps, air frais
17/05/1997	13:45 - 16:50	beau temps, orageux
31/05/1997	13:30 - 16:50	beau temps, très chaud, vent fort
15/06/1997	09:30 - 11:30	beau temps, orageux
28/06/1997	09:30 - 10:30	temps gris et couvert

II - Bilan de la reproduction :

II - 1) Vanneau huppé :

Le beau temps du mois de mars a favorisé des accouplements précoces. Cependant, un fort coefficient de marée a provoqué un niveau d'eau trop élevé et l'inondation des nids. Ce que confirme la découverte le 05/04 d'oeufs hors des nids abandonnés et correspondant à une première ponte. L'analyse de deux de ces oeufs abandonnés révèle l'absence d'embryon ce qui permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un début de couvaison.

Malgré l'inondation, un couple de Vanneaux huppés a mené à terme sa ponte puisque quatre jeunes ont été observés le 17/05.

Cette date du 17/05 peut également être considérée comme le début de la ponte de remplacement que deux couples mèneront vraisemblablement à bien, (un seul jeune d'âge correspondant sera observé par la suite, le 15/06).

Si le 28/06, 22 adultes et jeunes de l'année sont observés aux abords de la mare principale qui est de nouveau en eau et neuf autres individus évoluent sur le talus d'un des bassins, la majorité de ces oiseaux n'appartient pas à la population reproductrice de l'étier d'Ambon. En effet, les adultes accompagnés de leurs jeunes nés dans ce biotope vivent en familles isolées et alertent dès l'apparition d'un intrus.

Récapitulatif des observations de Vanneau huppé				
date	nombre de couples min. - max.	nombre d'oeufs	nombre de poussins	remarques
16/03/1997	4			
05/04/1997	2 - 3			2 couples cantonnés, 1 individu observé au delà de la zone d'étude
26/04/1997	3			2 couples nicheurs et un couple paradant
17/05/1997	4	1	4	1 couple avec 4 jeunes (10 jours), 1 couple avec nid à 1 oeuf et deux autres couples
31/05/1997	3 - 4		4	
15/06/1997	3		1	1 couple avec 1 jeune, 2 autres couples avec probablement des jeunes
28/06/1997	2 - 3			aucun jeune observés mais adultes en alerte

II - 2) Chevalier gambette :

La discrétion et la méfiance du Chevalier gambette ne permettent pas d'avancer un nombre de couples nicheurs supérieur à trois.

Une seule fois, un poussin a été observé. En outre, un jeune âgé d'environ une semaine a été retrouvé mort dans un nid.

Un autre nid découvert le 31/05 et comportant quatre oeufs est vide le 28/06. A cette dernière date, le couple cantonné non loin alerte souvent.

Récapitulatif des observations de Chevalier gambette				
date	nombre de couples min. - max.	nombre d'oeufs	nombre de poussins	remarques
16/03/1997	0			
05/04/1997	5 - 6			1 couple observé copulant, les autres individus évoluant dans la mare
26/04/1997	3			alerte de deux individus
17/05/1997	3			
31/05/1997	2 - 3	4		1 couple avec nid à 4 oeufs, 1 autre nid avec 1 poussin (1 semaine) mort
15/06/1997	3	4	1	les 4 oeufs du nid sont proches de l'éclosion, 1 couple avec 1 jeune, 1 troisième couple avec probablement des jeunes
28/06/1997	2 - 3			aucun jeune observés mais adultes en alerte

En conclusion, on avancera que trois couples de Vanneaux huppés et trois couples de Chevaliers gambettes ont niché sur l'étier d'Ambon au printemps 1997 et que des jeunes sont nés pour ces deux espèces.

Seule la parcelle située la plus proche de la route est propice à la reproduction de ces limicoles. Les deux autres ne sont pas favorables du fait d'un niveau d'eau trop élevé et stagnant plus longtemps lors de marées à fort coefficient.

COMPTAGES DES OISEAUX D'EAU EN RIVIERE DE PENERF, HIVER 1997 - 1998

Jean-Luc LEMONNIER

De novembre 1997 à mars 1998, douze observateurs se sont retrouvés en rivière de Pénerf pour un comptage mensuel des oiseaux d'eau. Quarante-cinq espèces ont ainsi été recensées et on trouvera ici les totaux spécifiques mensuels, assortis de quelques commentaires sur les principaux intérêts ornithologiques de cette ria morbihannaise.

I - Le site :

Cette ria située à l'est immédiat du golfe du Morbihan reçoit les eaux de la rivière de Sarzeau, du ruisseau de la Drague et de quelques autres ruisseaux de moindre importance. Son embouchure est resserrée entre les pointes de Pen Cadénic / Le Tour du Parc à l'ouest et de Pénerf / Damgan à l'est. L'estran vaseux est largement utilisé pour la conchyliculture, notamment sur la rive droite aux abords de l'embouchure. Les herbues inondables à marée haute (selon coefficient) bordent la ria jusqu'à huit kilomètres en amont, à Ambon.

Les observateurs se sont répartis sur quatre secteurs ainsi délimités :

- groupe 1 : de Banastère à la rivière de Sarzeau
- groupe 2 : de la rivière de Sarzeau à Ambon
- groupe 3 : d'Ambon à la pointe du Dendec
- groupe 4 : de le Dendec à la pointe de Pénerf

II - Tableau récapitulatif des comptages :

voir les tableaux suivants.

III - Quelques remarques :

> Tous ces comptages ont été effectués à marée basse ou en début de flux.

> Si les chiffres ne révèlent qu'une présence réduite des ardéidés, la rivière de Pénerf se distingue en revanche par l'hivernage de la Spatule blanche, dont les effectifs fluctuants indiquent une grande mobilité au cours de l'hiver.

> Les grandes vasières s'étendant entre Pentès et Port-Croix / Surzur (en zone 3) accueillent régulièrement la majorité des tadornes et des courlis présents sur la rivière. Il est vraisemblable que le principal attrait de ce secteur soit sa tranquillité, du fait de son éloignement de toute voie d'accès. de telles zones paisibles font peut-être maintenant de plus en plus défaut dans le golfe du Morbihan, renforçant ainsi le rôle de sites connexes comme cette ria.

> Les avocettes fréquentent préférentiellement les vasières plus fangeuses proches de l'embouchure. Leur effectif important, notamment le chiffre de 782 individus en janvier 1998 peut être rapproché de totaux régionaux et nationaux (1) :

	rivière de Pénerf	Bretagne sud, de Ouessant à la Loire	France
janvier 1998	782	4079	14992
		Pénerf / Bret. sud = 19,2%	Pénerf / France = 5,2%

- > Ayant de vastes secteurs à couvrir, quelques observateurs ont dû renoncer à dénombrer les laridés ; les chiffres concernant ces espèces sont donc très partiels.
- > Une bande de 300 à 400 Vanneaux huppés semble occuper régulièrement l'herbu de Reniac / Surzur (zone 3). Le faible effectif de cette espèce en janvier peut donc être seulement le reflet de l'oubli de ce secteur lors de ce comptage.
- > Les quelques martins-pêcheurs contactés lors de ces sorties n'ont pas été mentionnés dans le tableau du fait d'absence de consigne préalable concernant leur dénombrement.
- > Un cadavre de Fou de Bassan a été découvert très en amont, à proximité d'Ambon le 25 janvier, sa présence ne s'expliquant que par les violentes tempêtes du début de ce mois.

La rivière de Pénérf est donc le refuge régulier de populations d'oiseaux conséquentes, atteignant pour certaines espèces des seuils non négligeables régionalement (Tadornes de Belon, Courlis cendré, Chevalier gambette) voire nationalement (Avocette élégante). On constate donc que l'équilibre et la quiétude de ces populations ne repose pas sur la seule protection de zones phares voisines, le golfe du Morbihan et la baie de Vilaine. Et une part de notre travail d'ornithologues amateurs consiste à prouver l'intérêt de sites connexes comme cette rivière, par la publication de nos connaissances acquises sur le terrain.

Observations effectuées entre 9h30 et 11h45	NOVEMBRE 11/11/1997					DECEMBRE 14/12/1997					JANVIER 25/01/1998					FEVRIER 22/02/1998					MARS 22/03/1998				
METEO	Ciel nuageux, ventées en fin de matinée					Temps froid, soleil en fin de matinée					Temps froid, léger vent, puis soleil					Bonne temps froid, puis redoux					Temps couvert, froid puis éclaircies				
	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total
Grèbe castagneux	18		2		20	13	8			21	10	5	5		20	3	1			4	2	1			3
Grèbe huppé	1	15	6	35	57	4	3	1	4	12		2	2		4	1	6	9		16			4	2	6
Grèbe esclavon																		1		1					
Grèbe à cou noir	3		12	4	19	15		8	6	29	1	1	9	4	15	2	6	4		12	3	3	2	5	10
Grand Cormoran	4	6	3	1	14	3	3			6		3			3	7	2			9	1	2		4	7
Aigrette garzette	9	3	4	1	17		2	3	1	6	8	13			21	10	14			24	8	7	10	6	31
Héron cendré	1	1	2		4	1	5	1	3	10		3			3	1	15			16		3	1	1	5
Ibis sacré	1				1							15			15		11			11	8	2	1		11
Spatule blanche	17				17	3				3		12			12							10			10
Cygne tuberculé							3			3		5			5		1			1		2			2
Bernache cravant	51				51	170	27	211	36	444	150	256	66	224	696	172	4		105	281	237	26	200	413	876
Tadoue de Belon	7	89	72		168	30	3	343		376		150	332	71	553	26	97	201		324	10	72	262	270	614
Canard colvert																		4		4			2		2
Canard souchet																					18				18
Faligule milouin								10		10															
Faligule morillon													1		1										
Eider à duvet							4		4	8													3		3
Garrot à oeil d'or																5				5	1				1
Harle huppé	9				9				2	2		2	1		3	1	10			11		5	10	9	24
Gallinule poule-d'eau	2				2	3				3	3				3	1				1	2				2
Foulque macroule	191				191			18		18												6			6
Huitrier pie	112				112		11	3	1	15		46		4	50	48	55			103	28	116	7	1	52
Avocette élégante		6	16	8	30		77	244	179	500	34	233	192	323	782	1	203		265	469		11			11
Grand Gravelot	28				28	15			53	68				6	6						150				150
Pluvier doré		59			59		71	202		273			25		25		5			5					

Observations effectuées entre 9h30 et 11h4	NOVEMBRE 11/11/1997					DECEMBRE 14/12/1997					JANVIER 25/01/1998					FEVRIER 22/02/1998					MARS 22/03/1998				
	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Total
Pluvier argenté	2	3	3		8	2	5			7	1	1			2									1	1
Vanneau huppé	15	324	427		766		456	509		965		4	17	20	41		100	310		410			7		7
Bécasseau variable	91	411	413	84	999	40		376	450	866	6	4	80	8	98			23		23	100			27	127
Berge à queue noire		7		1	8						2				2										
Berge rousse			29		29		1	19	1	21		16	4		20		1	1		2					
Courlis ocre																						6		6	
Courlis cendré	24	43	45	32	144	12	47	163	5	227	33	28	93	44	198	5	31	49		85	3	8	47	32	90
Chevalier gambette	10	17	33		60	1	17		55	73	8	40	4	36	88	17	5		64	86	10	13		5	28
Chevalier aboyeur		2			2																				
Chevalier culblanc			1		1	6				6	1		1		2										
Chevalier guignette												1			1										
Tournepierre à collier														5	5									32	32
Mouette mélanocéphale																								1	1
Mouette rieuse		127	27	101	255	7	373			380	182	27		50	259	224	176		400	15	59	130	51	255	
Goéland cendré																			4						
Goéland brun		8		3	11		39			39		2			2	2	2		36		6		6	12	
Goéland argenté		14		9	23	8	7			15	51	32			83		36		43	38	28		75	141	
Goéland marin						2				2	2				2	20	23			6	1		2	9	
Sterne caugek	2	1			3				2	2												2	5	7	
Sterne pierregarin							1			1															
TOTAUX					3108					4411					3020					2886					2560

RECHERCHE DE L'AVIFAUNE NICHEUSE DE LA FORÊT DE CAMORS, PRINTEMPS 1998

Gwénaél DÉRIAN

Les matinées des 26 avril et 24 mai 1998, un dizaine d'observateurs a parcouru la forêt de Camors à la recherche d'indices de reproduction des oiseaux.

Nous avons suivi les allées forestières, entre 8h30 et 10h30.

Le temps était nuageux puis légèrement pluvieux lors de la première sortie, les éclaircies dominaient lors de la seconde.

Les indices retenus, de la simple présence à la reproduction prouvée, sont ceux de la grille publiée dans AR VRAN MORBIHAN N°14. Nous les avons consignés sur des feuilles de 'Relevé de présence et de reproduction d'espèces', l'abondance n'a pas été systématiquement estimée.

Après le nom de l'espèce figurent le plus haut indice obtenu lors de nos deux sorties printanières et le statut qui lui était attribué dans l'atlas "Les oiseaux nicheurs de Bretagne 1980-1985" soit *ONB : reproduction possible, probable ou certaine, absence de l'espèce (=non)*.

Grèbe castagneux : H1; *ONB : non*. Un individu sur une mare trouve longuement refuge dans la végétation.

Héron cendré : H1; *ONB : non*. Un oiseau en vol à la lisière nord de la forêt.

Canard colvert : C3; *ONB : possible*. Un couple intrigué par leur présence surveille les ornithologues dans des allées découvertes, le 26 avril.

Bondrée apivore : H1; *ONB : probable*. Un individu le 24/05.

Busard Saint-Martin : TN14; *ONB : possible*. Un mâle transporte de la nourriture au dessus d'une végétation basse, le 26/04.

Epervier d'Europe : H1; *ONB : certaine*. Une femelle est aperçue le 26/04. Le même jour, mais dans une autre portion de la forêt, une plumée de ramier suggère la présence d'une des espèces d'*Accipiter*.

Buse variable : NO13; *ONB : certaine*. Plusieurs individus ont été contactés à différents endroits. Le 26/04, un couveur est sur l'aire.

Pigeon ramier : C3; *ONB : certaine*. L'espèce est commune. Des couples sont repérés.

Tourterelle des bois : T4; *ONB : probable*. Plusieurs chanteurs sont entendus en différents lieux de la forêt.

Coucou gris : T4; *ONB : probable*.

- Chouette hulotte :** JU12; ONB : *possible*. Le 26/04 un chanteur est entendu ! et le 24/05 trois jeunes hulottes volent et crient dans un autre secteur de la forêt.
- Pic vert :** T4; ONB : *probable*. Différents individus sont contactés, des chants entendus, ici et là dans la forêt.
- Pic noir :** C2; ONB : *non*. Les observateurs l'entendent lors des deux sorties, en des endroits différents. Un individu tambourine sur un pin écorcé le 24/05.
- Pic épeiche :** N6; ONB : *certaine*. Vu et entendu. Un mâle pénètre dans une cavité d' un pin écorcé, le 24/05.
- Pipit des arbres :** P5; ONB : *probable*. A l'occasion des deux sorties, des vols nuptiaux ont pu être constatés.
- Bergeronnette des ruisseaux :** H1; ONB : *probable*. Une seule bergeronnette a été trouvée.
- Troglodyte mignon :** A7; ONB : *certaine*. Il est abondant, chante ou alarme.
- Accenteur mouchet :** C2; ONB : *certaine*. Il chante, ici et là.
- Rougegorge familier :** JU1; ONB : *certaine*. Il est abondant, il chante ou alarme. Des jeunes s'agitent le 24/05.
- Merle noir :** A7; ONB : *certaine*. On entend de nombreux chants et alarmes dans de multiples parcelles de la forêt.
- Grive musicienne :** C2; ONB : *certaine*. Les chanteurs sont abondants.
- Grive draine :** C3; ONB : *certaine*. Plusieurs chanteurs ou couples sont entendus ou observés dans un habitat favorable à la reproduction.
- Hypolaïs polyglotte :** H1; ONB : *probable*. Plusieurs individus sont notés le 24/05.
- Fauvette des jardins :** C2; ONB : *probable*. Il n'y a qu'une mention de chant, le 24/05.
- Fauvette à tête noire :** C2; ONB : *probable*. Il est facile de l'entendre le long des allées, les chanteurs sont rapprochés, ex : 3-4 sur 250 m environ.
- Pouillot siffleur :** C2; ONB : *probable*. Le 26/04, les observateurs entendent un chanteur. On est loin des densités de la proche forêt de Lanvaux (Patrick HAMON in ONB) de 20 à 40 chanteurs le 02/06/1984 !
- Pouillot véloce :** C2; ONB : *certaine*. Sans doute le plus abondant des chanteurs de la forêt.
- Pouillot fitis :** C2; ONB : *probable*. Un seul contact à chaque sortie.
- Roitelet huppé :** C2; ONB : *certaine*. Il est abondant dans des parcelles en résineux, beaucoup moins dans la hêtraie.
- Mésange à longue-queue :** JU12; ONB : *certaine*. Ici et là; des jeunes s'enhardissent sur des branches de pins, le 24/05.
- Mésange nonnette :** H1; ONB : *certaine*. L'espèce est vue une fois.
- Mésange huppée :** C2; ONB : *certaine*. Absente de la hêtraie, elle est abondante ailleurs.
- Mésange bleue :** A7; ONB : *certaine*. Après le P. véloce, c'est l'espèce la plus abondante, notamment dans les hêtres. Nombreuses alarmes.
- Mésange charbonnière :** A7; ONB : *certaine*. Elle chante ou alarme, transporte des matériaux, commune.
- Sittelle torchepot :** C2; ONB : *certaine*. La sittelle serait localisée; elle n'a, en effet, été trouvée que sur un parcours, avec 4 chanteurs.
- Grimpereau des jardins :** C2; ONB : *probable*. Il est peu abondant, plusieurs chanteurs se manifestent cependant sur deux parcours.

<u>Geai des chênes :</u>	A7; ONB : <i>certaine</i> . Il n'est pas abondant.
<u>Corneille noire :</u>	C3; ONB : <i>probable</i> .
<u>Etourneau sansonnet :</u>	H1; ONB : <i>certaine</i> .
<u>Pinson des arbres :</u>	A7; ONB : <i>probable</i> . L'espèce abonde, chants et alarmes.
<u>Bouvreuil pivoine :</u>	C2; ONB : <i>probable</i> . Il est présent mais peu abondant puisqu'un seul chanteur est identifié le 26/04.
<u>Bruant jaune :</u>	C2; ONB : <i>probable</i> . Des chanteurs sont contactés en lisière.

Sans doute, nombre de ces espèces seulement repérées au chant ou par des alarmes frénétiques sont-elles des nicheuses véritables mais c'est la limite de la méthode adoptée de ne saisir que les éléments les plus évidents. Ces deux sorties auront néanmoins permis de prospecter un site intérieur trop négligé, d'y noter 43 espèces nicheuses certaines ou potentielles, d'affirmer la présence du Pic noir dans ce massif forestier et de retrouver le Pouillot siffleur.

La situation de la forêt de Camors, à l'extrémité occidentale des crêtes intérieures du Morbihan, de l'Evel jusqu'à l'Oust, ouvre une longue échappée sur les Landes de Lanvaux dont les aménagements paysagers, à commencer par l'enrésinement, ont certainement apporté des transformations profondes de l'avifaune. N'est-ce pas là qu'une prospection suivie permettrait d'en savoir davantage sur la huppe, la pie-grièche, les busards ou l'autour ?

Les personnes suivantes ont participé aux recherches dans la forêt de Camors et transmis le résultat de leurs observations : Xavier CUCHERAT, Gwénaél DÉRIAN, Jean-Marc GILLIER, Loïc HAMET, Michele et Gilles LE CORRE, Françoise et Jean-Luc LEMONNIER, Yannick ORDUREAU, Franz URVOAZ, X.

NOTE DE TERRAIN

OBSERVATION D'UNE BERGERONNETTE CITRINE (*Motacilla citreola*) SUR L'ÎLE TEVIEC, PRESQU'ÎLE DE QUIBERON

Sébastien PROVOST

LA SITUATION :

Mercredi 13 mai 1998, après-midi ensoleillée et mer très calme propice à une " sortie nature et sport " au large des côtes de Penthievre .

Après trente minutes de trajet en kayak de mer entre le port de Portivy et la petite île de Téviec en face de Penthievre, mes collègues du B.T.S Gestion et Protection de la Nature de Kerplouz et moi-même accostons sur la petite anse sableuse de Téviec.

Un recensement exhaustif des oiseaux nicheurs ou de passage autour de l'île va notamment nous permettre d'observer les Goélants argentés, bruns et marins nicheurs; quelques couples de Cormorans huppés au nid avec leurs jeunes; un couple d'Eider à duvet posé sur un promontoire rocheux ou encore quelques Sternes naines parmi les Caugeks, Pierregarins et alcidés...

OBSERVATION ET IDENTIFICATION :

Mon attention se dirige rapidement vers un passereau en vol au dessus de la colonie de laridés. Sa silhouette et son plumage rappellent une Bergeronnette printanière (longue queue, bec fin, jaune sur les parties inférieures, vol onduleux) mais son cri semble mystérieusement différent de celui de l'espèce citée. Il est longuement répété en vol, la voix paraît plus dure, métallique et grésillante que le "psii" fin caractéristique de la Bergeronnette printanière. J'ai pu retranscrire le cri sous la forme d'un "chriip".

Par la suite, l'oiseau se pose à environ dix mètres devant moi, entre les rochers et zones sableuses bordant l'îlot. Restant assez farouche, il va cependant se montrer en évidence pendant environ dix minutes.

Une première approche conduit rapidement à identifier le motacillidé comme un mâle de Flavéole en raison de sa tête d'une couleur générale jaune vif. Cependant, certaines parties du plumage sont étonnantes !

Les critères les plus marquants se situent au niveau des parties supérieures de l'oiseau. Le manteau et le dos sont gris tandis que deux barres alaires blanches très visibles se dessinent au bout des moyennes et grandes couvertures ! Un contraste très net s'observe ainsi avec l'avant des parties inférieures jaunes; cette couleur s'étend de la tête jusqu'au milieu du ventre.

Or, de mémoire, le manteau et le dos de la Bergeronnette printanière sont verdâtres et l'espèce ne présente pas de double barre alaire si prononcée ? Je m'attarde enfin sur les motifs de la tête; celle-ci présente en effet quelques contrastes, sans doute parce que le gris du manteau monte au niveau de la calotte et que les parotiques teintées de gris-noir ressortent bien sur le reste de la tête jaune vif. A noter que le bec fin et pointu et les pattes assez hautes sont noires.

Instable, la bergeronnette nous quitte en se laissant longuement observer en vol pour disparaître vers l'ouest, derrière la colonie de laridés. Je rejoins la côte en kayak de mer avec mes collègues de B.T.S qui ont eu le plaisir de pêcher jusqu'à huit Lieues jaunes à l'est de l'île Guernic, avec fil et hameçon tout simplement ! J'en arrive presque à oublier l'observation de la bergeronnette car, bien que cela ait effleuré mon esprit, j'ose à peine imaginer qu'il puisse s'agir d'une Bergeronnette citrine, espèce orientale très occasionnelle en Europe de l'ouest et dont mes souvenirs bibliographiques se limitent au mâle et à sa tête uniformément jaune ou encore au jeune, proche d'une jeune printanière.

Ce n'est qu'une fois arrivé à mon domicile que je consulte (nerveusement) le Jonsson. Là, les quelques critères observés une heure auparavant correspondent... et je n'en reviens pas, à une *femelle de Bergeronnette citrine*.

STATUT :

Cette observation, soumise au Comité d'Homologation National, constitue, si la fiche est acceptée, la sixième donnée française et la troisième pour la façade atlantique. Il s'agit de la seconde mention bretonne et d'une première pour le Morbihan.

L'espèce rare ne se trouve pas forcément où on aurait l'idée de la chercher, sur une île de deux hectares et à quelques battements d'ailes d'Hoëdic...

BIBLIOGRAPHIE :

JONSSON L. (1994). Les oiseaux d'Europe. Nathan.

DUBOIS P. J. & le CHN (1996). Les Oiseaux rares en France en 1995. Ornithos (3) 4 : 167.

	Littoral Guliel- Ploemeur + Loc'h	Rade de Lorient	Rivière d'Étel	Littoral Erdeven - Étel	Baie de Quiberon	Golfe du Morbihan	Presqu'île de Rhuys	Baie de Vilaine	Etang de Priziac	Etang au Duc/ Ploërmel	Etangs de Saint- Dolay	Île de Groix	Île d'Hoëdic	TOTAL
Plongeon imbrin												5		5
Plongeon arctique			1											1
Plongeon indéterminé			3		29	3							19	54
Grèbe castagneux	1	53	153		33	58	21	4						323
Grèbe jougris					1									1
Grèbe huppé	5	85	101		26	261	7	29		75	5	15	3	612
Grèbe esclavon			1		1	4	1	1					1	9
Grèbe à cou noir		111	25		47	673	27							883
Grand Cormoran	46	170	88							2	6	12		324
Cormoran huppé	1											30+		31+

DOCUMENTS

Wetlands International

Dénombrement des oiseaux d'eau - Morbihan - Mi-janvier 1998

Coordination : Roger MAHEO

Participants : Jean-Pierre ARTEL, René BOZEC, Jacques CORBIÈRE, Pierre CORLOU, Gwénaél DÉRIAN, J.L. DOURIN, Claudie EVANNO, Guillaume GÉLINAUD, Jean-Marc GILLIER, Bernard ILIOU, Yann LE BOZEC, F. LE CORNOUX, Roger MAHEO, Catherine PICHOT, Réseau ONC-56.

	Littoral Guidel- Ploemeur + Loc'h	Rade de Lorient	Rivière d'Étel	Littoral Erdeven - Étel	Baie de Quiberon	Golfe du Morbihan	Presqu' île de Rhuy	Baie de Vilaine	Etang de Priziac	Etang au Duc/ Ploërmel	Etangs de Saint- Dolay	Île de Groix	Île d'Hoëdic	TOTAL
Héron cendré	1	17	12								1	3		34
Aigrette garzette	3	53	16									5		77
Bernache cravant		1 495	215		1 044	5 200	39	1 160						9 153
Cygne tuberculé		3	2			11								16
Tadorne de Belon		244	404		262	4 350		410					6	5 676
Canard siffleur		68	430			376		34						908
Canard chipeau			1			26	2							29
Sarcelle d'hiver	7		3			1 300	22	31			50+			1413+
Canard colvert	88	235	49	15	5	2 450	42	582	4	330	20+	10		3830+
Canard pilet						636		670						1 306
Canard souchet	6	1				150		70	3					230
Fuligule milouin		10	11			112			87	10				230
Fuligule morillon		152	6			58	2		16		15			249
Fuligule milouinan								1 100						1 100
Eider à duvet					18			5						23
Macreuse noire					55			480						535
Harelde boréale								4						4
Garrot à œil d'or			30			340								370
Harle huppé		12	70		40	1 250	89	21						1 482
Poule d'eau	3	4										2		9
Foulque macroule	33	1 430	765			1 670	235	61	201	58	29			4 482
Huitrier pie	3	90	1	25	596	132	22	844				12	22	1 747
Echasse blanche		1												1

	Littoral Guliel- Ploemeur + Loc'h	Rade de Lorient	Rivière d'Étel	Littoral Erdeven - Étel	Baie de Quiberon	Golfe du Morbihan	Presqu'île de Rhuys	Baie de Vilaine	Etang de Priziac	Etang au Duc/ Ploërmel	Etangs de Saint- Dolay	Île de Groix	Île d'Hoëdic	TOTAL
Avocette		34	1		2	510		1 077						1 624
Vanneau huppé	1 500	760	970		210	4 400		490				30		8 360
Pluvier doré	650	110	111		45	3		95						1 014
Pluvier argenté	4	732	160		312	1 830	40	81				8	1	3 168
Grand Gravelot	100	813	65	8	541	1 142	160	577				45	34	3 485
Gravelot à collier interrompu					2									2
Barge à queue noire						13								13
Barge rousse					25	10		58						93
Courlis cendré	13	91	128		62	440		366					9	1 109
Chevalier arlequin						9								9
Chevalier gambette		127	62		45	141	2	125						502
Chevalier aboyeur		9			2	3	22							36
Chevalier culblanc								1						1
Chevalier guignette		1				4								5
Tournepierre	73	89		3	138	7	59	327				40	50	786
Bécasseau maubèche		30			37	278								345
Bécasseau sanderling	84	175			490							50	45	844
Bécasseau violet	32	1		7	4									44
Bécasseau variable	334	8 600	3 505		3 800	23 100	890	1 435				90	32	41 786

