

AR VRAN - MORBIHAN

Groupe
Ornithologique
Breton

B.P 38 29 281 BREST



N°16 ANNEE 1999

Sommaire du numéro 16 d'AR VRAN MORBIHAN

Sommaire	page 3
Actualités ornithologiques	page 4
Liste des observateurs et transmission des données	page 4
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 1997 à 15 mars 1998	page 5
Groupe 1 des plongeurs aux canards	page 5
Groupe 2 des rapaces aux rallidés	page 15
Groupe 3 de l'Huitrier pie au Tournepierrre à collier	page 17
Groupe 4 des labbes aux alcidés	page 24
Groupe 5 des pigeons aux bruants	page 28
Activités du G.O.B Morbihan	page 35
Un séjour sur l'île d'Hoëdic, octobre 1998	page 35
Notes de terrain	page 37
Observation d'un Torcol fourmillier (<i>Jynx torquilla</i>) à Vannes, 09 et 10 septembre 1998	page 37
L'avifaune des ports de Lorient pendant les saisons de nidification 1997 et 1998	page 38
Documents	page 44
Directive Habitats, Réseau Natura 2000, ZPS et ZICO du Morbihan	page 44

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU MORBIHAN POUR LA PERIODE : 16 NOVEMBRE 1997 à 15 MARS 1998

Liste des observateurs

Ont transmis les données à l'origine de ces actualités morbihannaises : ARTEL Jean-Pierre, BAILLEUL Patrick, BOZEC René, CORBIÈRE Jacques, CORLOU Pierre, CUCHERAT Xavier, DÉRIAN Gwénaél, ERMEL Gérard, EVANNO Guillaume, GÉLINAUD Guillaume, GILLIER Jean-Marc, GUEGUEN Fabrice, GUÉRIN Stéphane, HAMET Loïc, ILIOU Bernard, LEMONNIER Françoise, LEMONNIER Jean-Luc, LESAGER Cyrille, PHILIPPON Patrick, PROVOST Sébastien, QUILLERÉ Ronan, RIVALIN Aurélien, URVOAZ François... sauf erreur ou omission !.

Les observateurs de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SÉNÉ) ont également fourni des informations reprises dans les pages suivantes : BÉNÉAT Yannick, FORTIN Matthieu, GÉLINAUD Guillaume, GUÉRIN Stéphane, HORELLOU Bernard, MARTIN Eric, PROVOST Sébastien.

Les actualités ornithologiques du Groupe Ornithologique Breton (Morbihan) courent sur deux périodes : du 16 mars au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mars.

Les observations sont transmises au coordonnateur morbihannais sur papier ou disquette informatique en respectant l'ordre suivant :

ESPECE ou code	date	lieu-dit (voir carte I.G.N)	commune	effectif	remarques
48005	04/05/1999	Keriel	162	4	un adulte ravitaille trois jeunes dans une lande

Les listes des codes utilisés pour noter les espèces et répertorier les communes sont disponibles aux réunions du G.O.B à Brec'h.

Illustrations : p30 Traquet du désert, Françoise Lemonnier ; p36 Hoëdic, Gérauld Tristant ; p42 Cochevis huppé, Patrick Bailleul.

AR VRAN MORBIHAN N°16

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeur catmarin *Gavia stellata* (6 données)

Le 01/02/1998, au moins 33 Plongeurs catmarins sont observés devant Portivy / Saint-Pierre-Quiberon. La dernière observation est du 22/02.

Plongeur arctique *Gavia arctica* (7 données)

Entre les 10/09/1997 et 03/03/1998. La dernière observation mentionne 3 oiseaux dans la baie de Quiberon.

Plongeur imbrin *Gavia immer* (13 données)

Les données sont deux fois plus nombreuses que l'hiver précédent, entre le 23/11/1997 et le 22/02/1998. Du 23/11/97 au 10/01/98, un, parfois deux Plongeurs imbrins étaient visibles dans le goulet de Ban-Gâvres / Gâvres. Le maximum observé est de 3 à Portivy / Saint-Pierre-Quiberon (1 mazouté) le 11/01.

WETLANDS INTERNATIONAL : 5 à Groix.

Plongeur sp (6 données)

WETLANDS INTERNATIONAL: 29 en baie de Quiberon, 13 à Houat.

Grèbe castagneux *Podiceps ruficollis* (115 données)

Rassemblements : les Grèbes castagneux atteignent leurs effectifs les plus élevés vers le mois de janvier :


- en rivière de Pénerf, 20 le 25/01/1998.
- 12 sur la Réserve Naturelle de Séné le 21/01/98.
- 35 le 23/01 à Pen en Toul / Larmor-Baden.
- 62 à Pen Mané / Locmiquélic le 30/12/1997 et 52 le 10/01.
- 49 sur l'étang de Saint-Jean /. Locoal-Mendon, le 11/01.

Ces groupes sont peu fournis mais un total de 153 Grèbes castagneux était compté dans la rivière d'Etel à la mi-janvier (WETLANDS INTERNATIONAL).

Des chanteurs se manifestent au mois de février : 2 à l'étang de Saint-Jean le 22/02 et 1 le 07/03 à Men Armor / Pénestin.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (85 données)

L'hivernage sur l'étang au Duc / Ploërmel a retenu des effectifs plus importants que l'hiver précédent (maximum 110 le 13/12/1997) :



Grèbes huppés sur l'étang au Duc / Ploërmel (56), octobre 1997 - février 1998

Les premiers comportements reproducteurs sur ce même plan d'eau sont notés le 24/02/1998, avec transport de matériaux ; un couple parade à Bel-Air / Priziac le 08/03 et un autre, très tôt, sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 14/01.

WETLANDS INTERNATIONAL : 261 dans le Golfe du Morbihan, 101 dans la rivière d'Étel.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (2 données)

- pointe du Conguel / Quiberon, 1 individu le 12/01/1998.
- devant Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon, un adulte le 01/02.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* (14 données)

Entre le 23/11/1997 et le 08/03/1998 c'est un total de 40 Grèbes esclavons qui est cumulé dans les observations, avec pour maximum 8 le 21/12/97 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon et 8 dans la rivière de Pénérf le 08/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 9 pour l'ensemble du Morbihan.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (47 données)

Les comptages hivernaux ont permis de compter entre 10 et 29 Grèbes à cou noir dans la rivière de Pénérf. Des individus isolés ou par petits groupes sont repérés tout le long de la côte : 26 le 29/11/1997 à Ban-Gâvres / Gâvres, 23 dans la rivière d'Étel le 26/01/1998, 20 sur la Réserve Naturelle de Séné le 26/02.

Des individus en acquisition de plumage nuptial sont déjà observés le 22/02 à Saint-Guillaume / Plouhinec.

WETLANDS INTERNATIONAL : 883 au total dont 673 dans le Golfe du Morbihan et un peu commun recensement de 111 dans la rade de Lorient.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (3 données)

Seuls des cadavres sont mentionnés.

Océanite sp (1 donnée)
10 oiseaux à Penvins / Sarzeau le 03/01/1998.

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (3 données)
 · à la pointe de Penvins / Sarzeau, le 05/01/1998, 5 individus.
 · de Banastère / Le Tour-du-Parc, le 08/01, 4 Océanites tempêtes.

Océanite culblanc *Hydrobates leucorhoa* (2 données)
 · Penvins / Sarzeau, le 03/01/1998, 2 individus.
 · Penvins, un seul le 05/01.

Fou de Bassan *Sula bassana* (6 données)

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (127 données)
Durant cet hiver intermédiaire entre deux enquêtes, les dortoirs ont fait l'objet de quelques visites voire de suivis :

LOCALITE	DATE	EFFECTIF
Saint-Adrien / Saint-Barthélémy	31/01/1998	32 dont 1 individu bagué au Danemark présent jusqu'à la fin de la période
Île des Souris / Port-Louis	novembre 97 à mars 1998	200 le 02/12/1997 ; 220 le 02/01/1998 ; 259 le 04/02 ; 194 le 02/03
la Basse Née / Saint-Marcel	22/12/1997 et 07/02/1998	28 26
Le Moustoir/ Arzal	11/01/1998 et 11/02	45 48
Le Parco / Hennebont	21/01/1998	89
sortie / entrée de la rivière d'Etel	novembre 1997 à février 1998	376 le 16/11/1997 ; 164 le 02/12 ; 278 le 22/12 ; 88 le 11/01/1998 ; 48 le 19/01 ; 65 le 15/02 ;
port militaire / Lorient	novembre 97 à mars 1998	73 le 02/12/1997 ; 60 le 02/01/1998 ; 84 le 04/02 ; 96 le 02/03
vallée de l'Oust / Peillac	07/02/1998	111

Dortoirs de Grands Cormorans dans le Morbihan, hiver 1997 - 1998

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (3 données)
60 Cormorans huppés le 19/01/1998 dans le port d'Hoëdic.

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (8 données)
2 Butors étoilés débutent l'hiver à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, le 27/02/1998 l'aile trouvée sur la prairie humide indique la disparition (accidentelle ?) de l'un deux. Le survivant est vu encore le 08/03. 2 individus à Léveno / Sarzeau le 26/12/1997.

Décade	date	Effectif maximum	Localité
N2	11/11/1997	17	rivière de Pénerf, opération concertée G.O.B
N3	24&26/11/1997	10	Réserve de Pen En Toul
D1	05/12/1997	8	Réserve de Pen En Toul
D2	13/12/1997	17	Suscinio
D3	28/12/1997	13	Suscinio
J1	05/01/1998	3	Réserve de Pen en Toul
J2	14/01/1998	5	Réserve de Pen en Toul
J3	25/01/1998	12	rivière de Pénerf, opération concertée G.O.B
F1	06/02/1998	8	Réserve Naturelle de Séné
F2	15/02/1998	6	Réserve de Pen en Toul
F3	26/02/1998	6	Réserve Naturelle de Séné
M1	07/03/1998	14	Suscinio
M2	12/03/1998	11	Réserve de Pen en Toul

Spatules blanches dans le Morbihan, effectif par décades, novembre 1997- mars 1998

Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis* (1 donnée)

Le Héron gardeboeufs est revu cet hiver dans la presqu'île de Rhuys, 1 le 10/01/1998 à Kergroix / Surzur. Y a-t-il des observations printanières ou estivales ?

Grande Aigrette *Egretta alba* (1 donnée)

Au coeur de l'hiver, le 13/02/1998, au Pont-Neuf / Le Tour-du Parc, un individu.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (77 données)

Comptages journaliers des réserves de

- Séné : maximum de 27 le 25/11/1997 et 26 le 16/02/1998.
- Pen en Toul : 10 le 15/12.

Dans la rivière de Pénerf, les comptages mensuels en trouvent de 17 à 24.

37 à Béringue / Sainte-Hélène et 78 aux salines de Carnac le 26/01.

A Pencadé / Le Tour-du-Parc, plus d'une centaine d'Aigrettes garzettes regagne le dortoir le 26/01.

Héron cendré *Ardea cinerea* (80 données)

Comptages journaliers des réserves de

- Séné : maximum de 9 le 25/11/1997 et 15/02/1998.
- Pen en Toul : 8 le 30/12 et 11 le 25/02.

Sur l'étang au Duc / Ploërmel, les Hérons cendrés sont entre 3 et 18 (le 16/02/1998).

Déjà 7 nids sont occupés sur les pins de Kerzo / Port-Louis le 14/03.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (17 données)

Même si l'espèce est réputée vagabonde, une seule observation a pour origine un point éloigné du Golfe : 1 ibis se pose sur la Petite Mer découverte le 23/11/1997 à Plouhinec.

Ils sont 195 dans un pré inondé des Prières / Billiers le 11/01/1998 et le groupe du 21/02 sur la colonie du Tour-du-Parc dépasse 200 individus.

Spatule blanche *Platylea leucorodia* (80 données)

Voir tableau page précédente.

1 Spatule blanche à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 17/02/1998 et à Penthièvre / Saint-Pierre Quiberon le 22/02.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (68 données)

Quelques petits groupes de Cygnes tuberculés fréquentent les rivières maritimes ou les marais : à l'étang du Hézo, où il sera possible de voir l'espèce tout au long de l'hiver, ils seront 11 les 29/11/1997 et 04/12. Sur la Réserve Naturelle de Séné, le maximum de la période est de 6 individus le 05/03/1998. Les opérations concertées dans la rivière de Pénérf en dénombrent de 3 (décembre) à 5 (janvier). Il y en a 6 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc le 28/01/98 et le 07/02 à Pencadénic / Le Tour-du-Parc...

Oie rieuse *Anser albifrons* (1 donnée)

Cette observation sans ambiguïté d'une espèce rarement vue dans le département concerne 8 Oies rieuses au Dreff / Riantec, le 01/01/1998. Elles n'auront fait qu'une halte de quelques minutes !

Oie cendrée *Anser anser* (3 données)

- le Rohu / Lanester, 14 le 29/11/1997 mais aucune le lendemain.
- Le Grand Loc'h / Guidel, 1 le 07/02/1998.
- Le Lic / Damgan, 1 le 21/02 mais aucune le 22/02.

Bernache du Canada *Branta canadensis* (2 données)


- le 27/01/1998, sur la Réserve Naturelle de Séné, 1.
- le 09/02 à Pencadénic / Le Tour-du-Parc, 6.

Bernache cravant *Branta bernicla* (134 données)

Suivant la coordination du réseau Bernaches France, les effectifs les plus élevés sont atteints :
rade de Lorient, 2 450 à la mi-décembre;
rivière d'Étel, 215 à la mi-janvier;
baie de Quiberon, 1 620 à la mi-novembre;
golfe du Morbihan, 21 300 à la mi-novembre;
baie de Vilaine, 1 550 à la mi-décembre.

Le pic d'abondance est toujours, dans le Golfe du Morbihan, ressenti en novembre mais l'importance relative du golfe par rapport aux autres sites du littoral français décroît.

Sources utilisées pour le document suivant : IWRB /BIROE, coordination Bernaches - France et Gillier J.-M. & Mahéo R. La Bernache cravant à ventre sombre *Branta b. bernicla* en France ; *Ornithos* (4) 5.



Effectif des Bernaches cravants en novembre (histogrammes) et pourcentage par rapport à l'effectif national (points), de 1989 à 1997, Golfe du Morbihan

Quelques données locales : Réserve Naturelle des marais de Séné, maximum de 925 le 25/11/1997 mais l'effectif habituel est de plusieurs individus à quelques dizaines ; 1 Bernache cravant découvre l'étang au Duc / Ploërmel, le 07/11 ; à Quélisoye / Larmor-Plage, les bandes de quelque importance ne sont visibles qu'en février, 456 le 14/02/98.

Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota* (2 données)

- 1 le 16/01/1998 dans la rivière du Vincin / Vannes.
- 1 le 10/02/1998 à Conleau / Vannes.

Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans* (5 données)


Entre les 12/01/1998 et 23/01, un individu est plusieurs fois observé à Conleau / Vannes.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (1 donnée)

Dans l'anse du Moustran / Baden, un groupe de 8 Tadornes casarcas comporte un hybride T. casarca X T. Belon. Si l'origine domestique de ces canards d'ornement ne fait guère de doute, l'union avec un T. de Belon doit-elle faire penser qu'il y a encore des individus de cette espèce en volière ?

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (182 données)

Le Tadorne de Belon a fait l'objet d'un suivi hivernal dans la rade de Lorient, à marée basse les troupes se trouvent sur la Petite Mer et les vasières du Blavet.



Dénombrements des Tadornes de Belon, de novembre 1997 à mars 1998 :
rade de Lorient (Morbihan)

Quelques données locales : 553 le 25/01/1998 dans la rivière de Pénerf ; dans la rivière d'Étel, 35 le 10/01 et 404 le 26/01 ; 94 au Plessis-Caër / Pluneret le 25/01 ; 5 à l'étang au Duc / Ploërmel le 11/01 ; dans la baie de Plouharnel le 28/02, 240 Tadornes de Belon.

WETLANDS INTERNATIONAL : le total 1998 est inférieur à celui de janvier 1997, la différence est imputable aux faibles effectifs de la baie de Vilaine, 410 en 1998 après 2 291 en 1997. Le Golfe se maintient à un niveau élevé : 4 350 soit 77 % des tadornes comptés dans le département.

Canard siffleur *Anas penelope* (45 données)

A partir de janvier, mais les données font défaut pour novembre et décembre, l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon accueille trois à quatre centaines de C. siffleurs. Le maximum est noté le 15/02/1998 avec au moins 600 individus. Le dernier comptage, du 08/03, fait état d'un effectif de 170. La rade de Lorient n'héberge qu'une cinquantaine de siffleurs, non plus sur la Petite Mer mais principalement entre la vasière de Quélisoye / Larmor-Plage et l'étang du Ter / Ploemeur.

WETLANDS INTERNATIONAL : l'essentiel des Canards siffleurs se répartit entre le Golfe du Morbihan et la rivière d'Étel, le total est de 906.

Canard chipeau *Anas strepera* (13 données)

De début janvier à la mi-mars, quelques modestes groupes sont observés dans le bassin oriental du Golfe :

- Bénance / Sarzeau le 30/11/1997, 1 mâle.
- Saint-Colombier / Sarzeau le 18/12, 1.
- Tascon / Saint-Armel le 09/01/1998, 23
- rivière du Vincin / Vannes le 10/01, 15
- réserve de Séné le 06/02, 2
- la Brousse / Sarzeau le 14/02, 24
- le Duer / Sarzeau le 08/03, 11

la Brousse le 13/03, 11
Sur l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, au moins deux Canards chipeaux ont été contactés (11/01 à 01/03).


Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (53 données)

Les sites habituels concentrent les Sarcelles d'hiver, 900 à Saint-Colombier / Sarzeau le 17/02/1997 ; 292 sur les marais de la pointe des Emigrés / Vannes le 28/01/1998 ou 220 au Pont-Vert / Vannes le 31/01/98. A l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, plus de 170 Sarcelles d'hiver, le 12/03, sont de passage.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 300 dans le Golfe du Morbihan.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (53 données)

Au lagunage de Baden, 110 le 14/12/1997 ; sur l'étang du Ter / Ploemeur, 308 colverts le 29/12/97 ; en mer, au Fort-Bloqué / Ploemeur, environ 160 colverts le 09/01/1998 ; étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 150 au moins le 18/01/1998.



Dénombrements des Canards colverts sur l'étang au Duc / Ploërmel (Morbihan) :
automne-hiver 1997 - 1998

WETLANDS INTERNATIONAL : 3 830+ dont 2 450 dans le Golfe du Morbihan.

Canard pilet *Anas acuta* (38 données)

Réserve Naturelle des marais de Séné : maximums de 339 le 23/12/1997 et de 332 le 07/01/1998.

A noter 400 Canards pilets à la pointe du Loc'h / Billiers le 08/03/98 et 29 au Fort-Bloqué le 11/01.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 306 entre le Golfe et la Vilaine.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (1 donnée)

Elles sont 5 à Pen en Toul / Larmor-Baden le 03/02/1998.

Canard souchet *Anas clypeata* (17 données)

Le 08/03 encore 30 Canards souchets à la pointe du Loc'h / Billiers.


WETLANDS INTERNATIONAL : 230 dont 150 dans le Golfe du Morbihan et 70 en baie de Vilaine.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

(42 données)

Les effectifs sont modestes comparés à ceux de l'hiver précédent sur l'étang aux Ducs de Vannes : 224 le 05/12/1997 contre 772 le 07/12/1996. La même remarque s'applique au lagunage d'Auray (32 F. milouins le 14/12/97 mais c'est la seule donnée qui nous soit parvenue) et à l'étang du Ter / Ploemeur où moins d'une centaine de milouins passe l'hiver (86 le 28/12).

L'étang de Bel-Air / Priziac a pu accueillir des F. milouins hivernants puisque les comptages WETLANDS INTERNATIONAL en signalent 87. La troupe de 41 individus le 08/03 concernerait, elle, des oiseaux de passage.




Dénombrement des Fuligules milouins sur l'étang aux Ducs / Vannes et l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) ; novembre 1997 - février 1998

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

(44 données)

Les stationnements hivernaux sur l'étang du Ter / Ploemeur sont d'abord comparables à ceux de l'hiver 1996/1997 mais le pic de fin janvier / début février est beaucoup moins marqué : maximum de 210 le 05/02/1998 contre 382 le 06/02/1998.

Le 08/03/1998 800 Fuligules morillons sont visibles de la pointe du Loc'h / Billiers.



Comparaison des effectifs de Fuligule morillon sur l'étang du Ter / Ploemeur (Morbihan) durant les hivers 1996/1997 et 1997/1998

Fuligule milouinan *Aythya marsila* (7 données)

Encore 600 à Men Armor / Pénestin le 07/03/1998.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 100 dans la baie de Vilaine.

Eider à duvet *Somateria milissima* (18 données)

De décembre à mars, de petits groupes sont observés devant la presqu'île de Rhuys (8 données), la Côte Sauvage / Saint-Pierre Quiberon (4 données) et le littoral de Plouharnel à Gâvres (6 données).

Là où les oiseaux ont été détaillés, les femelles dominant : 57,7 % de femelles, 23,1 % d'immatures, 19,2% de mâles pour 26 individus.

Macreuse noire *Melanitta nigra* (5 données)

- Kerhillio / Erdeven le 17/01/1998, 9.
- Kerhillio le 31/01/98, 11.
- baie de Quiberon le 15/02, environ 50.
- Linès / Plouhinec le 22/02, 2.
- Keraude / Saint-Pierre Quiberon le 08/03, 20.

WETLANDS INTERNATIONAL : 480 en baie de Vilaine soit 89,7 % du total morbihannais.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula* (33 données)

Rivière d'Étel : 30 le 26/01/1998 et 9 (7 femelles, 1 mâle adulte, 1 mâle immature) à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 27/02/1998.

WETLANDS INTERNATIONAL : 370 dont 340 dans le Golfe qui en accueillait 682 en 1995, 630 en 1996 et 660 en janvier 1997.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*

WETLANDS INTERNATIONAL : 4 dans la baie de Vilaine.

Harle huppé *Mergus serrator* (84 données)

De ces nombreuses données ressort que les Harles huppés se dispersent peu autour du Golfe du Morbihan, seuls quelques groupes sont notés régulièrement devant Gâvres et la rivière d'Étel.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 482 dont 1 250 dans le Golfe.

AR VRAN MORBIHAN N°16

Groupe n°2 Des rapaces aux rallidés

Choix et rédaction établis par François Urvoaz

Milan noir *Milvus migrans*

(4 données)

Les premières observations sont précoces (12/03/1998) tout comme en 1997 (11/03).

Le premier oiseau est noté à Coat Ihuel / Sarzeau. Dès le 14/03 un couple est présent à l'étang du Cranic / Brec'h.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

(47 données)

Observations régulières tout au long de la période hivernale sur les marais littoraux.

A noter 3 individus dont un couple en parade le 07/03/1998 à l'étang de Kervran / Plouhinec.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

(21 données)

Oiseaux généralement observés seuls, sauf le 12/01/1998 sur la réserve de Falguérec / Séné (2 oiseaux) et le 24/01, un mâle et une femelle à Crétudel / Loyat. Les observations à l'intérieur des terres sont peu nombreuses : le manque d'observateurs en est certainement la cause. A noter cependant cette année Crétudel / Loyat (voir ci-dessus), Quéhélec / Sérent (2 données), Lanfloy / Theix (1 donnée), vallée de l'Oust / Peillac (1 donnée) fin janvier.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

(31 données)

La très grande majorité des observations concerne la zone littorale avec 7 mentions pour Pen en Toul / Larmor Baden.

Buse variable *Buteo buteo*

(31 données)

- 3 au Duer / Sarzeau le 24/01/1998.
- 3 à Kerlin Bastar / Ploemeur le 14/12/1997.

Mises à part ces données, rien de particulier à signaler.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

(2 données)

2 observations tardives :

- 1 individu stationne du 30/10/1997 au 02/11 à Kergall / Surzur.
- 1 individu observé le 16/11 à l'étang de Lannédec / Ploemeur.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

(15 données)

Très peu de variété dans les observations (12 données viennent de Falguérec / Séné).

3 individus dont au moins 2 mâles semblent parader le 31/01/1998 dans la carrière de Quinipily / Baud.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (5 données)

Toutes les données parviennent de la région lorientaise (le Ter / Ploemeur et Grand Loch / Guidel) ou sont notées sur les dunes d'Erdeven (dernière observation le 08/03/1998 à Kerminihy / Erdeven).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (6 données)

2 scènes de capture de proie :

- le 16/12/1997 dans l'anse de Plouharnel, une femelle? capture une barge.
- le 14/03/1998 au Passage / Saint-Armel, il s'agit d'un limicole.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (1 donnée)

5 individus sont observés à Kerduellic / Ploemeur le 11/01/1998.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (1 donnée)

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (5 données)

3 sites sont notés : Falguérec / Séné, Pen en Toul / Larmor Baden, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon où au moins 3 individus sont observés le 08/03/1998.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (18 données)

Un petit rassemblement de 12 individus le 25/01/1998 au Pont-Vert / Vannes.

Foulque macroule *Fulica atra* (76 données)

14/10	07/11	01/12	19/12	16/01	28/01	16/02
38	30	52	56	58	6	230

Foulque macroule, étang au Duc / Ploërmel, octobre 1997 - février 1998

18/11	28/11	04/12	10/12	16/12/97	17/12	30/12	05/01	14/01
21	67	9	16	49	16	23	3	1


Foulque macroule, réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul / Larmor-Baden, novembre 1997 - janvier 1998

16/12	08/01	11/01	14/01/98	18/01	01/03
350	410	480	455	>500	140

Foulque macroule, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, décembre 1997 - mars 1998

04/12	15/12	23/12	07/01	16/01	29/01	06/02	16/02	26/02
409	369	507	353	408	398	375	289	314

Foulque macroule, réserve S.E.P.N.B. de Falguérec / Séné, décembre 1997 - février 1998



Comptage hebdomadaire des Foulques macroules à Quélisoye / Larmor-Plage (Morbihan), novembre 1997 à mars 1998

A noter également le 14/12/1997, la présence de 1 000 individus au Roch Du / Crac'h.

AR VRAN MORBIHAN N°16

Groupe n°3 De l'Huitrier pie au Tournepierre à collier

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Huitrier pie *Haematopus ostralegus* (6 données)

150 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon le 21/12/1997, 140 à la pointe du Bronzais / Pénestin le 11/02/1998.


Une curiosité : le 30/12/97 à la pointe de Penvins / Sarzeau un Huitrier pie blanc "tête, dos, scapulaires mouchetés de noir".

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (3 données)

C'est une première : une Échasse blanche a passé l'hiver dans le Morbihan, un juvénile à Pen Mané / Locmiquélic (AR VRAN 9:2, 1998).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (61 données)

Les comptages mensuels dans la rivière de Pénerf ont permis de recenser un nombre appréciable d'avocettes (voir AR VRAN MORBIHAN 15).



Dénombrement des Avocettes élégantes sur la Réserve Naturelle des marais de Séné - S.E.P.N.B (Morbihan) : novembre 1997 à mars 1998

Cet hiver, un petit nombre d'avocettes a fréquenté la rade de Lorient des derniers jours de novembre à la fin février, avec un maximum de 27 le 08/02/1998 au Rohu / Lanester. Jusqu'alors elles n'étaient vues qu'irrégulièrement.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 624 dont 1 077 en baie de Vilaine.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* (1 donnée)

Déjà le 28/02/1998 un Oedicnème criard est trouvé sur les dunes d'Erdeven, ce qui constitue un très précoce retour (voir AR VRAN MORBIHAN 13).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (16 données)

Plus de 400 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 01/02/1998.

WETLANDS INTERNATIONAL : 3 485 dont 1 142 et 813 respectivement dans le Golfe du Morbihan et la rade de Lorient.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (1 donnée)

Sur la grande plage de Carnac, 6 individus le 02/12/1998. Il peut s'en cacher d'autres dans les bandes de petits limicoles...

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (28 données)

Dans les terres : Crénion / Loyat, 240 le 13/12/1997 mais seulement 74 sur l'ensemble de la commune après plusieurs jours de gel le 24/01/1998. Autour de Guéhenno, 1 500 le 15/12/1997. 100 à Kerroux / Lanouée le 27/01.

Littoral : au Grand Loc'h / Guidel, l'espèce est présente dès le début de novembre, 200 sont posés le 31/12/1997.

WETLANDS INTERNATIONAL : 1 014 dont 650 entre Laïta et Blavet.

Pluvier argenté *Pluvialis sqatarola* (21 données)

Plus de 700 à Banastère / Le Tour-du-Parc le 14/12/1997, 500 le 08/03/1998 ; 725 dans la Petite Mer / Plouhinec le 23/11/1997.

WETLANDS INTERNATIONAL : 3 168 dont 1 830 dans le Golfe et 732 dans la rade de Lorient.


Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (105 données)

Les arrivées importantes se font au début du mois de novembre.

Données locales : environ 3 000 à Guéhenno le 15/12/1997, 740 au Duer / Sarzeau le 28/12, 1 440 dans la rivière de Noyal le 09/01/1998, 1 000 à Trévenan / Muzillac le 14/02, 1 500 au passage à Arzal le 16/02, 750 le 17/02 dans l'étier de Caden / Le Tour-du-Parc.


Quelques places sont suivies au cours de l'automne et de l'hiver :

- le Grand Loc'h / Guidel, plusieurs centaines de Vanneaux huppés s'y concentrent à partir des pâtures et cultures voisines, 978 le 22/11/1997, 1 200 le 12/01/1998.
- réserve de Pen en Toul /Larmor-Baden, de mi-novembre à fin-février le maximum est de 800 le 12/02.
- Réserve Naturelle des marais de Séné, les effectifs proches d'un demi-millier durant les mois de novembre et décembre culminent à 925 le 23/12 et 780 le 07/01 puis un second pic est noté le 16/02 avec 2 730 individus.



Dénombrement des Vanneaux huppés sur la Réserve Naturelle des marais de Séné (Morbihan), novembre 1997 - mars 1998

- lors des comptages mensuels dans la rivière de Pénerf, "300 à 400 Vanneaux huppés semblent occuper régulièrement l'herbu de Reniac / Surzur". L'effectif maximal compté est de 925 le 14/12/1997.
- rivière d'Etel, les vanneaux sont vus sur les vasières découvertes.



Dénombrement des Vanneaux huppés dans la rivière d'Etel (Morbihan), novembre 1997 - février 1998

Les observations de mars se rapportent à des groupes de petite taille : 24 à la réserve de Séné le 05/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 8 360 dont 4 400 dans le Golfe et 1 500 entre Guidel et Ploemeur.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (8 données)

Les données sont rares en dehors des comptages de mi-janvier. 100 à Saint-Colombier le 18/12/1997, 4 sur la Petite Mer / Riantec le 27/02/1998, 14 à la pointe de Bécudo / Sarzeau, 25 dans la baie de Plouharnel le 08/03, 58 à Banastère / Sarzeau le 08/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 345 dont 278 dans le Golfe du Morbihan.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (16 données)

Laïta - Blavet : environ 200 Bécasseaux sanderlings ont leurs reposoirs à Locqueltas / Larmor-Plage (plus de 150 le 27/11/1997), au Fort-Bloqué / Ploemeur (plus de 130 le 09/01/1998) et Kerpape / Ploemeur (180 le 21/01).

Erdeven - Côte Sauvage : plus de 300 le 23/11 à la pointe du Percho / Saint-Pierre Quiberon, 200 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon, Kerhillio / Erdeven environ 200 le 17/01 et 45 le lendemain dont 15 portent des salissures de mazout.

Men Du / La Trinité-sur-Mer : 77 le 11/01.

La dernière donnée est du 30/01 avec plus de 160 à Toulhars / Larmor-Plage.

WETLANDS INTERNATIONAL : 844 dont 450 en baie de Quiberon.

Bécasseau minute *Calidris minuta* (2 données)

A l'étang au Duc / Ploërmel, un individu le 07/11/1997 est nettement détaché du passage post-nuptial et le B. minute vu à Kerpape / Ploemeur le 07/12 constitue l'unique observation hivernale.

Bécasseau violet *Calidris maritima* (12 données)

Motivés par l'enquête qui lui est consacrée les observateurs ont concentré leurs recherches sur la presqu'île de Quiberon et Ploemeur.

WETLANDS INTERNATIONAL : 44 dont 32 à Ploemeur.

Bécasseau variable *Calidris alpina* (50 données)

Quelques comptages :

Date	effectif	Localité
11/11/1997	999	rivière de Pénerf
23/11/1997	3 000	Petite Mer de Gâvres
25/11/1997	1 393	Réserve Naturelle de Séné
04/12/1997	1 820	Réserve Naturelle de Séné
21/12/1997	2 000	baie de Plouharnel
26/01/1998	3 475	rivière d'Etel
01/02/1998	2 000	Banastère
06/02/1998	1 250	Réserve Naturelle de Séné
07/03/1998	1 200	Le Bronzais / Pénestin
08/03/1998	1 600	baie de Plouharnel

WETLANDS INTERNATIONAL : 41 786 dont 23 100 dans le Golfe du Morbihan et 8 600 dans la rade de Lorient.


Combattant varié *Philomachus pugnax* (1 donnée)

6 individus le 11/01/98 aux Prières / Augan se tiennent dans un pré inondé. Il n'y a pas cet hiver d'observation de bandes importantes (ex : 200 le 27/12/1995 à la métairie du pont / Noyal).

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus* (2 données)

- 1 le 06/12/1997 sur les bords de la Petite Mer / Plouhinec.
- 1 le 30/01/1998 au Duer / Sarzeau.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (57 données)



Dénombrement des Bécassines des marais dans la Réserve Naturelle des maïs de Séné - S.E.P.N.B. Morbihan ; novembre 1997 - mars 1998

231 à Bénance / Sarzeau le 29/11/1997 puis à la réserve de Pen en Toul / Larmor-Baden 201 le 12/02/1998 et 221 le 15/02 signalent les départs.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (6 données)

1 individu à chaque fois dans les situations suivantes : au crépuscule du 30/11/1997 au bois de Kermorvan / Baud ; le 08/0/1998 au Duer / Sarzeau : à Bellecroix / Sarzeau le 29/01 ; encore au Duer le 02/02 ; à Saint-Nolff le 03/02, crépuscule ; dans le bois du Ter / Ploemeur le 09/02.

Barge à queue noire *Limosa limosa* (16 données)

Comme l'hiver précédent un nombre appréciable de Barges à queue noire passe l'hiver à Saint-Colombier / Sarzeau : 238 le 17/12/1997, 195 le 05/02/1998.

Les passages sont sensibles à Pen en Toul :

09/01/1998	1
11/02/1998	182
17/02/1998	163
24/02/1998	184
25/02/1998	194
04/03/1998	193
11/03/1998	179

WETLANDS INTERNATIONAL : 13 pour tout le département.

Barge rousse *Limosa lapponica* (10 données)

Un petit nombre de Barges rousses passe l'hiver sur notre littoral : 21 dans la rivière de Pénerf le 11/11/1997, 107 le 21/12 en baie de Plouharnel. Il n'y a pas de donnée après le 22/02.

WETLANDS INTERNATIONAL : 93 dont 58 dans la baie de la Vilaine.

Courlis corlieu *Numenius tenuirostris* (8 données)

Le dernier groupe est du 29/11/1997, 39 à Pentès / Le Tour-du-Parc. Pendant l'hiver quelques C. corlieus isolés sont contactés : à la Réserve Naturelle de Séné ou au Bronzais / Pénestin.

Un premier groupe de passage comporte 47 individus à la pointe du Loc'h / Billiers le 08/03/1998.

Courlis cendré *Numenius arquata* (8 données)

Ce qui n'est plus la curiosité d'un jour mais tout proprement une spécialité locale : un Courlis cendré albinos fréquente la rivière de Pénerf encore cet hiver.


WETLANDS INTERNATIONAL : 1 109.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (29 données)


31 le 17/12/1997 à Saint-Colombier / Sarzeau ; 24 à la Réserve Naturelle de Séné le 20/01/1998 et 25 le 05/03. L'espèce est présente tout l'hiver dans le Golfe du Morbihan.

WETLANDS INTERNATIONAL : 9.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (72 données)



Dénombrement des Chevaliers gambettes, Réserve Naturelle des marais de Séné-S.E.P.N.B., Morbihan : novembre 1997 - mars 1998



Dénombrement des Chevaliers gambettes, Quélisoye / Larmor-Plage., Morbihan novembre 1997 - mars 1998

Les comptages dans la rivière de Pénérf ont trouvé des effectifs non négligeables : 88 le 25/01/1998.

Les départs sont sensibles dès mi-février à Séné et Pen en Toul / Baden où l'on note une bande de plus de 240 le 17/03.

WETLANDS INTERNATIONAL : 502 dont 141 dans le Golfe du Morbihan, 127 dans la rade de Lorient et 125 en baie de Vilaine.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (24 données)

Quelques chevaliers aboyeurs passent l'hiver dans le Golfe et ses environs : 23 à Pen en Toul le 10/12/1997.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (41 données)

Un très petit nombre de C. Culblanc passe l'hiver dans le Golfe du Morbihan : 6 le 14/12/1997 dans la rivière de Pénérf.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (7 données)

Ici et là, dans la rade de Lorient ou la rivière d'Etel, le Golfe du Morbihan et la presqu'île de Rhuys 1 voire 2 individus.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* (12 données)

90 entre Portivy / Saint-Pierre Quiberon et Roh Vihan le 21/12/1997 ; 110 au Bronzais / Pénestin le 07/03/1998.

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (données)

- Réserve de Pen en Toul / Larmor-Baden, 1 le 30/12/1997.
- plage de Suscinio / Sarzeau, 1 immature de premier hiver le 08/01/1998.
- Kerhillio / Erdeven, 1 le 20/01.

AR VRAN MORBIHAN N°16

Groupe n°1 Des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Françoise et Jean-Luc Lemonnier

Rappelons que la période a été marquée par un mois de janvier tempétueux, avec notamment une succession de très violents coups de vent d'ouest entre le 1^{er} et le 4. Rafales qui semblent avoir repoussé sur les côtes tant les oiseaux que les observateurs...

Grand Labbe *Catharacta skua* (5 données)

Ces données issues de la pointe de Penvins / Sarzeau et de Carnac sont toutes concentrées sur quelques jours : du 05 au 13/01/1998 et concernent de 1 à 3 oiseaux. Comme l'hiver dernier, un cadavre de Grand Labbe a été découvert sur les dunes de Plouhinec, le 10/01/1998.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (10 données)

Les données particulièrement nombreuses cet hiver proviennent de toute la côte, de Damgan à Gâvres. La plupart est enregistrée en janvier et on retiendra l'observation de 10 individus le 06/01 puis de 11 le 12/01/1998 sur la Grand Plage de Carnac.

Si la composition de ces deux groupes ne nous est pas connue, les autres observations fournissent un total de huit adultes contre trois oiseaux de premier hiver.

Mouette pygmée *Larus minutus* (14 données)

Douze données concernent des oiseaux observés en janvier sur les communes de Sarzeau, Noyal et Séné avec un maximum de 6 individus le 08/01/1998 en rivière de Noyal. Puis il faut attendre mars, avec un adulte le 7 et un le 14 à l'étang de Kerzine / Plouhinec. Enfin, un immature est vu le 09/03/1998 aux Granges / Biliers.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* (76 données)

Les comptages réguliers sur la Réserve Naturelle de Séné laissent apparaître des maxima à intervalles réguliers à mettre vraisemblablement en rapport avec le régime des marées et / ou les horaires de ces recensements. Toutefois, ces maxima diffèrent considérablement et un étonnant chiffre de 2 275 individus obtenu le 23/12/1997 dépasse largement les 200 à 700 oiseaux enregistrés sinon.

Au compte des rassemblements conséquents, il faut ajouter celui de 3 500 laridés mêlant Goélands argentés et Mouettes rieuses le 04/01/1998 à Quélisoye / Larmor-Plage, et celui de 1 000 à 1 200 rieuses le 12/03/1998 sur l'étang du Cranic / Brec'h.

Et pour sacrifier à ce qui devient une habitude, pas de chronique sans leucistique : 1 le 10/01/1998 à Kerhillio / Erdeven et 1 le 07/03/1998 au Bronzais / Pénestin.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* (7 données)

Et de cinq ! C'est en effet le cinquième hivernage consécutif d'un Goéland à bec cerclé à Ploemeur. Il est noté du 01/01 au 04/03/1998 sur l'étang du Ter ou à proximité.

Un adulte est aussi vu le 07/03/1998 au Bronzais / Pénestin ; là encore, il s'agit d'un site précédemment fréquenté par l'espèce, signalé depuis le n°2 de ces chroniques morbihannaises (14/10/1990).

Goéland cendré *Larus canus* (23 données)

L'espèce est observée sur toute la période comme le révèlent les comptages réguliers effectués sur la Réserve Naturelle de Séné. Sur ce site, l'effectif atteint régulièrement 20 à 30 individus de novembre à mi-février, puis progresse à 56 le 26/02/1998 et à 94 le 05/03/1998.

Sinon, l'espèce est toujours peu notée :

- > 4 le 09/01/1998 en Petite Mer de Gâvres,
- > 92 le 12/01 puis environ 80 le 17/01/1998 à Penvins / Sarzeau,
- > 15 le 17/01/1998 dans l'anse de Conleau / Vannes,
- > 45 le 07/03/1998 au Bronzais / Pénestin.

Goéland brun *Larus fuscus* (59 données)

Les recensements réguliers sur la Réserve Naturelle de Séné laissent apparaître de fortes fluctuations au cours de la période, à mettre vraisemblablement en relation avec les heures de comptages et / ou de marée (à titre d'exemple : 3 le 01/12, 33 le 04/12, puis 2 le 05/12/1997). Relevons toutefois l'effectif maximal sur ce site : 60 le 15/12/1997.

Rappelons les résultats, même si incomplets, des recensements mensuels effectués en rivière de Pénerf (cf Ar Vran Morbihan n°15) :

11/11/1997	14/12/1997	25/01/1998	22/02/1998	22/03/1998
11	39	2	36	12

Enfin, la seule concentration d'importance a été relevée le 28/02/1998 sur l'étang du Cranic / Brec'h, où 170 Goélands bruns complétaient un vaste rassemblement d'un millier de laridés.

Goéland argenté *Larus argentatus* (16 données)

Le 04/01/1998, à Lorient, des dizaines de Goélands argentés, associés à des Goélands marins, présents au port de pêche viennent s'ajouter au millier de laridés rassemblés sur l'île Saint-Michel, groupe constitué là encore d'une majorité de G. argentés et aux 3 500 autres mouettes et goélands posés à Quélisoye / Larmor-Plage.

Deux autres rassemblements sont notés :

- > environ 700 le 11/01/1998 à Kerhillio / Erdeven,
- > environ 400 le 28/02/1998 à l'étang du Cranic / Brec'h.

Goéland leucopnée *Larus cachinnans* (1 donnée)

Malgré l'attention portée par plusieurs observateurs aux groupes de laridés, une seule donnée a pu être recueillie : un adulte en plumage d'hiver le 18/02/1998 à la pointe des Emigrés / Vannes.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (1 donnée)

Le cadavre frais d'un oiseau de premier hiver est découvert le 10/01/1998 dans les dunes de Plouhinec.

Goéland marin *Larus marinus* (16 données)

A part la mention de nombreux individus, sans plus de précision, au port de pêche de Lorient le 04/01/1998, toutes les autres données ne concernent que 1 à 3 oiseaux.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (31 données)

Jamais cette revue n'avait fait l'écho d'autant de données pour cette espèce, soit depuis l'hiver 1989 /1990. Les observations étant concentrées entre le 29/12/1997 et le 31/01/1998, cet afflux de données est bien sûr à mettre en rapport avec les tourmentes de janvier ; ce que confirment les nombreuses découvertes d'oiseaux épuisés, voire morts. Enumérons ce triste bilan :

- > un immature mort et un immature épuisé le 29/12/1997 à Penvins / Sarzeau,
- > un cadavre d'adulte le 10/01/1998 à Kerhillio / Erdeven,
- > un cadavre le 11/01/1998 au Fort-Bloqué / Guidel,
- > deux adultes trouvés morts, dont un mazouté, le 12/01/1998 à Penvins / Sarzeau,
- > 12 cadavres le 17/01/1998 et 12 oiseaux très affaiblis le 18/01/1998 sur le littoral d'Erdeven,
- > encore un cadavre le 31/01/1998 à Porh Kerhouët / Erdeven.

Bien sûr, les observations des groupes les plus importants se situent sur la façade océane :

- > 10 les 03 & 05/01/1998 à Penvins / Sarzeau,
- > 12 dont 6 adultes et 6 de premier hiver le 08/01/1998 sur la plage de Suscinio / Sarzeau,
- > 40 le 09/01/1998 à la plage de Damgan,
- > 26 le 10/01, 80 le 11/01 et 45 le 17/01/1998 sur le littoral d'Erdeven.

Mais des sites plus abrités ont accueilli quelques oiseaux :

- > un adulte le 08/01/1998 à Montsarrac / Séné,
- > 1 le 09/01/1998 à Pen en Toul / Larmor-Baden,
- > et même : un adulte le 11/01/1998 sur l'étang au Duc de Ploërmel !

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* (20 données)

Pas un mois sans Sternes caugeks !

Si de 1 à 3 individus peuvent être facilement observés en de nombreux sites de la côte, il convient de souligner les données de Penvins / Sarzeau où 5 caugeks étaient présentes le 30/12/1997, puis **45 le 01/01/1998**, et encore 6 le 03/01/1998. Ajoutons à ces chiffres, les 10 individus vus le 01/02/1998 à Portivy / Saint-Pierre Quiberon.

Contrairement à l'an passé (Ar Vran Morbihan n°14), le passage prénuptial n'a pas été détecté en fin de cette période.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (1 donnée)

L'observation d'un individu le 14/12/1997 en rivière de Pénérif constitue la première donnée relatée dans les chroniques "hivernales" de cette revue.

Guillemot de Troïl *Uria aalge* (6 données)

Parmi ces données, deux concernent des oiseaux morts : un cadavre propre le 11/01/1998 à Banastère / Le Tour du Parc et un mazouté le 25/01/1998 sur la Grande Plage de Gâvres.

Trois observations d'oiseaux isolés sont recueillies autour de la presqu'île de Quiberon les 28/12/1997, 03/02 et 28/02/1998. Enfin le dernier oiseau de la période, malheureusement mazouté aux flancs, est vu le 12/03/1998 au Stôle / Ploemeur.

Pingouin torda *Alca torda* (12 données)

Trois données d'oiseaux trouvés morts ne mentionnent pas de traces de mazout.

Quatre observations d'oiseaux isolés concernent là encore la presqu'île de Quiberon. Noter la présence de 5 individus le 22/02/1998 sur le littoral d'Erdeven.

Mergule nain *Alle alle* (1 donnée)

Un cadavre frais est découvert le 04/12/1997 à Kerhillio / Erdeven.



AR VRAN MORBIHAN N°16

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et rédaction établis par Patrick Philippon

Pigeon colombin *Columba oenas* (2 données)

Présence hivernale à Guidel (3 le 12/12/1997) et à Baud (1 le 31/10).

Pigeon ramier *Columba palumbus* (2 données)

Tourterelle turque *Streptopelia decaocoto* (2 données)

A Arzal, regroupements de 120 individus le 11/01/1998 (85 au barrage et 35 au Moustoir).

Effraie des clochers *Tyto alba* (8 données)

Un individu est présent au bourg de Lizio. Des données de chocs avec véhicule durant toute la période.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (2 données)

De moins en moins entendue sur ses sites ! Seul site : Lescran / Ploeren, 1 chanteur du 12 au 19/03/1998

Chouette hulotte *Strix aluco* (8 données)

La diversité des sites (Arradon, Lizio, Ploeren, Plougoumelen, Ploërmel, Le Tour-du-Parc, Vannes....) indique une présence forte de l'espèce.

Hibou des marais *Asio flammeus* (1 donnée)

Le 08/11/1997, à l'étang de Lannédec / Ploemeur, 1 individu est observé.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo athys* (18 données)

Les 2/3 des données se concentrent de novembre 1997 à janvier 1998 et proviennent de la réserve de Falguerec / Séné, 1 individu à chaque fois. L'espèce est notée aussi à la pointe des Emigrés / Vannes, Pen en Toul / Larmor-Baden, étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et Saint-Barthélémy, à l'unité à chaque fois.


Pic vert *Picus viridis* (5 données)

Noté plusieurs fois en presqu'île de Rhuys (Sarzeau).

RECTIFICATIFS aux numéros précédents d'AR VRAN MORBIHAN :

A propos du N° 15, page 23, le graphique concernant le Chevalier guignette est remplacé par celui-ci :

Données postnuptiales de Chevalier guignette, 1997, Morbihan



A propos du N° 16, page 28, le Hibou des marais signalé à l'étang de Lannénec date du 08/12/1997 et non du 08/11/1997.

Pic noir *Dryocopus martius* (8 données)

Sa présence sur la côte est confirmée en hiver (Arradon, Kervignac, Locoal-Mendon, Ploemeur). A noter un couple nicheur dès le 05/03/1998 dans le bois du département / Erdeven.

Pic épeiche *Dendrocopos major* (5 données)

Les observations se concentrent en janvier.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (7 données)

Observations entre 10/01/1997 et 13/02/1998, à Sarzeau, Rochefort-en-Terre, Locoal-Mendon.

Cochevis huppé *Galerida cristata* (2 données)

L'espèce est présente au port de commerce / Lorient, pendant la période entière.

Alouette lulu *Lullula arborea* (2 données)

5 à 10 à Lizio le 09/02/1998 ; 1 chanteur à l'étang du Cranic / Brec'h le 12/03.

Alouette des champs *Alauda arvensis* (2 données)

Chanteurs le 18/02/1998 : 15 à Lizio et 3 dans les dunes d'Étel.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (2 données)

La première : le 03/03/1998 à la pointe du Conguel / Quiberon

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (3 données)

40 le 10/01/1998 sur les dunes de Plouhinec, 1 chanteur le 17/01 à Ploemeur

Pipit maritime *Anthus petrosus* (4 données)

Noté sur la côte morbihannaise. Déjà un chanteur à Portivy / Saint-Pierre Quiberon le 28/02/1998.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (2 données)

1 individu en novembre (le 30/11/1997 à Pen-Mané / Locmiquélic) et 1 oiseau vu à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon le 08/01/1998

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (6 données)

Le pont / Noyal, 1 individu les 09 et 29/01/1998 ; au Duer / Sarzeau, 1 individu les 16/12/1997, 12/01/1998, 09/02. Un individu est vu au Temple-Lochrist / Hennebont le 16/02

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba* (3 données)
n100 en dortoir le 29/11/1997 à l'abattoir Ronsard à Bignan

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (3 données)
Les premières observations débutent à la mi-novembre. Du 15/11/1997 au 20/01/1998 ,
29 « aux alentours de Vannes », puis 15 le 17/01 à la pointe de Penvins / Sarzeau

Grands Turdids (1 donnée)
Grives litornes, musciennes, mauvis en halte migratoire à Elven le 18/02/1998 : 400 à 500.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochuros* (7 données)
Observé en petit nombre pendant la période (1 individu/donnée) à Larmor-Plage, Lorient, Plouhinec, Saint-Pierre Quiberon. A noter 3 ensemble le 10/01/1998 à Plouhinec. Les premiers chants complets sont entendus simultanément le 10/03/1998 à Arradon, Ploërmel, Vannes

Tarier pâtre *Saxicola torquata* (3 données)
Noté en couple à Erdeven, Lizio, Sérent en janvier (11 et 28/01/1998) et février (22/02).



Traquet du désert *Oenanthe deserti* (10 données)
Observation d'une femelle à Kervran / Plouhinec les 31/12/1997 et 01/01/1998 et d'un mâle en premier hiver à la pointe de Penvins / Sarzeau du 29/12/97 au 25/01/98.

Grive litorne *Turdus pilaris* (7 données)

Les premiers groupes apparaissent à la fin de la première décade de décembre : 27 le 10/12/1997 à Le longeau d'en Haut / Plouay, 75 le lendemain au Grand Loc'h / Guidel.

Les données suivantes, de janvier, proviennent du nord-est du département :

- 50 le 06/01/1998 à l'étang au Duc / Ploërmel ;
- 94 le 18/01 à Kernoul / Loyat ;
- 150 le 24/01 à La Ville André / Campénéac ;
- 80 à Liérou / Guilliers.

Dernière observation le 11/03 à Kerfontaine / Sérent avec 23 oiseaux.

Grive musicienne *Turdus philomelos* (2 données)

Grive mauvis *Turdus iliacus* (4 données)

- Premières vues le 17/12/1997 à Saint-Déron / Ploemeur (20 individus) ;
- 50 le 11/01/1998 à Caulne / Loyat ;
- 1 le 18/01 à Kernoul / Loyat ;
- 18 le 28/01 au Ter / Ploemeur.

Grive draine *Turdus viscivorus* (3 données)

Premier chant le 07/01/1998 à Quéven.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (3 données)

Peu de données cet hiver en comparaison de l'hiver dernier (17 données) !

Surzur et Penestin entendent 1 chanteur respectivement en décembre (22/12/1997) et février (14/02/1998). Deux chanteurs le 01/03 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (3 données)

Une donnée de décembre (21/12/1997) au Petit Loc'h / Guidel. 2 individus vus le 08/03/1998 à Berric et Sarzeau.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (1 donnée)

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (3 données)

Toutes données de janvier, concernant des hivernants à Vannes (3, 17 et 21/01/1998)

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (5 données)

Les deux premiers chanteurs le 27/02/1998 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon, 8 s'égosillent le 01/03/1998 au même endroit, traduisant le début du passage noté massivement le 10/03/98 dans les villes de Ploërmel et Vannes

Roitelet huppé *Regulus regulus* (2 données)

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilus* (4 données)

Les hivernants sont notés en janvier à Brec'h (1 le 10/01/1998), Vannes (3 le 15/01 dans un jardin), Sarzeau (1 le 27/01)

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (7 données)

La plupart des données proviennent de l'ouest du département : Guidel, Larmor-Plage, Locmiquélic avec un maximum de 2 individus par donnée en novembre (le 16/11/1997) et en décembre (le 21).

Ailleurs : 15 individus sont vus le 03/02 à Pen en Toul / Larmor-Baden ; en mars, les 01 et 08, plus de 2 crient ensemble à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (3 données)

Ces données entre le 10/01 et le 27/01/1998 concernent des rondes de 8 individus à Ploemeur et Vannes. Un groupe de 18 est vu au Duer/ Sarzeau le 27/01/98.

Mésange nonnette *Parus palustris* (6 données)

Notée de décembre à mars à Baud, Rochefort-en-Terre, Vannes

Mésange huppée *Parus cristatus* (2 données)

Une paire tout le mois de janvier dans un jardin à Vannes. Vue à l'étang de Toulvern / Baden

Mésange noire *Parus ater* (1 donnée) ; **Mésange bleue *Parus caeruleus*** (2 données).

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (1 donnée)

1 le 27/11/1997 sur l'église de Ploërmel.

Précédemment, un individu a séjourné du 04/12/1989 au 30/03/1990 au Pouldu / Guidel (AR VRAN MORBIHAN 1).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (2 données)

Vu en janvier 1998 à Vannes (jardin) et Brec'h.

Pie bavarde *Pica pica* (1 donnée)

Choucas des tours *Corvus monedula* (2 données)

20 le 27/11/1997 à Saint-Nicolas du Tertre ; 12 le 03/01/1998 à Vannes

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (3 données)

Corneille noire *Corvus corone* (1 donnée)

Grand Corbeau *Corvus corax* (1 donnée)

Aucun à la carrière de Quinipily / Baud le 31/01/1998.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (3 données)

- un dortoir de plus de 600 individus le 23/01/1998 à Lorient (Rue de Metz) ;
- plus de 200 dans un champ en friche à Kerdréan-Lochrist / Hennebont le 16/02/1998.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (4 données)

Une bande de plus de 230 est vue à Kervihano / Ploemeur le 26/01/1998.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (2 données)

Un le 09/01/1998 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon et 20 le 16/01 en forêt de Camors.

Serin cini *Serinus serinus* (4 données)

- le 29/01/1998, 1 chanteur sur 3 individus à Kerstran / Brec'h ;
- 1 couple le 01/02 à Kerzo / Port-Louis ;
- 3 le 11/03 à Ploërmel (dont 1 chanteur) ;
- 11 le 13/03 aux Quatre-Chemins / Larmor-Plage.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (3 données)

Des bandes sont notées :

- plusieurs centaines le 13/12/1997 à Rivière Cornillet / Taupont ;
- 100 le 21/12 au Petit Loc'h / Guidel ;
- 62 le 26/01/1998 à Saint-Déron / Ploemeur.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (1 donnée)

Quelques centaines avec les verdiers le 13/02/1998 à Rivière Cornillet / Taupont.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (5 données)

De décembre à février, des regroupements sont notés :

- 65 en vol erratique à Saint-Déron / Ploemeur le 15/12/1997 ;
- 80 le 21/12 au Petit Loc'h / Guidel ;
- 24 le 10/01/1998 à Kerhillio / Erdeven ;
- 16 le 26/01 à Saint-Déron / Ploemeur ;
- plus de 50 le 16/02 à Kerdréan-Lochrist / Hennebont.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (5 données)

Saint-Mathurin / Ploemeur accueille les 17 premiers oiseaux le 27/11/1997. Présent en petit nombre en décembre (5 le 06/12 puis 15 le 10/12/97 à Kerzec Izel / Quéven) et en janvier (2 en rivière de Noyalo le 10/01/1998 ; 3 (2 mâles) à Vannes le 26/01.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (6 données)

5 données de janvier pour Vannes, Ploemeur, Plouhinec et Sarzeau.

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (3 données)

Noté à l'unité en janvier, février et mars à Brec'h, Guilliers et Locoal-Mendon.

Bruant zizi *Emberiza cirrus* (3 données)

Peu de données, mais elles regroupent plusieurs individus, contrairement au Bruant jaune : 3 le 24/01/98 à Liérou / Guilliers et 7 à Saint-Déron / Ploemeur.

Bruant des roseaux *Emberia schoeniclus* (7 données)

- 5 le 21/12/1997 au Petit Loc'h / Guidel ;
- 2 le 09/01/1998 à l'étang de Saint-Jean / Locoal-Mendon ;
- 14/02, 6 individus à Boderhaff / Le Tour du Parc ;
- 14/02, 1 individu sur les lagunes de Pénestin ;
- 10-15 individus dans les haies de Le Lic / Damgan le 21/02.

Les premiers chants sont ouïs le 01/03 à Brec'h et le 07/03, 3 à Men Armor / Penestin.



ACTIVITES DU G.O.B MORBIHAN

UN SEJOUR SUR L'ÎLE D'HOËDIC, OCTOBRE 1998

Les 23, 24 et 25 octobre 1998, quelques observateurs du Groupe Ornithologique Breton se sont rendus sur Hoëdic, la météo du moment ne s'est pas montrée clémente : pluie et vent jusqu'au dimanche 25 réduisaient les chances de noter quelques passages migratoires.

A. Oiseaux de mer

Malgré le gros temps, la faible visibilité et même la difficulté à se poster sur la côte plusieurs espèces ont été vues :

* du bateau, entre Hoëdic et Quiberon, le 25/10, 1 Plongeon imbrin, 1 Puffin sp, 12 Macreuses noires, 1 Mouette tridactyle.

* le guet à la mer à partir de la pointe du Vieux Château n'a duré que quelques dizaines de minutes, suffisantes pour contacter quelques dizaines de Fou de Bassan et 3 Grands Labbes en vol vers le sud.

B. Passereaux migrants

Aucun passage de grande ampleur n'a été repéré, empêché vraisemblablement par le temps. On peut penser que les Rougequeue noirs et les Rougegorges familiers présents dans les landes, les jardins et le bourg étaient en instance de départ, obligés à prolonger la pause sur l'île. Il peut en être de même pour les Pipits farlouses visibles sur les côtes et le groupe de 30 P. maritimes au Vieux Port. Les curiosités du moment auront été l'Hypolaïs poyglotte, une Fauvette grisette, deux Hirondelles de rivage et plusieurs Serins cinis.

C. Rapaces

- 3 Faucons émerillons retenus sur l'île la survolent à toute heure et chassent.
- une femelle de Faucon pèlerin tente de capturer un Huitrier pie sur la côte sud.
- 2 à 3 Busards des roseaux autour de Beg Lagad.
- une paire de Faucon crécerelle (femelle et mâle) au fort.

Liste des espèces observées :

Plongeon imbrin,
Puffin sp,
Fou de Bassan,
Grand Cormoran, Cormoran huppé,
Aigrette garzette, Héron cendré,
Canard colvert, Macreuse noire,
Busard des roseaux, Faucon crécerelle, Faucon émerillon, Faucon pèlerin,
Perdrix grise, Faisan de Colchide, Râle d'eau, Foulque macroule,
Huitrier pie, Pluvier argenté, Courlis cendré, Tournepierre à collier,
Grand Labbe, Goéland brun, Goéland argenté, Mouette tridactyle,
Pigeon ramier, Alouette sp, Hirondelle de rivage, Pipit farlouse, Pipit maritime,
Bergeronnettes grise et de Yarrell, Troglodyte mignon, Accenteur mouchet, Rougegorge
familier, Rougequeue noir, Tarier pâle, Merle noir, Grive musicienne, Bouscarle de
Cetti, Hypolaïs polyglotte, Fauvette pitchou, Fauvette grisette, Mésange bleue, Pie
bavarde, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Pinson des arbres,
Serin cini, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Bouvreuil
pivoine.

Coordination du séjour et des observations : Yannick ORDUREAU.



NOTES DE TERRAIN

OBSERVATION D'UN TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) A VANNES, 09 ET 10 SEPTEMBRE 1998

François URVOAZ

Depuis maintenant plusieurs années, le mois de septembre me pousse à être plus vigilant concernant les hôtes du jardin. Chaque année à la même époque, des Rougequeues à front blanc, des Gobemouches noirs ou gris, s'arrêtent quelques jours afin de refaire leur plein d'énergie avant de poursuivre leur migration vers le sud.

Le 9 septembre dernier, mon étonnement fut grand, lorsque je repérai sur la pelouse jaunie une masse grisâtre rayée de bandes noires qui semblait immobile. Je me précipitai sur ma longue-vue et là, à dix mètres, accroupi sur l'herbe, un torcol se gavait de fourmis, s'arrêtant par instants, aux aguets, pour reprendre aussitôt son activité gloutonne.

Ce qui frappe chez cet oiseau, c'est sa faculté à se fondre dans le milieu et ses attitudes figées, le cou tendu dans une immobilité étonnante faisant volontiers penser à un reptile. Ce torcol se contentait de s'asseoir sur la fourmilière, et tantôt picorant, tantôt dardant une fine langue rose, il semblait aspirer parmi les brins d'herbe les insectes affolés.

Il est demeuré deux jours, présent du lever du soleil à la tombée de la nuit, puis ses réserves faites, profitant de vents porteurs, il a disparu comme il était venu, ne laissant derrière lui que les souvenirs des observateurs qui eurent la chance de pouvoir l'examiner de si près et ce modeste compte- rendu.

L'AVIFAUNE DES PORTS DE LORIENT PENDANT LES SAISONS DE NIDIFICATION 1997 et 1998

DÉRIAN Gwénaél

LA SITUATION

Les ports de Lorient occupent une surface d'environ 130 hectares séparée des quartiers de la Nouvelle-Ville, Carnel et le Parco par une voie ferrée et une route large qui l'individualisent dans le paysage. Le bâti est dense et consiste en quais, entrepôts et hangars d'affectation artisanale, magasins et ateliers de production. De larges rues facilitent le trafic routier et l'une de ces avenues est bordée d'habitations. Entre la rivière du Ter et le Scorff, la pointe de Kéroman est prise en écharpe du nord vers le sud-est par la base des sous-marins, le port de pêche avec ses criées et ses magasins de marée, le terminal pétrolier et le port de commerce spécialisé dans l'importation de matières premières agro-alimentaires, enfin les pontons de plaisance dans l'avant-port jouxtent l'arsenal et le port militaire.

Au printemps 1997 et plus assidûment en 1998, j'ai recherché les indices de nidification au cours de visites répétées des zones accessibles au public, la plupart du temps le matin ou après l'arrêt des activités le soir.

LES RESULTATS

Les indices de nidification recueillis définissent trois catégories suivant que l'espèce est vue sur le terrain d'étude pendant la période de reproduction, puis que sa nidification est probable ou certaine.

Grand Cormoran
Canard colvert
Faucon crécerelle
Chevalier guignette
Pigeon ramier
Hirondelle rustique
Pipit farlouse
Traquet motteux
Pouillot véloce
Choucas des tours
Corneille noire
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse

Tab. 1 : espèces présentes pendant les périodes de nidification 1997 et 1998, 13 espèces.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Le Grand Cormoran utilise toute l'année, avec de fortes variations d'effectifs, les reposoirs diurnes et les dortoirs du port militaire. Les oiseaux présentent des plumages d'immatures ou de reproducteurs.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Quelques individus sont observés sur les colonies de goélands.

Tourterelle turque	Chants
Bergeronnette de Yarrell	Parades
Pinson des arbres	Chanteurs
Serin cini	Parade
Verdier d'Europe	Chanteur

Tab. 2 : nidification probable en 1997 ou 1998, 5 espèces.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Elle fréquente le port de commerce pendant l'hiver, plusieurs centaines d'individus se rassemblent sur les quais de débarquement et autour des entrepôts où ils se nourrissent de graines, farines et autres matières destinées à l'alimentation animale. Mais l'espèce disparaît presque complètement pendant la saison de reproduction. Elle niche dans des arbres et bosquets en périphérie de la zone étudiée (J.C).

Bergeronnette de Yarrell : voir B. grise.

Petit Gravelot	Jeunes à l'envol
Goéland brun	Jeunes à l'envol
Goéland argenté	Jeunes à l'envol
Goéland marin	Jeunes à l'envol
Pigeon biset	Jeunes
Martinet noir	Visites de cavités
Cochevis huppé	Jeune
Hirondelle de fenêtre	Nids occupés
Pipit maritime	Jeunes
Bergeronnette grise	Jeunes
Accenteur mouchet	Jeune
Rougequeue noir	Jeune
Merle noir	Jeune
Grive musicienne	Transport de sac fécal
Pie bavarde	Jeune
Etourneau sansonnet	Transport de nourriture
Moineau domestique	Nids occupés

Tab. 3 : nidification certaine en 1997 ou 1998, 17 espèces.


Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Il s'est reproduit en 1996 et 1997, au même endroit.

En 1997, un couveur est découvert le 03/05 sur une aire de remblais du port de commerce. Mais dès le 06/05, un engin de terrassement stationne sur le nid. Suite à cette destruction le Petit Gravelot disparaît pendant un mois ; le 07/06 un nouveau

couveur est couché à quelques mètres du premier emplacement. Le couple produit 3 à 4 poussins et conduit à l'envol 2 jeunes vus à la fin de juin. Les adultes quittent l'endroit en même temps. Des observations sur la vasière du Rohu / Lanester et à Pen Mané / Locmiquélic (J.C) peuvent se rapporter à ces individus, avant le départ pour les quartiers d'hiver.

La construction d'un entrepôt a fait disparaître cette dernière aire nue du port, il n'y a pas eu de reproduction en 1998.



B.S.M	Base des sous-marins
PP	port de pêche
TP	terminal pétrolier
PC	port de commerce
PL	port de plaisance
VF	voie ferrée
—	avenue de la Perrière
①	reposoir et dortoir de Grands Cormorans
②	grand silo
③	parc à bois
④	quai du Pourquoi Pas ?
⑤	Phares et Balises

Carte 1 : situation des ports de Lorient

Goéland brun *Larus fuscus*

Nicheur depuis 1990 (6 nids).

En 1998, le recensement systématique ⁽¹⁾ a totalisé 61 nids de Goélands bruns à Lorient : 48 sur les ports proprement dits, 12 sur la base des sous-marins (B.S.M), 1 sur une épave. Ils s'installent sur les toits des bâtiments portuaires, colonisent de nouvelles surfaces par rapport à 1997. Les nids sont isolés à côté ou parmi ceux des G. argentés mais souvent un même toit accueille plusieurs nids de G. bruns.

Sur un échantillon de 14 couples producteurs, 19 poussins ont été vus et 16 jeunes volants soit 1,6 jeune à l'envol par couple producteur.

Goéland brun x G. argenté : un couple hybride a donné trois jeunes volants en 1998.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Nicheur depuis 1982.

Lorient compte maintenant parmi les importantes colonies urbaines de Goélands argentés. La première reproduction authentifiée remonte à 1982 et en 16 ans l'effectif a atteint presque un millier sur l'ensemble de la ville.

En 1998, les observateurs ⁽¹⁾ ont compté 482 nids de G. argentés sur les zones portuaires et 439 sur la B.S.M. Quelques couples s'installent sur les épaves militaires.

Sur un échantillon suivi, la production a été de 1,25 jeune par couple installé et 1,47 jeune par couple producteur.

Goéland marin *Larus marinus*

7 nids en 1998, sur la B.S.M (2) et les ports (5). Les nids occupent une position dominante sur les toits ⁽¹⁾. Cette espèce est d'installation récente à Lorient (1995 ?).

Pigeon biset (des villes) *Columba livia*

Les bâtiments de la base des sous-marins hébergent de nombreux couples (dizaines ? centaines ?) du pigeon des villes qui s'y reproduit sur les corniches ou les multiples cavités des constructions.

Martinet noir *Apus apus*

Si l'espèce occupe par ses vols bruyants le ciel des ports au printemps, sa reproduction n'y était pas soupçonnée. Pourtant, un individu, le 21/06/98, par ses allées et venues répétées dans une cavité amène à supposer la nidification sous la dalle du bloc K3 de la base des sous-marins.

Le 08/07, deux martinets vont et viennent devant ce bloc, sans, cette fois, y entrer.


Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

En 1995, plusieurs contacts ont pu faire envisager la nidification du martin-pêcheur sous les quais du port de commerce ^(J.C).

Cochevis huppé *Galerida cristatus*

La présence du cochevis est depuis longtemps établie, de loin en loin suivie, à Lorient. Actuellement, il n'en resterait plus de façon permanente qu'au port de commerce. Encore est-ce en petit nombre, 3 au maximum ^(J.C). Etablis entre le grand silo et le parc à bois de l'avenue Le Bourhis, ces derniers individus sont visibles tout au long de l'année, les interactions sont rares, il est peu fréquent d'en voir plusieurs ensemble.

Pourtant, le 11/07/1998, un groupe de 3 cochevis est composé de deux adultes et d'un jeune avec des restes de duvet. Il est probable, très probable, que l'espèce disparaisse sous peu.



Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Cette hirondelle n'est pas abondante à Lorient, une recherche incomplète en 1995 a localisé une petite colonie dans le quartier militaire. Ce sont ces hirondelles qui viennent chasser et s'abreuver dans le port proche.

C'est donc une connaissance nouvelle que l'existence d'une trentaine de nids installés sous l'auvent et les alvéoles du bloc K3 de la base des sous-marins (J.C) en juin 1998.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

Quelques enrochements le long des quais, de faible étendue, suffisent à l'installation d'au moins deux couples de Pipit maritime.

Couple 1, quai du Pourquoi Pas ? : présent dès le 28/02/98 (avant ?) ; un jeune volant quémante auprès d'un parent tandis que l'autre adulte parade et chante, le 09/06.

Couple 2, terminal pétrolier : contacté à partir du 15/03/98 ; un chanteur le 01/05 ; un jeune en acquisition de plumage le 14/07.

Bergeronnette grise *Motacilla a. alba* et *Motacilla a. yarrellii*

C'est une espèce d'observation courante en hiver, sous ses deux formes. En 1998, des recherches autour des quais de débarquement ont trouvé au moins cinq familles de jeunes volants (3 fois 1, 2 fois 3) entre les 20/06 et 11/07. Les nids n'ont pas été

recherchés, il ne s'agit donc que des couples qui ont réussi leur reproduction et qui ont gagné cette zone riche en nourriture même s'ils ont pu nicher ailleurs.

La forme *yarrellii* est encore présente hors de la saison d'hivernage : le 23/02 une paire *yarrellii* / *alba* semble unie; le 21/06 un mâle *yarrellii* parade devant une femelle *alba* occupée d'ailleurs par un individu juvénile qui quémande.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

L'espèce est visible, en petit nombre, toute l'année. Le 23/06/1998, un mâle chante dans un parc à bois où au moins un jeune volant est trouvé le 11/07. Il présente un plumage incomplet, est accompagné d'un couple.

Le Rougequeue noir se reproduit régulièrement vers le parc des Phares et Balises depuis au moins 1995.

CONCLUSION

Le total des espèces présentes ou nicheuses est peu élevé ($N = 35$), sans doute à mettre en relation avec la faible extension des friches, terre-pleins et autres terrains vagues que l'on rencontre ailleurs, dans des contextes portuaires plus étendus (Brest, Dunkerque). Cela expliquerait l'absence d'espèces comme la Linotte mélodieuse, l'Alouette des champs ou le Pipit farlouse. L'aménagement en cours des ports lorientais accentuera ce caractère puisque des bâtiments seront détruits, d'autres levés mais l'exiguïté des lieux exclut qu'y subsistent des terrains inoccupés.

Outre la modestie de sa composition, l'avifaune recensée ici se caractérise par la forte colonie de laridés et la subsistance (l'unique localité du Morbihan ?) de la reproduction du Cochevis huppé.

(J.C) information de Jacques Corbière.

(1) Jean-Paul Aucher, René Bozec, Jacques Corbière, Pierre Corlou, Robert Hegen, Gwénaél Dérian.

BIBLIOGRAPHIE :

Ar Vran Morbihan n°1 - Année 1990

Cadiou (B.) 1995. - Reproduction des goélands en milieu urbain. *Alauda*, 3. 1997.

DOCUMENTS

DIRECTIVE HABITATS, RESEAU NATURA 2000, ZPS et ZICO DU MORBIHAN

Source : Direction Régionale de l'Environnement

N° ZONE	DENOMINATION
ID001	Complexe des Montagnes Noires
ID003	Forêt de Paimpont - Camp de Coëtquidan
ID004	Ellé
ID005	Forêt de Quénécan - Vallée de la Poulancre - Landes de Liscurs et gorges du Daoulas
IR002	Marais de Vilaine - Cours inférieur de l'Oust et de l'Arz
IR003	Estuaire de la Vilaine
56001	Scorff - Forêt de Pontcalleck - Sarre
56002	Massif dunaire de Gâvres - Plouhinec
56003	Rivière d'Etel
56004	Golfe du Morbihan - Côte ouest de Rhuys
56005	Rivière de Pénerf - Marais de Suscinio
56006	Île de Groix
56007	Belle-Île-en-Mer
56008	Archipel de Houat/Hoëdic - Pointe du Conguel
56009	Forêt de Floranges, Camors, Lanvaux - Bocage de Larson et rivière le Tarun
56010	Tourbière et lande du Pinieux
56011	Landes de Meucon
56013	Massif forestier des landes de Lanvaux / Molac / Pleucadeuc - Vallée d'Arz
56014	Laïta - pointe du Talut - Etang du Loc'h et de Lannéac
56015	Estuaires du Blavet et du Scorff
56019	Etang au Duc

Tableau 1 - Directive Habitats, réseau Natura 2000

ZPS = Zone de Protection Spéciale ; ZICO = Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

Commune	N°zone	ZICO	N°zone	ZPS
BADEN			206500	Golfe du Morbihan
VANNES			206500	Golfe du Morbihan
ARRADON	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
LE HEZO	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
ILE D'ARZ	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
LARMOR-BADEN	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
SAINT-ARMEL	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
SARZEAU	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
SENE	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206500	Golfe du Morbihan
SURZUR	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206510	Etier de Pénerf
LE TOUR-DU-PARC	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf	206510	Etier de Pénerf
ARZON	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf		
ILE-AUX-MOINES	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf		
THEIX	BT14	Golfe du Morbihan et étier de Pénerf		
AMBON	BT16	Baie de Vilaine	206510	Etier de Pénerf
DAMGAN	BT16	Baie de Vilaine	206510	Etier de Pénerf
BILLIERS	BT16	Baie de Vilaine	206700	Baie de Kervoyal et de Vilaine
MUZILLAC	BT16	Baie de Vilaine	206700	Baie de Kervoyal et de Vilaine
PENESTIN	BT16	Baie de Vilaine	206700	Baie de Kervoyal et de Vilaine
GAVRES	BT18	Rade de Lorient	206530	Rade de Lorient
LOCMIQUELIC	BT18	Rade de Lorient	206530	Rade de Lorient
PLOUHINEC	BT18	Rade de Lorient	206530	Rade de Lorient
RIANTEC	BT18	Rade de Lorient	206530	Rade de Lorient
KERVIGNAC	BT18	Rade de Lorient		
LANESTER	BT18	Rade de Lorient		
LARMOR-PLAGE	BT18	Rade de Lorient		
ORIENT	BT18	Rade de Lorient		
PORT-LOUIS	BT18	Rade de Lorient		
CARNAC	BT19	Baie de Quiberon		
LOCMARIAQUER	BT19	Baie de Quiberon		
PLOUHARNEL	BT19	Baie de Quiberon		
QUIBERON	BT19	Baie de Quiberon		
SAINT-PHILIBERT	BT19	Baie de Quiberon		
ST-PIERRE-QUIBERON	BT19	Baie de Quiberon		
LA TRINITE-SUR-MER	BT19	Baie de Quiberon		

Tableau 2 - ZICO et ZPS

