



29.S

n° 7

Bulletin n° 7


Sommaire

- p. 1 Actualités ornithologiques du 16 juillet 1982
au 15 novembre 1982 (B. Bargain, X. Grémillet,
M. Cossec, J. Henry, P. Le Floc'h).
- p. 25 Tentative de parasitisme (kleptoparasitisme) d'un
busard saint martin par un faucon émerillon (X.
Grémillet).
- p. 28 Données de langage.
- p. 31 Prospection des immatures au sein d'une colonie
de guillemots de troil

Les illustrations

sont de Claude Tanneau (Le Guilvinec), et representent:

- page de garde: un blongios nain,
- p. 3 bis: un héron cendré,
- p. 10 bis: un oedicnème criard,
- p. 16 bis: une guifette moustac
- p. 19 bis: une sterne caugek
- p. 20 bis: une chouette effraie,
- p. 27 bis: un martin-pêcheur,
- p. 30 bis: un macareux moine,
- p. 35 bis: un merle à plastron.



par Bruno BARGAIN, Michel COSSEC, Xavier GREMILLET, Jacques HENRY, Pierre LE FLOC'H.

Liste des observateurs, sauf omission: JP ANNEZO, B BARGAIN, JF BECHAUD, JP BEON, P CANEVET, R CARDIET, M COSSEC, F DEROUSSSEN, C DEVEAUX, P DUBOIS, X GREMILLET, F GOBAILLE, P GOFFART, J HENRY, L KERAUTRET, P LE FLOC'H, R LE FUR, JL L'HEUEDER, P LE MAO, J MAOUT, M MERCERON, P NARZUL, A et R PERON, S POPINET, POUVISEIQUE LA FONTAINE, F POSTIC, A QUINN, A THOMAS, Y TREVoux.

PLONGEON IMBRIN (Gavia immer) 1 donnée
1 pointe de Tréfeuntec (Plonévez Porzay) le 1er novembre.

GREBE HUPPE (Podiceps cristatus) 8 données
1 seule donnée est à rattacher à la reproduction: 2 familles dans le Yeun Elez (Botmeur) le 18 juillet. Viennent ensuite des observations faites en des lieux où l'espèce se reproduit traditionnellement: 5 au Cranic (Auray /56) le 22 août, 4 à Trunvel (Tréogat) le 07 sept., puis 1 le 13 sept. Egalement 5 à Trunvel le 07 oct., au moins 4 dans le Yeun Elez le 23 oct. et 1 étang du Drenec (Sizun) le 28 oct.
Une seule donnée maritime: 1 à Tréboul (Douarnenez) le 1er nov.

GREBE A COU NOIR (Podiceps nigricollis) 7 données
Une nouvelle fois, une donnée estivale de l'espèce avec 4 ind. en plumage nuptial dans le Yeun Elez (Botmeur) le 18 juillet. Notons également 2 ind. au barrage du Drenec (Sizun) et 3 au Cranic (Auray /56) le 29 août, 1 à Nérizellec (Plovan) le 04 sept., au moins 4 dans le Yeun Elez le 23 oct. et enfin 1 à Trunvel (Tréogat) le 26 oct.

GREBE CASTAGNEUX (Podiceps ruficollis) 28 données

Si on excepte 2 ind. à Kerharo (Plomeur) le 22 juillet et 4 à Nérizellec (Plovan) le 25 juillet où l'espèce ne niche pas, mais pouvant venir des sites de nidification de la Baie d'Audierne, les 1ers mouvements post-nuptiaux d'importance sont notés dans le courant de la 2ème quinzaine d'août: 17 ind. à Nérizellec le 21, puis 24 le 23 et 30 le 30. D'autres observations sont faites, toujours sur les petits étangs de la Baie d'Audierne: à Nérizellec 17 le 26 août, 19 le 31, 15 le 04 sept., 12 le 10, 8 le 13, au moins 8 la 19 sept. et 9 le 06 nov.; à Kervardez (Plovan) 5 le 10 sept., au moins 12 le 19; à Poulguidou (Plouhinec) 5 le 24 sept. Notons fin octobre au moins 25 ind. en Rivière de Pont-l'Abbé et 16 sur l'étang de Kermor (L'Ile-Tudy).

GREBE ESCLAVON (Podiceps auritus) 1 donnée

1 ind. le 10 nov. plage de Pors Carn (Penmarc'h).

PETREL TEMPETE (Hydrobates pelagicus) 2 données

7 ind. le 22 juillet à 15 milles dans le SW de Penmarc'h (47°36 / 4°45) et 1 trouvé mort à terre dans le port de Camaret, dans le courant de la 2ème quinzaine de sept.

PUFFIN DES ANGLAIS (Puffinus p. mauretanicus) 1 donnée

80 ind. de 9h30 à 13h00 le 25 sept. à Feunteun Aod (Plogoff).

PUFFIN FULIGINEUX (Puffinus griseus) 2 données

2 en Baie d'Audierne le 18 août et 1 à la Torche (Plomeur) le 08 sept.

PETREL FULMAR (Fulmarus glacialis)

D'après l'annuaire des réserves bretonnes et normandes (1982 :SEPNB): "L'espèce continue sa phase d'expansion sur les côtes manche-atlantiques françaises. Cela se traduit par un nombre croissant d'individus présents dans les falaises et par une augmentation des sites de reproduction." La réserve MHJ (Goulien), qui n'avait pas vu d'envol depuis 1973, a vu durant la période de reproduction 1982 7 pontes soldées par 3 envols. Notons 1 ad. et 2 juv. le 26 août au Cap Sizun (Goulien).

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) 34 données


Les ières données ne concernent qu'un petit nombre d'individus: 1 imm. dans le Yeun Elez (Bot-meur) le 18 juillet, 4 ad. le 22 juillet à St Guénolé (Penmarc'h), 3 imm. le 25 juillet à Landévennec, puis à Trunvel (Tréogat) 2 imm. le 05 août, 6 le 07 sept., environ 15 le 11 sept. Des chiffres plus importants apparaissent les 2 dernières décades d'octobre avec environ 50 individus le 10 à Concarneau, puis à la mi-octobre 15/20 en Rivière de Pont l'Abbé, 70 à St Guénolé; notons encore 10 en Rivière de Pont l'Abbé le 17, 12 à Trunvel le 19, 20 en Rivière de Pont l'Abbé et 30 à Concarneau le 20, 30 en Rivière de Pont l'Abbé le 27, 15 à Lesconil et 1 à Brennilis le 29.

Au mois de novembre, ce sont au moins 23 oiseaux qui sont notés à Landévennec le 1er, 50 à St Guénolé le 03, 12 à Nérizelléc (Plovan) le 06, 25/30 à St Nonna (St Guénolé/Penmarc'h), 35/40 à Conq (St Guénolé) le 10 nov.

HERON CENDRE (Ardea cinerea) 49 données

. En Rivière de Pont l'Abbé: un comptage réalisé le 08 sept. à permis de dénombrer 28/30 nids.

Le suivi des effectifs est porté sur le graphe ci-dessous: 40 les 22 août et 11 sept., 120 le 17 sept., 120 le 03 oct., 100 le 24, 60 le 31, puis 40 le 11.



. Ailleurs: les observations proviennent presque exclusivement du littoral durant toute la période des présentes actualités, si on fait abstraction de 3 ind. dans le Yeun Elez (Botmeur) le 18 juillet et d'observations régulières de l'espèce le long de l'Aulne ou au dessus des landes des Montagnes Noires au niveau de St Goazec et de Laz en août, ainsi que les 23, 25 et 29 oct. Sur l'étang de Nérizellec (Plovan) ce sont 10 ind. le 22 juillet, 13 le 24, 12 le 1er août, 6/8 le 30, 10 le 10 sept., au moins 11 sur Nérizellec / Kervardez (Plovan) le 19. Retenons également 11 oiseaux au niveau de la brèche de l'étang de Trunvel (Tréogat) le 12 sept. et au moins 9 sur le Goyen (Pont Croix) le 10 août. Un imm. marqué à l'aide d'une plaque alaire (jaune, n° 769 - bague à Suscinio/56) a été observé à Nérizellec les 22 juillet, 23 et 30 août, et le 10 sept.

HERON POURPRE (Ardea purpurea) 6 données

1 ind. les 22 juillet et 13 sept. à Trunvel (Tréogat), 1 au Cranic (Auray/56) le 22 août, 4 à Trunvel le 12 sept., et 1 à Trunvel les 29 et 04 sept.

GRANDE AIGRETTE (Casmerodius alba) 7 données


concernant 1 ind. observé en Rivière de Pont l'Abbé les 24, 27, 28 et 31 oct., ainsi que les 1er et 04 nov. Notons parallèlement que l'espèce est également observée en Baie du Mont St Michel et en Baie de Bourgneuf durant cette même période.

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) 41 données

. en Rivière de Pont l'Abbé: en août 8 le 10, au moins 7 le 17, 7 le 22; en sept. 13 le 11 et 2 le 30; en oct. 7 le 03, 2 les 17 et 23, 4 le 24, 7 le 27, au moins 5 le 28 et 3 le 31; en nov. 3 le 1er et 5 le 11.

. en Baie d'Audierne:

- + à Nérizellec (Plovan): 1 les 22 juillet et 1er août
- + à Poulguidou (Pouldreuzic): 1 les 08 août, 07 sept. et 05 sept.
- * à Trunvel (Tréogat): 1 le 14 sept.
- + sur le Goyen (Pont Croix): 3 le 09 août, 13 le 10, 1 les 12, 13, 17, 17, 18 et 31. Notons encore 2 ind. à Ty Ru (Pont Croix) le 03 sept.



Ardia
cinnerea

- ailleurs: 2/4 ind. en Rivière de Daoulas du 28 août au 28 oct. et 2 le 09 oct. en Mer Blanche (Fouesnant).

De nombreuses observations de l'espèce ont donc été faites en différents lieux. La dispersion semble toucher notre région dans le courant de la 2ème semaine d'août. Il est intéressant de retenir que l'Aigrette Garzette est toujours présente en Rivière de Pont l'Abbé à la fin de la période.

BUTOR ETOILE (Botaurus stellaris) 3 données.

1 ind. le 07 sept. à Trunvel
(Tréogat), 1 à Kergalan (Plovan) le 08 sept. et 1 le 25 oct. à Trunvel.

SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia) 23 données

• en Rivière de Pont l'Abbé: 2 les 29 août et 17 sept., 1 imm. et 1 ad. le 19 sept., 2 le 17 oct., 2 ad. le 20 oct., 2 le 23 oct., 2 dont une juvénile le 27 oct., 2 le 31 oct. et enfin 2 le 11 nov.

• ailleurs: 1 juv. le 05 août à Trunvel (Tréogat), 1 le 12 août à Trunvel, 3 juv. au Petit Loc'h (Guidel/56) le 20 août, 1 au Stang Montfort (Trégunc) le 22 août, 2 les 25, 27, 28 puis 8 le 29 août à Trunvel, 1 juv. le 08 sept. à Nérizellec (Plovan), puis 2 juv. à Nérizellec et 2 à Trunvel le 10 sept., 2 à Trunvel le 14 sept., 2 à l'étang de Moulin Neuf (Plonéour-lanvern) le 20 sept.

CYGNE TUBERCULE (Cygnus olor) 5 données

concernant 1 ind. au moins en Baie d'Audierne du 23 août au 06 nov. et 7 ind. (4 ad. et 3 imm.) à l'étang de Priziac (56) le 04 nov.

OIE GRISE (Anser fabalis /albifrons)

1 "Oie des Moissons" (A. fabalis) est observée du 1er au 5 nov. sur l'étang du Drenec (Sizun) et 1 juv. "d'Oie rieuse" (A. albifrons), toujours sur l'étang du Drenec, le 28 oct.

Bien que possibles, ces 2 observations provenant de 2 personnes distinctes, laissent penser qu'il peut y avoir une erreur dans l'une des 2 déterminations.

BERNACHE CRAVANT (Branta bernicla) 7 données

1 à Fort Bloqué (Guidel /56) le 15 août, 10 plage de Kersiny (Plouhinec) le 10 sept., puis 7 les 20 et 23; en Rivière de Pont l'Abbé: 2 le 31 oct., puis 5 le 11 nov. Notons encore 1 ad. sur l'étang de Priziac (56) le 04 nov.

TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna) 18 données

provenant surtout de la Rivière de Pont l'Abbé avec 13 juv. et 2 ad. le 27 juillet, 1 juv. le 13 août, 3 ind. le 29 août.

Notons par ailleurs au mois d'août 3 ind. à Nérizellec (Plovan) les 24, 25 et 26, ainsi que 4 ind. en vol au dessus du Petit Loc'h (Guidel / 56) le 24. Une seule observation au mois de sept. avec 5 ind. à l'étang du Moulin Neuf (Plonéour-Lanvern)

Puis de plus nombreuses observations: en Rivière de Pont l'Abbé 1 le 17 oct., 1 ad. le 20 oct., 1 les 24 et 27, puis 16 le 31 et 12 le 11 nov.. Retenons encore 9 ind. le 1er nov. à Landevennec.

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) 11 données

Les données qui nous sont parvenues concernent des troupes parfois importantes de l'espèce, et probablement relatives à ses mouvements post-nuptiaux: 50 en vol à Lescors (Penmarc'h) le 24 juillet, 40 à Trunvel (Tréogat) le 05 août, puis 200 en vol au dessus de l'étang le 07, 200 au Stang Mont-fort (Trégunc) et au moins 100 à St Jean (Guidel) sont observés simultanément le 22 août. 70 à Trunvel le 12 sept. Deux données automnales, concernant le Yeun Elez (Botmeur): 430 le 23 oct. et 360 le 29.

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca) 12 données

Quelques données concernent le mois d'août; 4 à l'étang du Drenec (Sizun) le 22, puis au moins 15 à Trunvel (Tréogat) et 3 à Nérizellec (Plovan) le 31.

1 donnée le 25 sept. concerne un minimum de 100 ind. à Trunvel. En oct. 12 sont comptés dans le Yeun Elez (Botmeur) le 23, 2 sur l'étang du Drenec le 28, 1 dans le Yeun Elez le 29 et 20 en Rivière de Pont l'Abbé le 31.

En nov. 4 données, portant sur 20 oiseaux en Rivière de Pont l'Abbé le 1er, 5 à Trunvel le 09, 5 en Rivière de Pont l'Abbé le 11 et 65 le 14, ce qui marque sans doute l'arrivée d'hivernants dans notre région.

CANARD CHIPEAU (Anas strepera) 4 données

1 à Trunvel (Tréogat) le 05 août, 2 à Lannec (Ploemeur) le 20 août, 1 à Trunvel le 25 sept. et 1 femelle en Rivière de Pont l'Abbé le 13 nov.

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope) 8 données

1 ind. est noté à Trunvel (Tréogat) le 25 sept., puis 14 en Rivière de Pont l'Abbé le 08 oct., 3 le 17 20 le 23, 2 femelle/immatures le 27. L'arrivée de l'espèce ne se fait véritablement qu'à l'extrême fin d'octobre et au début de nov. avec 100 ind. en Rivière de Pont l'Abbé les 31 oct. et 1er nov., puis 150 le 11 nov.

CANARD SIFFLEUR AMERICAIN (Anas americana)

1 donnée concernant un individu bagué pull. le 08 août à Gagetown (New Brunswick - Canada) et tué le 12 sept. à Tréguennec.

CANARD PILET (Anas acuta) 4 données

En Rivière de Pont l'Abbé: 3 mâles et 5 femelles le 27 oct., 8 ind. le 31 oct. et 8/10 le 11 nov. Autrement 1 femelle est vue à Trunvel (Tréogat) le 09 nov.

SARCELLE D'ETE (Anas querquedula) 8 données

provenant toutes de Trunvel (Tréogat): 2 le 05 août, 20 le 07, puis 6 les 03 et 05 sept., 9 le 11, 25 le 13 et enfin 4 le 25.

CANARD SOUCHET (Anas clypeata)


seulement 4 données: 1 Stang Montfort (Trégunc) le 12 août, 2 au Petit Loc'h (Guidel /56) le 05 sept., 4 à Trunvel (Tréogat) le 11 sept. et 1 à Brennilis le 29 oct.

FULIGULE MILOVIN (Aythya ferina) 8 données

. à Trunvel (Tréogat): 3 le 25 sept., 10 le 06 oct., 35 le 22, 80 le 04 nov., 90 le 12 et 120 le 13.

cf. graghe


. ailleurs: 11 le 28 oct. et 8 le 29 oct. étang du Drenec (Sizun)



FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)

1 mâle le 29 oct. à Trunvel (Tréogat)

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 8 données



. à Trunvel (Tréogat) graghe ci-contre: 2 le 06 oct., puis 10 le 22. En nov.: 20 le 04, 25 le 12 et 80 le 13.

. ailleurs: une seule donnée au mois de juillet: 1 mâle dans le Yeun Elez (Botmeur) le 18. Autrement: 4 mâles et 7 femelles dans le Yeun Elez le 23 oct. et 10 mâles sur l'étang de Priziac (56) le 04 oct.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)

1 mâle à Douarnenez le 25 août.

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*) 2 données:

1 fem./imm. à la Torche (Plomeur)
le 10 nov. et 1 fem. à Moustierlin (Fouesnant) le 09 oct.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 7 données:

15 en vol SE dans le SW de Penmarc'h
(47°36 / 4°37) le 27 juillet, 2 à la hauteur de Nérizellec (Plovan)
le 05 sept. et 1 à Douarnenez les 12 et 13 sept.
1 fem. est observée dans le port de St Guénolé (Penmarc'h) le 03 nov
et sera vue durant une semaine ... 1 "autre" est vue sur le sable,
mazoutée, à Pors Carn (Penmarc'h) le 10 nov.
Notons une troupe d'au moins 60 à Tréfontec (Plonevez Porzay) le
1er nov., ce qui constitue la première donnée d'hivernage.

MACREUSE SP (*Melanitta* sp)

9 à Kerroc'h (Plomeur) le 10 oct.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*)

3 fem./imm. à L'Île Tudy le 28 oct.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 7 données, mais peu d'éléments exploitables.

Pendant toute la période, 2 cantonnements correspondant vraisemblablement aux 2 seuls secteurs de reproduction de la commune, sont relevés sur Laz.

Le 22 juillet à Nérizellec (Plovan) 1 ind., cette donnée peut se rapporter à la dispersion post-nuptiale de l'espèce - voire au début de la migration.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 14 données.

L'espèce est notée régulièrement pendant toute la période sur les communes de Laz, St Goazec et Chateauneuf-du-Faou (Montagnes Noires).

1 le 07 sept. à Trunvel (Tréogat), correspondant à la dispersion post-nuptiales ou à la migration.

Enfin, 1 fem. chasse un geai le 12 sept. à Coat-Compez (Brasparts) et 1 attaquant des bergeronnettes grises en dortoir à Chateauneuf-du-Faou le 26 oct.

AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis) 2 données

Une fem. capturant 1 pigeon ramier le 08 oct. dans les Montagnes Noires; 1 ind. le 23 oct. à Sizun.

BONDREE APIVORE (Pernis apivorus) 5 données

1 le 19 août à Landudec, 1 les 17 et 19 sept. à Laz et enfin 2, vraisemblablement des migrateurs, le 20 sept. à Roscouz (Plonéour-Lanvern).

BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus) 20 données

La plupart des observations proviennent des sites de nidification (Yeun Elez, Presqu'île de Crozon, Baie d'Audierne); notons 5 les 23 et 24 juillet dans le marais de Lescors (Penmarc'h) avec passage de proies et cris. Le 28 août à Kerloc'h (Crozon) une femelle et un mâle. Le 16 oct. un imm. sur les étangs de Trévignon (Trégunc). 1 imm. le 27 oct. dans l'anse du Poul-don (Combrit).

Enfin, Lannec (Plomeur /56) continue à être fréquenté par l'espèce: 1 fem. le 21 sept., 1 mâle le 14 oct. et 3 (1 mâle, 1 fem. et 1 imm.) le 20 oct.

BUSARD SAINT MARTIN (Circus cyaneus) 5 données

1 mâle le 24 juillet dans la vallée de l'Aulne (Laz), 1 mâle le 21 oct. dans le Yeun Elez (Bot-meur) et 1 fem. le 28 oct. à L'Île Tudy et dans l'anse de Combrit; il est possible que ces 2 dernières données concernent le même ind. Enfin, 1 le 09 nov. à Poulguidou (Plouhinec).

BUSARD CENDRE (Circus pygargus) 7 données


provenant toutes des secteurs de reproduction. En Baie d'Audierne, l'espèce est notée à plusieurs reprises pendant le mois de juillet avec un transport de nourriture le 26 à la pointe de la Torche (Plomeur). Les derniers oiseaux y sont notés les 02 et 03 août à Kerharo (Plomeur).

Sur le Menez Hom (Plomodiern), 1 fem. transporte une proie le 09 août.

BUSARD "CULBLANC" (Circus cyaneus-pygargus) 1 donnée

1 le 15 août à Laz.

Burhinus oedichenemus



FAUCON PELERIN (Falco peregrinus) 4 données

1 imm. le 23 sept. à la pointe du Raz (Plogoff), 1 les 30 sept., 17 et 27 oct. en Rivière de Pont l'Abbé.

FAUCON HOÛEREAU (Falco subbuteo) 1 donnée

1 le 05 sept. en arrière du Ster en Kérity (Penmarc'h), capturant une hirondelle des cheminées.

FAUCON EMERILLON (Falco columbarius) 7 données

Les 1ers oiseaux sont notés:

début oct. : 1 le 02 oct. sur la palud de Tréguennec, 1 le 05 à Trunvel (Tréogat) et un mâle à Laz dans la vallée de l'Aulne, 2 (1 mâle et 1 femelle) le 06 à Trunvel; puis 1 le 17 oct. au Courégant (Plomeur /56), 1 le 19 à Trunvel et 1 le 14 nov. à Keriak.

FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus) 10 données

Retenons le cantonnement

d'un juvénile ou d'un immature sur la commune de Laz du 26 oct. au 05 nov..

CAILLE DES BLES (Coturnix coturnix) 2 données

1 le 22 juillet à Nérizellec (Plovan) et 1 chant le 22 juillet à Kerbaro (Plomeur).

RALE D'EAU (Rallus aquaticus) 4 données

Il est possible que les oiseaux observés à Nérizellec durant la 1ère décade de sept. soient le reflet d'un passage: 1 le 08, 3 les 09 et 10.

MARQUETTE DE BAILLON (Porzana pusilla)

1 à Nérizellec (Plovan) les 08, 09, 10, 11 et 12 sept., ainsi que le 10 oct.

FOULQUE MACROULE (Fulica atra) 11 données

Malheureusement, aucun secteur n'est suivi pendant l'ensemble de la période. Nous ne retiendrons que les chiffres les plus importants, fournis pour les principales localités: 60 à l'étang de Drenec (Sizun) le 29 août, 250 à l'étang de Moulin Neuf (Plonéour-Lanvern) le 20 sept., 1750 à Trunvel (Tréogat) le 24 sept., 1180 sur les étangs de Trévignon (Trégunc) le 26 sept. et une cinquantaine sur l'étang de Priziac (56) le 04 nov.

HUITRIER PIE (Haematopus ostralegus) 19 données

Retenons uniquement les effectifs les plus importants

- à la pointe de Portzen (Camaret), 24 le 15 août,
- à Kérity (Penmarc'h), 29 le 30 juillet et au moins 130 le 20 oct.,
- en Rivière de Pont l'Abbé: 30 le 18 août, au moins 40 le 11 sept. et 35 le 20 oct.,
- à Concarneau: 30 le 26 sept., 60 le 10 oct. et 30 le 20 oct.,
- à Kerpape (Ploemeur /56) 30 le 02 sept.

Notons un ind. posé sur une lande rase à Plogoff le 09 août.

PLUVIER DORE (Pluvialis apricaria) 4 données

1ère observation le 11 sept.
avec 5 ind. à Gâvres (Plouhinec/56).

PLUVIER ARGENTE (Pluvialis squatarola) 18 données:

3 sites sont suivis régulièrement:

- la Rivière de Pont l'Abbe: 1ère observation le 17 août avec 1 ind., puis 25 le 27 août, 30 le 29 août, au moins 30 (70% en plumage nuptial) le 11 sept. A partir de la mi-sept., les effectifs sont nettement plus importants: 300 le 17 sept., 150 le 03 oct., 50 à 100 le 20 oct.
- le secteur allant de la pointe de Penmarc'h à Loctudy où l'espèce est présente et régulièrement répartie en faible nombre (quelques dizaines) de la mi-sept. jusqu'à la fin de la période.
- la Baie d'Audierne qui abrite un effectif de l'ordre d'une dizaine d'ind.

GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula) 26 données

Les 1ers groupes sont notés au début août avec 10 ind. le 03 à Fort Bloqué (Ploemeur /56), 20 le 06 août à Kérouiny (Trévignon /Trégunc), puis 60/80 le 10 à Léchiat en eau douce, sur un étang en retrait de la mer, 100 à 150 le 17 au Pouldon (Combrit), 300 à 450 du 20 au 27 dans l'estuaire du Goyen (Pont Croix).

En sept., retenons environ 30 les 07 et 09 à Trunvel (Tréogat), environ 50 le 19 à Nérizellec (Plovan) et au moins 60 le 21 à Fort Bloqué (Ploemeur /56).

En oct.: 41 le 06 à Guidel (Ploemeur), au moins 100 à Kérity à la mi-oct., ainsi que 20 le 17 au Guilvinec, 150 le 28 à L'Ile Tudy, 80 le 29 à Lesconil et 100 le 03 nov. à St Guénolé (Penmarc'h). Enfin 8 ind. dans une flaque d'eau sur un chaume de maïs à Poulguidou (Pont Croix).

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius) 1 donnée

1 ind. le 20 août au Petit Loc'h (Ploemeur /56)

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) 17 données

On note de forts rassemblements de fin juillet au début de sept. dans le Pays Bigouden: à Trunvel (Tréogat) 30 le 22 juillet, 102 le 05 août, 100 le 03 ~~sept.~~ 14 sept. à Pors Carn (Penmarc'h); à Nérizellec (Plovan) 19 le 22 juillet, 25 le 1er août et 45 le 04.

Après la mi-sept., les observations se raréfient et l'importance des bandes diminue: encore 10 le 28 sept. à L'Ile Tudy.

PLUVIER GUIGNARD (Eudromias morinellus) 4 données

On note un passage début sept. à la pointe de la Torche (Plomeur): 1 ad. et 3 imm. le 08, 7 ind. le 09, 11 le 10 et le 11, et 7 le 14. Remarquons que ces 11 ind. constituent la bande la plus importante observée en Bretagne jusqu'à ce jour.

TOURNEPIERRE (Arenaria interpres) 20 données

La 1ère observation est faite

le 22 juillet avec 2 ind.

Le passage est observé nettement du début août au début sept.:

18 le 04 août à Fort Bloqué (Ploemeur /56), 40 le 06 à Kérouiny (Trévignon /Trégunc), 14 le 10 à Léchlagat, 60 le 15 à Pen Hir (Camaret), 15 le 26 en Rivière de Pont l'Abbé, au moins 50 le 08 sept. à la pointe de la Torche (Plomeur).


Puis à l'exception de 45 ind. à Concarneau le 26 sept. les effectifs deviennent insignifiants.

Une augmentation des effectifs est perceptible fin oct. et début nov.: 20 le 17 oct. au Guilvinec, 60 le 20 oct. à Concarneau, au moins 100 le 21 à Kérity (Penmarc'h), 19 le 1er nov. à Landévennec, 50 le 03 nov. à St Guénolé, 55 le 07 à Concarneau, environ 20 le 10 à Penmarc'h.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 32 données

La plupart des observations proviennent des étangs de la Baie d'Audierne. Le passage débute à la fin juillet et les observations ne dépassent guère 10 ind. jusqu'à la fin d'août. Les effectifs deviennent plus importants de la fin août à la mi-sept.: 10 le 21 août à Nérizellec (Plovan), 15 le 23, 11 le 24, 20 le 26 à Kerharo (Plomeur), puis 30 à 40 le 03 sept., 10 le 09, 16 le 10 à Nérizellec et enfin 10 le 10 sept. à Kerharo.

Après la mi-sept., une seule donnée importante avec 22 ind. le 30 sept. à Lannec (Plomeur /56).



BECASSINE SOURDE (*Limnocryptes minimus*) 2 données

L'espèce est notée le 23 sept. à Trunvel (Tréogat) avec 1 ind. Également 1 ind. le 31 oct. en Rivière de Pont l'Abbé.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 15 données

Seule la Rivière de Pont l'Abbé est suivie régulièrement. On y note pendant toute la période de 200 à 400 ind.

COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus) 12 données

Quelques observations, concernant peu d'ind., surtout faites en Baie d'Audierne, s'échelonnent sur le mois d'août et le début de sept. Un maximum est noté vers la mi-août avec 150 ind. le 18 en Rivière de Pont l'Abbé et 12 au Petit Loc'h (Ploemeur /56) le 20 août.

Notons encore 5 ind. le 25 sept. à Trunvel (Tréogat).

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa) 2 données

1 ind. le 1er sept. au Petit Loc'h (Ploemeur /56) et 1 le 20 oct. en Rivière de Pont l'Abbé.

BARGE ROUSSE (Limosa lapponica) 9 données

2 ind. le 02 juillet à Nérizellec (Plovan) et 1 le 31 août au Petit Loc'h (Ploemeur /56).

Notons 15 ind. à la pointe de la Torche (Ploemeur) le 08 sept. et 10 à Trunvel (Tréogat) le 25 sept. qui semblent situer le maximum du passage.

Puis on observe 5 ind. le 17 oct. au Guilvinec, 5 le 20 oct. en Rivière de Pont l'Abbé et 5 le 21 oct. à Kérité (Penmarc'h).

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) 7 données


1 juv. le 26 août à Nérizellec, 1 ind. le 30 à Nérizellec, 2 le 03 sept. à Trunvel (Tréogat), 3 le 05 à Poulguidou (Pont Croix) et 1 autre le 07. Au moins 5 ind. le 11 sept. en Rivière de Pont l'Abbé et 1 le 23 à Kervardez (Plovan).

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) 17 données

Jusqu'à la mi-août les observations sont rares et concernent peu d'ind. Puis les effectifs deviennent plus importants: 11 le 13 août à Kérité (Penmarc'h), et 20 le 22 à St Jean (Auray /56).

La Rivière de Pont l'Abbé nous permet de suivre l'espèce: 50 le 26 août, au moins 40 le 11 sept., au moins 80 le 19 sept, 300 le 17 oct., 100 le 20 oct., 200 le 23, 300 le 31.

Notons 150 ind. le 1er nov. à Landévennec et 30 le 03 nov. à St Guénolé (Penmarc'h).



CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia) 25 données

1 seule donnée intérieure

avec 1 ind. le 29 août à Drenec (Sizun).

De fin juillet à début août, on observe l'espèce régulièrement mais en nombre réduit (de 1 à 4 ind.) en Rivière de Pont l'Abbé, sur le reste du Pays Bigouden et à Guidel (Ploemeur /56).

Du début août au début sept., les effectifs restent faibles (1 à 8 ind.), excepté en Rivière de Pont l'Abbé où 30 ind. sont comptés les 18 et 22 août.

A partir de la mi-sept., toutes les observations proviennent de la Rivière de Pont l'Abbé où des effectifs très importants sont notés: 150 le 17 et 100 le 03 oct., puis des bandes de 15 à 25 ind. régulièrement notées jusqu'à la fin d'oct.

Dernière observation: 1 le 14 nov. en Rivière de Pont l'Abbé.

CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus) 6 données

Comme chaque année, le passage

est observé de fin juillet à la mi-sept.: 1 le 25 juillet sur le décanthoir d'Ergué-Gaberic, 1 le 26 à Kerharo (Plomeur), 2 le 02 août à Kerharo, 1 le 02 à Kérity (Penmarc'h), puis 4/6 le 03 à Kerharo, 2 le 28 à Kerloc'h (Crozon), et à Kerharo 2 le 10 sept. et 1 le 14.

CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola) 23 données

Les seules observations inté-

-rieures proviennent de l'étang du Drenec (Sizun) avec 3 ind. le



Ehlicenia
hybrida

19 août et 2 le 22. Toutes les autres observations sont faites sur les côtes bigoudennes à l'exception d'un ind. le 02 août au Petit Loc'h (Guidel /Ploemeur-56).

Les observations sont régulièrement étalées de fin juillet à début oct., les effectifs restant toujours faibles: 1 le 25 juillet à Kerharo (Plomeur), 1 le 1er août à Nérizellec (Plovan), 2 le 02 puis 3 le 03 à Kerharo, 1 le 04 à Nérizellec; à Kerharo 6 le 06, 4 le 10, 2 le 12 et 2 le 27; à Nérizellec 2 le 04 sept., 3 le 07, 2 le 08, 4 le 09, 1 les 11 et 13; à Kerharo 1 le 19; puis 1 le 25 à Trunvel (Tréogat), 1 le 25 à Kervardez (Plovan) et 1 le 10 oct. à Kerharo.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 38 données

De la mi-juillet au 19 sept. des observations régulières sont faites sur l'ensemble des étangs littoraux et sur la côte sud finistérienne, avec un maximum de 14 ind. le 22 juillet à Nérizellec (Plovan). Notons 1 ind. le 17 sept. le long de l'Aulne à Laz (seule donnée intérieure qui nous soit parvenue).

Une donnée intéressante en oct.: 17 ind. le 20 oct. à St Maurice (Clohars-Carnoët). L'espèce est notée début nov. à Tréboul (Douar-nenez) et à Loctudy.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canatus*) 13 données

Les observations, réalisées surtout en Baie d'Audierne, s'étalent du 26 août au 05 oct. Elles ne concernent chaque fois que peu d'ind. (moins de 10) hormis 11 ind. le 28 août à Trunvel (Tréogat) et au moins 25 le 11 sept. en Rivière de Pont l'Abbé.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 12 données

1 donnée précoce: 1 ind. le 26 juillet à Kerharo (Plomeur). Puis 3 le 31 août à Trunvel (Tréogat) puis 2 les 03 et 04 sept., 7 le 07 et 7 le 09 puis 9 le 10 sept. -ce qui correspond à l'effectif maximum enregistré-; enfin à Trunvel 1 ind. les 24 et 25 (1 juv.), à Kervardez (Plovan) 2 le 25 et 2 (dont 1 juv.) le 10 oct. à Kerharo. ,

BECASSEAU SEMI-PALME (*Calidris pusilla*)

Anthony Quinn nous rapporte l'observation d'un ind. de l'espèce en Baie d'Audierne le 09 sept. (cf. article de l'observateur dans le n° 6 d'Ar Vran 29/3). Plusieurs mentions d'un bécasseau

semi-palmé en Baie d'Audierne, postérieures au 09 sept., nous sont également parvenues.

BECASSEAU TACHETE (Calidris melanotos) 5 données

En Baie d'Audierne: 2 le 14 août, 1 le 05 sept., 3 le 18, 1 juv. le 10 oct. et 3 ind. le 10 oct.

BECASSEAU VIOLET (Calidris maritima) 6 données

6 le 20 oct. à Concarneau, 1 le 23 à Kerroc'h (Ploemeur /56), 2 le 27 au Guilvinec, au moins 3 le 10 nov. à Penmarc'h, 1 le 10 à la Torche (Plomeur) et 14 le 21 au Guilvinec.

BECASSEAU VARIABLE (Calidris alpina) 21 données

Bien que les données soient peu expressives, retenons: 55 ind. le 22 juillet à la Torche (Plo-meur), 50 le 27 août dans l'estuaire du Goyen (Pont Croix), au moins 70 ind. le 19 sept. à Plovan et 200 le 20 oct. en Rivière de Pont l'Abbé.

BECASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) 14 données

Les observations s'étalent du 10 août au 19 oct.; elles concernent peu d'individus (1 à 3) à l'exception de 3 données: 9 ind. le 27 août en Baie d'Audierne, 12 le 23 sept. et 20 le 25 à Kervardez (Plovan) .

BECASSEAU SANDERLING (Calidris alba) 26 données

Le schéma reste le même que celui observé traditionnellement en Bretagne

1er passage, net fin juillet - début août :

40 ind. le 22 juillet au Guilvinec, 2/300 à Trunvel (Tréogat) le 22, 79 le 22 à Nérizellec (Plovan), 80 le 25 à Nérizellec, 70 à la Torche (Plomeur) et 65 plage de Pors Carn (Penmarc'h) le 30, 60 le 1er août à Kérouini (Trévignon /Trégunc), au moins 200 le 05 août à Trunvel et 200 le 06 à Kérouini.

2ème passage, plus étalé et avec des effectifs maxima plus faibles, de fin août à la fin sept.:

10 le 23 août à Nérizellec, 40 le 23 à la Torche, au moins

50 le 08 sept. et 70 le 09 à Trunvel; 60 à la Torche, 10 à Kervardez et 30 à Trunvel le 13; enfin 100 le 23 à Trunvel. En fin oct.-début nov. des effectifs importants apparaissent à nouveau sur les lieux d'hivernage bigoudens: au moins 200 le 20 oct. à Kérity (Penmarc'h), 100 le 1er nov. au Guilvinec, 100/120 le 10 nov. à la Torche (Plomeur).

BECASSEAU ROUSSET (*Tringites subruficollis*) 3 données

1 le 24 sept., 1 imm. le 25 et 1 le 03 oct. en Baie d'Audierne.

CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 9 données

Du 26 août au 04 sept.

1 ind. à Nérizellec (Plovan). Puis 1 à Trunvel (Tréogat) les 11 et 25 sept.; 1 femelle imm. le 19 sept. et 1 ind. le 25 à Kervardez (Plovan). Enfin 3 ind. le 25 sept. à Poulguidou (Pouldreuzic).

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) 1 donnée

1 ind. en Rivière de Pont l'Abbé le 17 août.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) 1 donnée

1 ind. le 17 août au Petit Loc'h (Guidel /Ploemeur-56).

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) 3 données

2 ind. à Fort Bloqué (Ploemeur /56) le 13 oct. et 1 les 12 et 13 nov. à Lespoul (Pont Croix).

GLAREOLE A COLLIER (*Glareola pratincola*) 1 donnée

2 ind. le 03 oct. à Nérizellec (Plovan).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 1 donnée

1 ind. pointe du Van (Clédem Cap Sizun) le 25 sept..

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) 1 donnée

2 ind. le 13 oct. à Kerroc'h (Ploemeur /56).

LABBE SP (*Stercorarius pomarinus /parasiticus*) 1 donnée

1 ind. le 08 sept. à la Torche (Plomeur).

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 3 données

Au moins 120 ind. le 31 août à Trunvel (Tréogat), 50 le 31 août à Pouldreuzic et 200 le 11 sept. à Trunvel.

GOELAND LEUCOPHÉE (Larus argentatus michahellis) 1 donnée

1 ind. le 25 sept. à Kerharo (Plomeur).

GOELAND BOURGMESTRE (Larus hyperboreus) 2 données

1 ind. de 3^{ème} année les 10 sept. et 07 oct. dans le port de Douarnenez.

MOUETTE MELANOCEPHALE (Larus melanocephalus) 10 données

Toutes les données

proviennent de la plage du Ris (Kerlaz): 2 imm. le 22 juillet, 1 juv. le 26 août, 1 juv. le 27; en sept. 2 ad. et 1 imm. le 08, 1 ad. et 1 imm. le 10, 1 imm. le 11, 4 imm. le 12, 1 ad. et 3 juv. le 13; en oct. 1 ad. et 10 imm. le 06, 1 ad. et 4 imm. le 07, 7 imm. le 31.

MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) 9 données

A partir du début sept., on observe régulièrement des ind. isolés: 1 ind. les 07 et 11 sept. à Trunvel (Tréogat), 1 le 18 en Rivière de Daoulas, 1 juv le 25 à Trunvel, 1 (2^{ème} année) le 07 oct. plage du Ris (Kerlaz), 1 le 04 nov. à Douarnenez, puis 3 ad. le 10 nov. à Penmarc'h, 3/5 le 10 à la Torche (Plomeur), et 2 imm. à Kerfeunteun - Tronoën (St Jean Trolimont).

MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla)GUÏFETTE NOIRE (Chlidonias niger) 7 données

3 ind. le 27 juillet dans le sud de Penmarc'h (47°36 / 4°37), 1 le 13 sept. à Kerharo (Plomeur), 1 le 21 sept. à Landévennec (Plomeur /56), 4 le 24 et 5 le 25 sept. à Trunvel (Tréogat), 3 le 26 sept. étangs de Trévignon (Trégunc) et 1 le 06 oct. à Trunvel.

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)

Retenons 3 données tardives: 2 le 20 oct. à Concarneau, 1 le 20 oct. à Kérity (Penmarc'h) et 5 le 28 oct. à L'Ile Tudy.


STERNE NAINE (Sterna albifrons) 1 donnée


1 le 27 août en Rivière de Pont l'Abbé.

STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis) 16 données

Notons seulement une bande de

Sterna
sandvicensis





80/100 le 25 juillet à Landévennec et les quelques observations tardives: 1 le 09 oct. à Fort Bloqué (Ploemeur /56), 1 le 10 oct. à Concarneau, 2 le 21 oct. à la pointe de Leydé (Douarnenez), 3 le 28 oct. à L'Île Tudy et 1 le 10 nov. à la Torche (Plomeur).

PINGOUIN TORDA (Alca torda) 3 données

1 le 03 août au Guilvinec, 3/4 le 10 nov. à la Torche (Plomeur) et 3 en vol S le 10 nov. à Penmarc'h.

MACAREUX MOINE (Fratrercula arctica) 1 donnée

7 adultes le 19 août dans le port de Douarnenez.

TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)

2 données seulement ... avec 20 ind. le 21 août à Nérizellec (Plovan) et au moins 20 le 07 sept. à Trunvel (Tréogat).

TOURTERELLE DES JARDINS (Streptopelia decaocto)

Retenons 36 ind. à Lannec (Ploemeur /56) le 30 sept.

COUCOU GRIS (Cuculus canorus) 1 donnée

1 nourrissage par 1 pipit farlouse à Kerbaro (Plomeur).

CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba) 3 données

1 ind. le 05 sept. à Loc'h ar Joie (Penmarc'h), 1 le 22 oct. à Kerhuif (St Thois) et 1 le 06 oct. à Kerlaz.

CHOUETTE CHEVECHE (Athene noctua) 1 donnée

1 ind. le 06 à Roquinou (Plobannalec).

CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco) 2 données

3 ind. le 17 sept. à Mellac et 1 chanteur à Kervagué (Plobannalec).

ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus) 1 donnée

1 chanteur à l'Île Chevalier (Pont l'Abbé) le 23 août.

HUPPE FASCIEE (Upupa epops) 3 données

2 données proviennent de secteurs où l'espèce est bien connue: le 03 août 1 ind. à Kerbaro (Plomeur) et le 04 sept. 1 ind. à St Vio (Tréguennec). Par contre l'observation d'un ind. à Meil Ster (Laz) semble plus intéressante, l'espèce n'a pas ce secteur durant l'enquête "atlas ni-

-cheurs" de 1970 à 1975.

TORCOL (Jynx torquilla) 2 données

Les observations proviennent une fois enco-
-re des secteurs habituels: 1 ind. à Plovan le 07 sept. et 1 à Les-
-conil le 13 sept.

COCHEVIS HUPPE (Galerida cristata) 3 données

Cette espèce devenue rare sem-
-ble mieux se maintenir sur la côte bigoudenne. Notons 3 ind. et
1 nourrissage à Lesconil le 24 août, 1 ind. au Guilvinec le 27 sept.
et 6 ind. à Lesconil le 29 oct.

ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis) 3 données

Le 28 oct. des mouvements
migratoires sont notés vers le SE toute la journée à L'Ile Tudy.
Le 09 nov. 200 ind. à Poulguidou (Plouhinec) et du 10 au 20 nov.
plusieurs bandes de 100 à 200 ind. à Kernelbet (Kerlaz).

PIPIT ROUSSELINE (Anthus campestris) 3 données

2 ind. le 09 sept., 1 le 10
et 1 le 13 en Baie d'Audierne.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea) 6 données

2 ind. le 22 août à Trévignon (Trégunc), 2 à Moulin Neuf (Plonéour-
Lanvern) le 20 sept., 2 à Douarnenez le 17 oct., 4 à Tréboul (Dou-
-arnenez) le 11 nov. et 2 à Concarneau le 07 nov.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (Lanius collurio)

Deux observations au même endroit en Rivière de Pont l'Abbé les
08 et 10 oct. et concernant à chaque fois un mâle.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (Lanius senator)

1 ind. le 31 août à Kergalan (Plovan).

PIE-GRIECHE GRISE (Lanius excubitor)

1 ind. à Trunvel (Tréogat) durant la dernière semaine d'août.

TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)

Plusieurs ind. à Kerharo (Plo-
-meur) le 10 sept. et 2 ind. à la Torche (Plomeur) le 13 sept.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)

Une estimation d'environ 100 ind. est faite le 14 sept. entre la brèche de Trunvel (Tréogat) et la Torche (Plomeur).

Autrement 1 ind. le 17 oct. à Trunvel, 10 le 21 à Kérity (Penmarc'h), 1 le 02 à St Guénolé et 1 le 08 nov. à Pont Croix.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) 11 données

Notons 1 chanteur le 14 août à Pen Hir (Camaret) et 1 ind au même endroit le 15.

L'espèce est bien représentée dans la 1ère semaine de nov. à Sizun, St Guénolé et St Pierre (Penmarc'h), à Lespoul (Pont Croix) et à Locudy.

GORGEBLEUE (*Luscinia svecica*) 1 donnée

Cette espèce pourtant bien représentée dans les marais de la Baie d'Audierne lors du passage post-nuptial (données de captures au filet) n'a donné lieu qu'à une seule observation: 1 ind. à Nérizellec (Plovan) le 09 sept..

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)

Le 02 nov. 1 ind. à Tréboul (Douarnenez). Dès la 1ère semaine de nov. l'arrivée de bandes de 50 à 60 ind. est notée dans les Montagnes Noires.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)

Capture d'un juvénile au filet à Trunvel (Tréogat) le 24 oct..

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)

1 mâle à St Pierre (Penmarc'h) le 18 sept., 5 à Lannec (Plomeur / 56) le 21 sept. et une fem. au Guilvinec le 03 oct.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)

2 ind. au Guilvinec le 03 oct.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*)

Une donnée concernant une bande de 25 ind. en Rivière de Pont l'Abbé le 11 sept.

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)

1 donnée concernant 1 mâle au Loc'h (Plogoff) le 19 août.

BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) 11 données

1 mâle à la pointe du Van (Cléden Cap Sizun) le 23 sept.; 1 mâle pointe du Raz (Plogoff) le 23 sept., 1 à Trunvel (Tréogat) le 25, 4 à Nérizellec (Plovan) et 4 à Trunvel le 03 oct., 7 à Trunvel et 4 à Nérizellec le 05, 50 à Trunvel le 19 oct. et 1 mâle dans le Yeun Elez (Botmeur) le 23 oct.

VERDIER (Carduelis chloris)

Retenons seulement 50 ind. à Mahalon sur un chaume de maïs le 08 nov.

CHARDONNERET (Carduelis carduelis)

Plusieurs bandes d'une centaine d'ind. en Rivière de Pont l'Abbé le 19 sept. et 30 ind. à Penenguer (Pont Croix).

SERIN CINI (Serinus serinus)

Au moins 20 à Lannenec (Ploemeur-56) le 17 oct. et 20 à Penenguer (Pont Croix) le 08 nov.

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

Formation d'un dortoir traditionnel de plusieurs millions d'ind. à Trimen (St Goazec) à partir de la mi-oct.

CRAVE A BEC ROUGE (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 5 données

8/9 à la pointe de la Tavelle (Camaret) le 08 août; à Pen Hir (Camaret) 1 le 08 et 13 août et 3 ind., dont 1 imm., le 15 août. Notons encore à Pen Hir 2 ad. le 02 sept.

CORNEILLE NOIRE (Corvus corone)

Une donnée concernant environ 60 ind. tous en mue (absence de juv.) le 27 juillet à Laz.

Une autre portant sur au moins 150 ind. au dortoir traditionnel du bois de Moniven (Laz) à la mi-oct.

GRAND CORBEAU (Corvus corax) 4 données

1 à Nérizellec (Plovan) le 31 août, 1 au Petit Loc'h (Guidel /Ploemeur-56) le 06 oct., 2 à Trunvel (Tréogat) le 23 oct. sur un cadavre de mouette rieuse, puis 2 le 26. Enfin 2 à Landévennec le 1er nov.

TENTATIVE DE PARASITISME (kleptoparasitisme) D'UN BUSARD ST MARTIN
(*Circus cyaneus*) PAR UN FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*)

Préambule: cette observation restera volontairement sans
précision de date et de lieu.

OBSERVATION

Le site est une vaste lande mésophile de Bretagne, de végétation peu élevée (0,5 à 1 m.) - *Ulex gallii*, *Molinia caerulea*, *Erica ciliaris*, *Calluna vulgaris*, etc.- parsemée de quelques *Pinus nigra* peu nombreux, isolés et rabougris. Cette lande est bordée par une autre lande, de végétation plus haute - *Ulex europaeus*, *Quercus pedunculata*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica*, *Betula*, etc.-

Au début juillet, vers 10h. solaire, caché dans la lande boisée, à 40 m. environ d'une aire de Busards st martin, j'observais le mâle et la femelle qui chassaient respectivement à 200 et 500 m. de moi. Les poussins, âgés vraisemblablement d'au moins 4 semaines (âge à partir duquel les parents leur apportent la nourriture non préparée) étaient cachés, invisibles et silencieux dans la végétation.

Le mâle revint avec une proie (oiseau de la taille d'un pipit) directement vers le nid à 3 ou 4 m. d'altitude. Au dessus de l'aire, il émit de faibles cris de nourrissage auxquels les jeunes répondirent, puis lâcha sa proie. A ce moment, sans que je l'aie vu venir, un faucon émerillon (femelle adulte ou juvénile) plongea impétueusement et silencieusement, à mi hauteur entre le busard et l'aire, sur la proie sans importuner autrement ni les poussins, ni l'adulte.

Le piaillage des poussins cessa immédiatement. Le mâle fonça sur le faucon en poussant de violents "caquètements". La femelle cessa alors sa quête louvoyante au dessus de la lande pour se diriger vers l'aire.

Le faucon émerillon, en poussant des cris agressifs, décrivit un cercle à 1,5 m. du sol, évitant ainsi les attaques du busard, et repartit bredouille en ligne droite pour se percher à la cime d'un pin dans une lande boisée située à quelques 100 m. de l'aire. Il y restera 1 à 2 minutes avant de s'envoler et de disparaître de l'autre côté de la lande.

Ayant suivi le faucon aux jumelles, puis à la longue vue, j'ignore ce que fit le busard pendant ce temps, sinon qu'il ne cessa pas de pousser des cris et qu'il ne poursuivit pas le faucon.

Après la disparition de l'émerillon, j'ai constaté la présence de la femelle auprès du busard mâle. Tout deux tournoyaient à 2 ou 3 m. du sol, silencieusement, au dessus de l'aire.

La femelle reprit rapidement sa chasse, alors que le mâle survola la lande dans un rayon de 100 m. autour de l'aire. Il se posa à 80 m. de celle ci sur un pin noir rabougris. Il y restera 10 à 15 minutes pour reprendre ensuite sa chasse, tout en restant à portée de vue du nid -du moins pendant les 20 minutes que ma présence dura encore.

CONDITIONS D'OBSERVATION

Le temps était très clair, ensoleillé, chaud avec un léger vent d'ouest. J'avais le soleil de 3/4 arrière et étais à l'ombre (aucun éblouissement, bonne visibilité, champs visuel libre).

L'observation a été réalisée avec des jumelles 7-50 et une longue -vue 60.

DISCUSSION

1. Le Faucon Émerillon est bien connu pour son caractère agressif, impétueux et intrépide. D'autre part cette espèce est capable de s'emparer de proies débusquées par d'autres rapaces et occasionnellement de piller les nids. Par contre, je n'ai pas trouvé de mention de Faucon Émerillon dérobant une proie morte à un autre prédateur. La présente observation est-elle une tentative de cet ordre ou simplement l'agression d'un Busard st martin lors d'un nourrissage. Les apparences sont nettement en faveur de la 1ère hypothèse, le faucon n'ayant en effet jamais attaqué directement le busard.

2. Le Busard st martin opère régulièrement ce type de larcin aux dépens d'autres rapaces, mais il ne semble pas qu'il en soit lui même victime.

3. Le déroulement de la mue du Faucon émerillon est telle qu'il est très difficile de distinguer sur le terrain 1 femelle adulte d'un oiseau en plumage juvénile (de l'envol à 1 an). Le Faucon émerillon est normalement reproducteur dès la première année. Etant donné le cycle annuel de l'espèce (dates extrêmes de reproduction et de migration) et son comportement habituel, cette observation, à cette


époque de l'année, pose une nouvelle fois le problème d'une éventuelle reproduction du Faucon émerillon en Bretagne, mais ne le résout en rien.

Xavier Grémillet
Meil-Ster
29164 Laz

BIBLIOGRAPHIE

- . P. Géroudet: Les rapaces
- . L. Brown: British birds of prey
- . S. Cramp et ad.: Birds of europa, the middle east and north africa vol. II
- . Y. Guermeur et JY. Monnat: Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne
- . The Mitchell beazly birdwatcher's pocket guide

*Solcedo
atthis*



DONNEES DE BAGUAGE

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo)

- .Bague: GBT 5115352
bagué au nid le 02.07.82 à Bird Island Strangford lough (Down)
Irlande du Nord
- .Reprise : mort le 15.11.82 à Pont-Croix 29.S
- .Informateur: Pierre le Floch

HERON CENDRE (Ardea cinerea)

- .Bague: plaque alaire jaune 769 ; Paris UA 41708
bagué poussin (25 jours) le 19.08.82 à Suscinio 56
- .Reprise: observation visuelle les 25.07, 23.08, 10.09.1982 à Plovan 29.S.
- .Informateur : Michel Cossec

CANARD SIFFLEUR AMERICAIN (Anas americana)

- .Bague : Washington 776 88774
bagué le 08.08.82 à Gagetown/New Brunswick (Canada)
- .Reprise: tué le 12.10.82 à Tréguennec
- .Informateur : Roger Mahéo

HUITRIER PIE (Haematopus ostralegus)

- .Bague: London FR 18 912
bagué poussin le 17.06.81 à Bardsey Island / Gwynedd Pays de Galles
- .Reprise : trouvé mort sur la côte le 12.03.82 Port de Concarneau 29.S.
- .Informateur : Roland Péron

CHEVALIER COMBATTANT (Philomachus pugnax)

- .Bague: Arnhem 1129808
mâle de plus d'un an bagué le 25.11.75 à Starnmeerpolder W. (Noord Holland)
- .Reprise : trouvé mort sur la grève à Lesconil Oct. 81
- .Informateur: Michel Cossec

GOELAND ARGENTE (Larus argentatus)

- .Bague: Paris UA 160 678
bagué poussin le 06.06.79 à l'île Tomé 22
- .Reprise : trouvé échoué (sans doute mort naturelle) sur la plage de Kersini
Plouhinec 29.S.
le 19.09.82
- .Informateur: Pierre le Floch

MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla)

. Première reprise :

. Bague : Paris FT 70 951

adulte de plus d'un an bagué à Karreg Korn (Goulien) le 11.06.80

. Reprise : tirée en Déc. 80 à Kangeg / Godhab distrikt. Groënland

. Informateur : J.Y. Monnat

. Seconde reprise :

. Bague : Paris FT 78 2 05

bagué poussin le 30 .06.81 à An Aoteriou (Goulien)

. Reprise : tirée en août 82 au large de Julianehab . Groënland

. Informateur : J.Y. Monnat

"le Centre de Recherche sur la biologie des populations d'oiseaux (C.R.B.O.) vient d'enregistrer ses deux premières reprises de Mouettes tridactyles de l'autre côté de l'atlantique. Ces oiseaux avaient tous deux été marqués dans les colonies de la réserve Michel Hervé Julien au Cap Sizun .

....
Ce n'est pas la première fois que des Mouettes tridactyles européennes sont retrouvées dans cette région de l'Atlantique Nord : une bonne proportion des jeunes mouettes russes et britanniques fait ainsi la "transatlantique" . En revanche , la reprise d'adultes européens au Groënland est considérée comme rare par les spécialistes (Coulson 1966).
C'est, en tout cas, une première pour la France et la Bretagne ."

extrait de Transatlantiques

par J.Y. Monnat

Travaux des réserves , Tome 1 -1982/S.E.P.N.F

FETIT PINGOUIN (Alca torda)

. Bague : Londoni M 26 553

poussin bagué le 24 .06. 1982 à The Calf / Isle of Man .Grande - Bretagne

. Reprise : trouvé mort au Guilvinec le 06.12.82

. Informateur : M.Cossec

MACAREUX MOINE (Fratrula arctica)

. Bague : GBT BC 98441

bagué à plus d'un an à Skomer / Pembroke Dyfed . Pays de Galles

. Reprise : trouvé mort le 05/02 /83 à Plovan 29 S.

. Informateur : P. le Floch

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)

. Bague : bagué le 15 août 1981 à Trunvel /Tréogat

. Reprise : à Trunvel le 22 /08/82

. Informateur : G. Olliso

ROUSSEROLE EFFARVATE (Acrocephalus scirpaceus)

.Bague à Trunvel (Tréogat) le 07 /08/81

.Reprise : Trunvel le 31/05/82


.Informateur : G. Olloso

ETOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)

.Bague : GOAN K HC 046
bague poussin le 04/06/81 en forêt Dretyn , Miastko Slupsk (Pologne)

.Reprise : trouvé mort au Guilvinec le 05/12 /82

.Informateur: M. Cossec



*Gratercula
arctica*



PROSPECTION DES IMMATURES

AU SEIN D'UNE COLONIE DE GUILLEMOTS DE TROIL *Uria aalge*

par Alain THOMAS

La colonie de Guillemots de Troil de Kastell ar Roc'h m'a donné l'occasion de mener de longues observations lors de trois années de gardiennage de la réserve Michel-Hervé JULIEN en Goulien (29) . Parmi les multiples aspects du cycle de présence et de reproduction de l'espèce, la phase dite de prospection des immatures a retenu particulièrement mon attention. Le fait que cette période soit peu décrite dans la littérature ornithologique n'est pas étranger à ceci. De plus, la forte activité des guillemots à ce moment là et l'augmentation significative de l'effectif confèrent alors à cette colonie (presque toujours résiduelle) un attrait supplémentaire.

Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais simplement décrire à grands traits les principaux points de cette phase de prospection afin de donner les repères essentiels aux gardes et animateurs des réserves du Cap Sizun et du Cap Fréhel. Le phénomène se prolonge en effet jusqu'à la mi-juillet, date à laquelle les équipes d'animation sont déjà en place.

1. Qu'appelle-t-on immatures "prospecteurs" ? Les guillemots de Troil comme les Macareux moines (*Fratercula arctica*) et les Petits Pingouins (*Alca torda*) commencent en majorité à se reproduire dans leur cinquième année; certains individus débutant à quatre ou six ans. Cependant, auparavant ces oiseaux fréquentent leur futur lieu de reproduction et les premiers retours sont notés à l'âge de deux ans. De 2 à 5 ans, le pourcentage de la cohorte (oiseaux nés la même année), les dates d'arrivée ainsi que la durée de séjour à terre vont progresser.

Voici , issu des travaux de Tim BIRKHEAD, un tableau illustrant l'avancement progressif des retours en fonction de l'âge. (les individus utilisés dans ses recherches sont porteurs de bagues colorées et sont observés sur la colonie de Skomer au Pays de Galles).

Age	2	3	4	5
Année				
1974	8 Juin			
1975	27 Mai	13 Mai		
1976	11 Juin	20 Mai	10 Avril	
1977	17 Juin	18 Mai	21 Avril	12 Avril

* Le 12 Avril correspond à la première visite de la saison (les premiers oiseaux de 5 ans sont sans doute arrivés plus tôt).

Dans le cas des guillemots de Goulien, aucun individus n'est bagué (sauf un) et marqué et donc individualisable de façon irréfutable. C'est donc essentiellement au comportement que ces immatures peuvent être repérés et leur nombre évalué.

2. Moyens de repérage des immatures : Lors de la première décade de Juin quand s'amorce la prospection des jeunes immatures (tout au moins sur Kastel et Roc'h), la colonie compte alors trois catégories d'oiseaux :

- les adultes nicheurs en cours d'incubation ou d'élevage,
- les adultes nicheurs ayant échoués mais toujours cantonnés,
- des individus assez bien cantonnés, voire appariés depuis plusieurs semaines mais ne se reproduisant pas (immatures de 3 ou 4 ans, couples mixtes adulte/immature âgé).

Ce qui caractérise l'ensemble de ces oiseaux sont l'aisance avec laquelle ils atterrissent et se déplacent sur les corniches et l'occupation par chacun d'un emplacement bien défini et défendu, à savoir le site. Voici, par opposition, les critères principaux de comportement des jeunes immatures :

- vol rapide et sous forme de grandes boucles les amenant à passer la falaise et à plusieurs reprises (sorte d'inspection visuelle).

- atterrissages en "catastrophe" lors des premières tentatives les premiers jours. Cette imprécision est à attribuer à l'inexpérience de ces guillemots et/ou à la crainte de se poser au milieu de groupes d'adultes qui sont alors très agressifs à leur égard.

- Séjours brefs, de quelques secondes à quelques minutes, sur des corniches exigües, excentrées par rapport à la colonie, sur de simples arêtes rocheuses où ils s'accrochent de leurs griffes, voire dans des nids de Mouettes tridactyles comme cela est le cas assez souvent sur Kastell er Roc'h. Pendant ces courts instants, ils font preuve d'une grande inquiétude et émotivité qui transparaissent dans des mouvements de balancier du cou, de haut en bas.

- répétition accélérée des atterrissages les menant d'un site à l'autre.

- une très faible agressivité entre eux les premiers jours,

- au fur et à mesure de cette période, une maîtrise accrue de l'espace de la colonie qui se traduit par une précision dans les atterrissages une utilisation progressive des corniches périphériques et par l'établissement de territoires.

Il est enfin utile de préciser que tous les oiseaux sont en plumage nuptial complet. En effet, la plupart des guillemots de 2 et 3 ans accomplissent dans le courant du printemps une mue complète et ce avec plusieurs mois de retard sur les adultes.

3. Déroulement de la phase de prospection : Les décomptes horaires m'ont permis de présenter ainsi l'évolution de cette phase.

a) Saison 1981 / Nombre moyen d'imm. présents par heure et par quinzaine

Horaire (été)	10	11	12	14	15	16	17	18	T.P. ^x	Observations
Mars II	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.06	
Avril I	0.07	0	0	0.28	0	0	0.75	1.3	0.14	
Avril II	0.21	0.14	0	0	0.22	0.09	0.18	0	0.43	Début de la ponte
Mai I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incubation
Mai II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incubation
Juin I	0	0	0	0	0.25	0.42	1.0	0.57	0.21	Début de l'élevage
Juin II	1.8	1.1	0.22	1.07	1.13	1.33	4.58	8.33	0.93	
Juillet I	1.7	1.86	1.0	0.45	0.27	0.33	1.38	2.20	0.69	Fin de l'élevage
Juillet II	0	0	0	0	1.0	0.67	0	0		

» Taux de prospection = $\frac{\text{Nbre de jours avec prospection}}{\text{Nbre de jours d'observation}}$

Il ressort de ce tableau :

- une phase de prospection très faible courant Avril. Peu d'oiseaux concernés (1-3 ind. en 1981) et un taux de prospection faible (0.14 à 0.43).

- un arrêt total en Mai. Durant ce mois, l'effectif de la colonie est totalement stabilisé et les variations horaires journalières du nombre d'oiseaux nicheurs présents sont alors les plus basses de toute la saison.

- un réel démarrage de la prospection simultanément aux premières éclosions, et un maximum d'intensité (non visible sur ce tableau) lors des tous premiers départs de poussins alors que la totalité des œufs ou presque sont éclos, soit au plus fort de la période de nourrissage. Au moins deux hypothèses peuvent être avancées pour tenter d'expliquer cette évolution : en premier lieu, un possible effet d'entraînement vers la colonie provoqué par les adultes nourriciers sur les immatures présents selon toute vraisemblance sur les mêmes lieux de pêche; en second lieu, se superposant à ce courant ou le provoquant, l'état physiologique des oiseaux immatures, à cette époque (éveil de l'activité sexuelle).

--Un arrêt de la prospection après le départ de la grande majorité des poussins. La baisse d'attractivité de la colonie par la chute de l'activité sociale et la récession de l'activité sexuelle doivent ici aussi se combiner.

b) Variation horaire journalière de la prospection : Cas d'une journée "type", le 24 Juin 1981.

Décomptes horaires	10	11	12	14	15	16	17	18	21	22	23
Nbre total	36 33	31 30	30	27 28	28 30	27 29	39 40	38	49 50	47 48	41
Nbre imm.	7 5	2 2	1 0	0 0	0 1	0 1	7 7	7	11 12	8 8	6

Plusieurs caractéristiques se dégagent :

- une activité moyenne à faible en début et en milieu de matinée, les quelques observations réalisées entre 6 h et 10 h du matin donnent des nombres de prospecteurs plus élevés légèrement qu'entre 10 et 11 heures.

- un minimum de prospection de 11 à 16 heures
 - une progression brutale dès la tranche horaire 16-17 heures,
 - un maximum d'activités en soirée : maxima de 10 à 15 prospecteurs entre 20 et 23 heures pendant la période de plus forte intensité à savoir du 20 Juin à 5 juillet. (Situation identique en 1980 avec de 15 à 20 prospecteurs).

4. Intérêts du suivi de cette phase de prospection : Au chapitre des intérêts immédiats, il convient de mentionner surtout l'observation de comportements sociaux originaux chez les guillemots et les possibilités ainsi offertes de perception de l'organisation interne de la colonie.

A moyen terme, un tel suivi permet de recueillir à l'avance des indices d'établissement de nouveaux couples nicheurs les années suivantes. En effet, alors que la colonie de Kastell ar Roc'h était en croissance de 1978 à 1981, la plupart des nouveaux couples ont pu être repérés dès l'année précédente lors de cette phase de prospection. Mais s'il y a certes toujours des doutes sur l'identité de ces oiseaux non marqués, le niveau d'attachement d'une année sur l'autre des guillemots aux sites conquis (96% selon Birkhead) et leur utilisation un ou deux ans plus tard au "centimètre près" donnent à penser que ce sont en grande majorité les mêmes individus.

Il resterait enfin et surtout à connaître le rôle et la place de cet effectif de prospecteurs dans la dynamique générale de la colonie. Pour ceci, il faudrait une investigation plus profonde passant par le baguage et le marquage coloré. Cependant, alors que ces opérations ne sont pas envisagées pour l'instant, les remarques et commentaires formulés précédemment doivent avoir un caractère suffisamment stimulant pour amener les observateurs à porter un regard plus attentif sur de telles colonies d'oiseaux de mer à cette époque de leur cycle de reproduction.

Bibliographie :

BIRKHEAD T.R 1977 . Population parameters for the common guillemot *Uria aalge*
Ornis scandinavica 8, 145 - 154;

Eurdu
torquatus



