

Inventaire des poissons de Groix

(Penn Ar Bed n°235-236 - 2020 - M. Ballèvre et C. Robert coordonnateurs)

Petit guide à l'usage du lecteur.

Dans ce tableau, le lecteur trouvera

1. Une **systématique des poissons** qui suit l'ordre du « Guide des poissons de l'Atlantique européen » (Quéro J.-C., Porché P. et Vayne J.-J., Delachaux et Niestlé, Paris, 2003). La première colonne concerne l'ordre (terminaisons en -formes), la deuxième colonne la famille (terminaisons en -idae), la troisième colonne le nom latin (en *italique*) (genre, avec une majuscule, puis espèce, avec une minuscule), la quatrième colonne le nom français. Toutes les espèces d'un même ordre figurent à l'intérieur d'un rectangle dont les bordures sont soulignées par un trait continu épais.

Quand des divergences (inévitables) existent entre la nomenclature utilisée par un auteur, et celle de notre livre de référence (Quéro et al., 2003), la synonymie est indiquée. Par exemple, *Lamna nasus* était appelé *Lamna cornubica* dans l'inventaire de Guérin-Ganivet (1912), etc... Si l'on veut en effet comparer deux listes d'espèces, il est nécessaire de tenir compte de ces synonymies, sans quoi le dénombrement des espèces est erroné.

2. Des **données sur la présence ou l'absence** de ces espèces dans quatre inventaires, à savoir :

- Groix (ce volume de Penn Ar Bed) (cf ci-dessous) ;
- Concarneau, d'après la liste établie par Guérin-Ganivet (1912) ;
- Roscoff, d'après les travaux de Le Danois (1913), et Le Gall et Cantacuzène (1955) ;
- enfin le golfe normano-breton (Dinard : Le Mao, 2009).

Quand, pour une espèce donnée, une case est colorée, cela signifie que cette espèce a été signalée dans cette localité. Quand, pour une espèce donnée, la case est blanche (incolore), l'espèce n'a jamais été signalée dans cette localité.

Les couleurs sont fonction des principaux groupes taxonomiques de rang supérieur :

- rose pour les 'agnathes' (myxines et lamproies) ;
- vert pour les élasmobranches (requins et raies)
- rose pour les holocéphales (chimères) ;

- jaune pour les ostéichthyens (poissons osseux).

3. Des **données sur l'abondance** des espèces sont reportées dans les colonnes pour Groix et Concarneau, deux localités proches entre lesquelles on ne peut s'attendre à de grandes différences.

Pour Concarneau, les données sont issues du travail de Guérin-Ganivet (1912), éventuellement complété par la bibliographie plus récente citée dans le Penn Ar Bed 234-235.

Pour Groix, ces données sont tirées de nos propres observations sur l'estran, ainsi que des indications de plongeurs (Jean-Michel Crouzet) ou de pêcheurs (par ordre alphabétique : Albert Goarin, Jean-Marc Hess, Joseph Le Dreff, Thierry Orvoën, André Stephant), complétées par des déterminations de Jean-Claude Quéro lors de sa visite à Groix.

Les abondances sont qualitativement labellisées comme suit :

- D disparu (n'a pas été observé depuis 20 ou 30 ans)
- TR très rare (observé au plus une fois par an)
- R rare (observé moins de une fois à une dizaine de fois par an)
- PC peu commun (observé tous les ans, mais en petit nombre)
- C commun (observé tous les ans sans difficulté)
- A abondant (observé tous les ans, en grand nombre)

4. Un **récapitulatif final**, avec le nombre d'espèces par ordre dans chaque localité.

Au fur et à mesure que nos connaissances progresseront, ce tableau devra lui aussi évoluer, jusqu'à devenir obsolète. Vos observations nous y aideront. Merci de nous en faire part.

Inventaire des poissons de Groix (Penn Ar Bed n°235-236 - 2020 - M. Ballèvre et C. Robert coordonnateurs)

Ordre	Famille	Nom latin	Nom français	Groix	Concarneau	Roscoff	Dinard
					Guérin-Ganivet 1912	Le Danois, 1913; Le Gall & Cantacuzène, 1995	Le Mao, 2009

Légende: D: disparu; PC: peu commun; R: rare; C: commun

Myxiniformes	Myxinidae	<i>Myxine glutinosa</i>	Myxine rosée				
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Petromyzon marinus</i> <i>Lampetra fluviatilis</i>	Lamproie marine Lamproie fluviatile	PC	surtout en Loire surtout en Loire		
Hexanchiformes	Hexanchidae	<i>Hexanchus griseus</i>	Requin gris	R	extrêmement rare		
Lamniformes	Lamnidae	<i>Lamna nasus</i>	Requin-taube commun	R, diminution des effectifs, abondant il y a 25 ans (J-M Hess)	<i>Lamna cornubica</i> - assez rare		
		<i>Isurus oxyrinchus</i>	Requin-taube bleu		<i>Oxyrhina spallanzanii</i> / TR		
	Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i>	Requin pélerin	PC, diminution des effectifs, abondant il y a 20 ans (J-M Hess, A. Stéphant)	très rarement capturé		
	Alopiidae	<i>Alopias vulpinus</i>	Requin renard	PC, pêché 2 en 72 par J-M Hess	assez fréquemment capturé		
Carcharhiniformes	Scyliorhinidae	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Petite roussette	C	très commun		
		<i>Scyliorhinus stellaris</i>	Grande roussette	PC	commune		
		<i>Galeus melastomus</i>	Chien espagnol	PC	<i>Pristiurus melanostomus</i> / AC en hiver		
	Triakidae	<i>Galeorhinus galeus</i>	Requin hâ	PC			
		<i>Mustelus asterias</i>	Emissole tachetée	C	assez commune en été		
		<i>Mustelus mustelus</i>	Emissole lisse		très rare		
	Carcharhinidae	<i>Prionace glauca</i>	Peau-bleue	C	C		
	Sphyrnidae	<i>Sphyrna zygaena</i>	Requin-marteau commun		rare, accidentel		
Squaliformes	Dalatiidae	<i>Dalatias licha</i>	Squale liche		<i>Scymnus licha</i> / TR		
		<i>Oxynotus centrina</i>	Centrine commune		<i>Centrina salviani</i> / R		
		<i>Etmopterus spinax</i>	Sagre commun		<i>Spinax niger</i> / TR		
	Squalidae	<i>Squalus acanthias</i>	Aiguillat commun	R, abondant dans années 70 vers les Birvideaux (A Stéphant)	extrêmement rare à Concarneau		
	Echinorhinidae	<i>Echinorhinus brucus</i>	Squale bouclé		<i>E. spinosus</i> / très rare		1 ind.

Squatiniformes	Squatinae	<i>Squatina squatina</i>	Ange de mer commun	D, abondant il y a 30 ans (A Stéphant, JM Hess, J Le Dreff) - 1 ind. pêché par T. Orvoën en 2017 ou 2018	commun	
Pristiformes	Pristidae	<i>Pristi pristis</i>	Poisson-scie commun		douteux	
Torpediniformes	Torpedinidae	<i>Torpedo torpedo</i>	Torpille ocellée		<i>T. oculata</i> / sp rare	
		<i>Torpedo nobiliana</i>	Torpille noire	C, augmentation des effectifs	très rare	
		<i>Torpedo marmorata</i>	Torpille marbrée	C, augmentation des effectifs	assez fréquent	
Rajiformes	Rajidae	<i>Rostroraja alba</i>	Raie blanche		<i>Raja alba</i> / assez commune	non signalé depuis 1897
		<i>Dipturus oxyrinchus</i>	Pocheteau noir		<i>Raja oxyrinchus</i> / fréquente	
		<i>Dipturus batis</i>	Pocheteau gris	D, pêché il y a 40 ans, n'a jamais été abondant (J Le Dreff)	<i>Raja macrorhynchus</i> / <i>Raja batis</i> / fréquent	probablement disparu du golfe
		<i>Raja miraletus</i>	Raie miroir			
		<i>Raja clavata</i>	Raie bouclée	C	très commune	
		<i>Amblyraja radiata</i>	Raie radiée		<i>Raja radiata</i> / R	
		<i>Raja microocellata</i>	Raie mûlée		peu commune	
		<i>Leucoraja fullonica</i>	Raie chardon		<i>Raja fullonica</i> / R	
		<i>Raja undulata</i>	Raie brunette	C, diminution des effectifs PC, diminution des effectifs		
		<i>Leucoraja naevus</i>	Raie fleurie			
		<i>Leucoraja circularis</i>	Raie circulaire		<i>Raja circularis</i> / signalée 1 fois	
		<i>Raja brachyura</i>	Raie lisse	C		
		<i>Raja montagui</i>	Raie douce	C		
		<i>Raja asterias</i>	Raie étoilée		<i>Raja punctata</i> / AC	
	Dasyatidae	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Pasténague commune	R	<i>Trygon pastinaca</i> / peu commune	
	Myliobatidae	<i>Myliobatis aquila</i>	Aigle de mer commun	C, consommation récente (JM Hess)	assez commune	
Chimaeriformes	Chimaeridae	<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimère		très rare	

Acipensériformes	Acipenseridae	<i>Acipenser sturio</i>	Esturgeon d'Europe occidentale	non revu depuis 1982	au large de Groix et des Glénan / commune dans la Loire au-desus d'Angers	rare
Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille d'Europe	C	<i>Anguilla vulgaris</i> / C	
	Congridae	<i>Conger conger</i>	Congre commun	C	<i>Conger vulgaris</i> / TC	
	Muraenidae	<i>Muraena helena</i>	Murène commune		TR (1 ind. Glénan, 1 ind. La Turballe)	1 ind.
Clupéiformes	Clupeidae	<i>Sardina pilchardus</i>	Sardine	C, augmentation des effectifs	<i>Clupea pilchardus</i> / très commune, mais abondance variable	
		<i>Alosa fallax</i>	Alose feinte		<i>Clupea finta</i> / PC	
		<i>Alosa alosa</i>	Alose vraie	PC, stock peu abondant mais ressource stable (JM Hess)	<i>Clupea alosa</i> / commune / quitte la côte au printemps pour remonter les rivières	
		<i>Clupea harengus</i>	Hareng	PC	fréquente en hiver	
	Engraulidae	<i>Sprattus sprattus</i>	Sprat	C	<i>Clupea sprattus</i> / très commune	
		<i>Engraulis encrasicolus</i>	Anchois commun	C	en bancs par moments	
Osmériformes	Argentinidae	<i>Argentina sphyraena</i>	Petite argentine		R	
	Osmeridae	<i>Osmerus eperlanus</i>	Eperlan d'Europe		PC	
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo trutta</i>	Truite d'Europe		même statut que le saumon	
		<i>Salmo salar</i>	Saumon atlantique	PC	de plus en plus rare, surtout dans la Loire, parfois dans les rias	
		<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel			1 ind.
		<i>Oncorhynchus kisutch</i>	Saumon coho			1 ind.
Gadiformes	Gadidae	<i>Raniceps raninus</i>	Grenouille de mer	PC, dans fond de failles (JM Crouzet)	Rare	
		<i>Trisopterus luscus</i>	Tacaud commun	C, autour des épaves (JM Crouzet)	<i>Gadus luscus</i> / TC	
		<i>Trisopterus minutus</i>	Petit tacaud	C, autour des épaves (JM Crouzet)	<i>Gadus minutus</i> / PC	
		<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Eglefin		rare	
		<i>Gadus morhua</i>	Morue		devenue rare	<i>Gadus callarias</i>
		<i>Micromesistius poutassou</i>	Merlan bleu	C	<i>Gadus poutassou</i> / TR	
		<i>Merlangius merlangus</i>	Merlan	C, stocks variables (A Stéphant)	<i>Gadus merlangus</i> / TC	
		<i>Pollachius virens</i>	Lieu noir	PC	<i>Gadus virens</i> / C	

	Lotidae	<i>Pollachius pollachius</i>	Lieu jaune	C, diminution des effectifs	<i>Gadus pollachius</i> / C	
		<i>Gaidropsarus vulgaris</i>	Motelle commune	C	<i>Motella vulgaris</i> / TC	
		<i>Gaidropsarus mediterraneus</i>	Motelle à 3 barbillons	C	<i>Motella tricirrata</i> / TC	
		<i>Enchelyopus cimbrius</i>	Motelle à 4 barbillons			
		<i>Ciliata septentrionalis</i>	Motelle à moustaches			
		<i>Ciliata mustela</i>	Motelle à 5 barbillons	PC		
		<i>Brosme brosme</i>	Brosme			2 ind.
		<i>Molva molva</i>	Lingue franche = julienne	C, diminution des effectifs	<i>M. vulgaris</i> / PC	
	Phycidae	<i>Phycis (=Urophycis) blennoides</i>	Phycis de fond	PC, dans failles (JM Hess)	AC	
	Merlucciidae	<i>Merluccius merluccius</i>	Merlu commun	C	<i>M. vulgaris</i> / TC	
Lophiiformes	Lophiidae	<i>Lophius budegassa</i>	Baudroie rousse	PC		
		<i>Lophius piscatorius</i>	Baudroie commune = Lotte	C, diminution des effectifs	fréquente	
Gobiesociformes	Gobiesocidae	<i>Lepadogaster lepadogaster</i>	Gluette barbier			
		<i>Lepadogaster candolii</i>	Gluette petite-queue	C	<i>L. decandollei</i> / assez commune	
		<i>Diplecogaster bimaculata</i>	Gluette rougeoleuse		<i>Lepadogaster bimaculatus</i> / 1 ind.	
		<i>Apletodon microcephalus</i>	Porte-écuelle à petite tête		<i>Lepadogaster microcephalus</i> / peu fréquente	
		<i>Apletodon dentatus</i>	Gluette ventouse			
Athériniformes	Atherinidae	<i>Atherina presbyter</i>	Prêtre	C	C	
Béloniformes	Scomberesocidae	<i>Scomberesox saurus</i>	Balaou de l'Atlantique	PC, poisson du large (JM Hess)	peu commun	1 ind. en 2007
	Belonidae	<i>Belone belone</i>	Orphie commune, aiguillette	C, stocks annuels fluctuants (A Stéphant)	<i>B. vulgaris</i> / très commune	
	Exocoetidae	<i>Exocoetus volitans</i>	Poisson volant		très rare	
		<i>Cheilopogon heterurus</i>	Exocet grande aile			1 ind. en 1955
Béryciformes	Berycidae	<i>Beryx decadactylus</i>	Béryx commun		accidentel	
Zéiformes	Zeidae	<i>Zeus faber</i>	Saint-Pierre commun	C	tout à fait commune	
	Caproidae	<i>Capros aper</i>	Sanglier commun		assez rare / peu fréquent	

Gastérostéiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Epinoche commune		rivières		
		<i>Spinachia spinachia</i>	Epinoche de mer	C	<i>S. vulgaris</i> / très commune / archipels et embouchures des rivières		
		<i>Pungitius pungitius</i>	Epinochette		rivières		eau douce/saumâtre
Syngnathiformes	Centriscidae	<i>Macroramphosus scolopax</i>	Bécasse de mer	R	<i>Centriscus scolopax</i> / R		
	Syngnathidae	<i>Hippocampus ramulosus</i>	Hippocampe moucheté		<i>H. guttulatus</i> / commun	<i>H. guttulatus</i>	1 ind.
		<i>Hippocampus hippocampus</i>	H. à museau court	PC, dans herbiers à Zostères (JM Crouzet)	<i>H. antiquorum</i> / commun dans les herbiers		
		<i>Entelurus aequoreus</i>	Entélure	C	<i>Nerophis aequoreus</i> / TC		
		<i>Nerophis lumbriciformis</i>	Nérophis petit-nez	C	très commun		
		<i>Nerophis ophidion</i>	Nérophis tête bleue		assez commun		
		<i>Syngnathus acus</i>	Syngnathe aiguille	C	très commune parmi les herbiers		
		<i>Syngnathus typhle</i>	Siphonostome		<i>Siphonostoma typhle</i> / très commun dans les herbiers		
		<i>Syngnathus rostellatus</i>	Syngnathe perçat		commune		
		<i>Syngnathus abaster</i>	Syngnathe gorge claire				dét.à confirmer
Scorpaeniformes	Sebastidae	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Sébaste chèvre		<i>Scorpaena dactyloptera</i> / fréquente		1 ind. en 1997
	Scorpaenidae	<i>Scorpaena scrofa</i>	Rascasse rouge		rare		
		<i>Scorpaena porcus</i>	Rascasse brune		rare		
	Triglidae	<i>Trigla lyra</i>	Grondin lyre		C		
		<i>Chelidonichthys</i> (= <i>Trigloporus</i>) <i>lastoviza</i>	Grondin camard	PC, diminution des effectifs (JM Hess)	<i>Trigla lineata</i> / AC		
		<i>Chelidonichthys</i> (= <i>Aspitrigla</i>) <i>cuculus</i>	Grondin rouge	PC, diminution des effectifs (JM Hess)	<i>Trigla obscura</i> / peu abondant		
		<i>Chelidonychthys</i> (= <i>Eutrigla</i>) <i>gurnardus</i>	Grondin gris	PC, diminution des effectifs (JM Hess)	<i>Trigla gurnardus</i> / commun		
	Cottidae	<i>Chelidonichthys</i> (= <i>Trigla</i>) <i>lucerna</i>	Grondin perlon	PC, diminution des effectifs (JM Hess)	<i>Trigla hirundo</i> / jeunes C - adultes R douteux		
		<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Chaboisseau de mer				
		<i>Micrenophris</i> (= <i>Taurulus</i>) <i>lilljeborgii</i>	Chabot tête				1 ind.
		<i>Taurulus</i> (= <i>Enophrys</i>) <i>bubalis</i>	Chabot buffle	C	<i>Cottus bubalis</i> / très commun		
	Agonidae	<i>Agonus cataphractus</i>	Souris de mer poilue		assez fréquent dans les herbiers de zostères de la Forest		

	Cyclopteridae	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lompe commune	PC, diminution des effectifs	AC	
		<i>Liparis liparis</i>	Limace de mer		<i>Liparus lineatus</i> / Glénan, Concarneau	
		<i>Liparis montagui</i>	Limace anicotte			
Perciformes	Moronidae	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	Bar tacheté			très rare
		<i>Dicentrarchus labrax</i>	Bar commun	C, diminution des effectifs	<i>Labrax lupus</i> / commun	
	Polyprionidae	<i>Polyprion americanus</i>	Cernier		<i>P. cernium</i> / très rare (2 ind.)	
	Serranidae	<i>Serranus cabrilla</i>	Serran chèvre	R	rare	rare
		<i>Epinephelus guaza</i>	Mérou commun			1 ou 2 ind.
	Echeneidae	<i>Remora remora</i>	Remora commun	vu en 2014		1 ind. immature
	Carangidae	<i>Trachurus trachurus</i>	Chinchard commun	C	<i>Caranx trachurus</i> / C	
		<i>Trachurus mediterraneus</i>	Chinchard à queue jaune	C		
		<i>Naucrates ductor</i>	Poisson-pilote		peu fréquent	
		<i>Seriola rivoliana</i>	Sérieole limon	R, première mention en 2003 (JM Crouzet)		1ère mention en 2004
		<i>Seriola carpenteri</i>	Sérieole guinéenne			1ère mention en 2000
	Bramidae	<i>Brama brama</i>	Grande castagnole			1 ind. en 2007
	Sparidae	<i>Diplodus sp</i>				juvéniles
		<i>Diplodus cervinus</i>	Sar à grosses lèvres	C		
		<i>Diplodus sargus</i>	Sar commun	C		1ère mention en 1988
		<i>Diplodus vulgaris</i>	Sar à tête noire	C		2 ind. en 2009
		<i>Boops boops</i>	Bogue	PC, augmentation des effectifs	<i>Box vulgaris</i> / PC	
		<i>Sarpa salpa</i>	Saupe	PC, apparu en 2005		1 ind. en 1983
		<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Griset	C	<i>Cantharus lineatus</i> / AC	
		<i>Sparus aurata</i>	Dorade royale	C	<i>Pagrus auratus</i> / assez peu commune	
		<i>Pagellus bogaraveo</i>	Pageot rose	PC, augmentation des effectifs	assez peu commun	
		<i>Pagellus acarne</i>	Pageot acarné	PC	<i>Pagellus centrodontus</i> / commun	1 ind. en 1983
		<i>Pagrus pagrus</i>	Pagre commun	PC	<i>Pagrus vulgaris</i> / très rare	1ère mention en 1995 / en augmentation
		<i>Pagellus erythrinus</i>	Pageot commun	R, diminution des effectifs	assez peu commun	
		<i>Dentex dentex</i>	Denté commun	R vu par Albert Goarin	<i>D. vulgaris</i> / très rare (2 ind.)	
	Sciaenidae	<i>Umbrina canariensis</i>	Ombrine bronze	R vu par Albert Goarin		
		<i>Umbrina cirrosa</i>	Ombrine côtière		PC	
		<i>Argyrosomus regius</i>	Maigre	R, quelques uns vers les Birvideaux (J Le Dreff)	<i>Sciaena aquila</i> / assez fréquente, mais pas abondante	<i>Sciaena aquila</i>

Mullidae	<i>Mullus surmuletus</i>	Rouget-barbet de roche	C, stocks variables selon les années (A Stéphant)	assez commune		
	<i>Mullus barbatus</i>	Rouget-barbet de vase				
Cepolidae	<i>Cepola macroptalma</i>	Cépole commune	C	<i>C. rubescens</i> / peu commune		
Mugilidae	<i>Chelon labrosus</i>	Mulet lippu	C	<i>Mugil chelo</i> / AC		
	<i>Mugil cephalus</i>	Mulet cabot		<i>Mugil capito</i> ? / TC	erreur dét.?	
	<i>Liza aurata</i>	Mulet doré	C			
	<i>Liza ramada</i>	Mulet porc	C	<i>Mugil capito</i> / TC	<i>Liza ramada</i>	
Labridae	<i>Coris julis</i>	Girelle	R	<i>Coris giofredi</i> / 1nd.		
	<i>Centrolabrus exoletus</i>	Petite vieille	C			
	<i>Labrus bergylta</i>	Vieille	C	TC		
	<i>Labrus mixtus</i> (= <i>bimaculata</i>)	Coquette	C	PC		
	<i>Ctenolabrus rupestris</i>	Rouquié	C	AC		
	<i>Symphodus bailloni</i>	Vracton grelue	PC	<i>Crenilabrus bailloni</i> / PC		
	<i>Symphodus melops</i>	Vracton croissant noir	C	<i>Crenilabrus melops</i> / TC dans les herbiers		
Zoarcidae	<i>Zoarces viviparus</i>	Loquette d'Europe				à confirmer
Stichaeidae	<i>Chirolophis ascanii</i>	Toupet marbré				1ère mention en 2003
Pholidae	<i>Pholis gunellus</i>	Gonelle		<i>Centronotus gunnellus</i> / TC		
Anarichadidae	<i>Anarichas lupus</i>	Loup de l'Atlantique				1 ind.
Ammodytidae	<i>Gymnammodytes semisquamatus</i>	Lançon aiguille				
	<i>Gymnammodytes cicerelus</i>	Lançon cicерelle				
	<i>Ammodytes marinus</i>	Lançon nordique				
	<i>Ammodytes tobianus</i>	Lançon équille	C	TC		
	<i>Hyperoplus lanceolatus</i>	Lançon commun	C	<i>Ammodytes lanceolatus</i> / PC		
	<i>Hyperoplus immaculatus</i>	Lançon jolivet				
Trachinidae	<i>Trachinus draco</i>	Grande vive	C	C		
	<i>Trachinus</i> (= <i>Echiichthys</i>)	Petite vive	C	C		
	<i>vipera</i>					
Tripterygiidae	<i>Tripterygion delaisi</i>	Triptérygion commun	C			
Blenniidae	<i>Blennius ocellaris</i>	Blennie papillon				
	<i>Coryphoblennius galerita</i>	Blennie coiffée		<i>Blennius montagui</i> / AC		
	<i>Parablennius ruber</i>	Blennie édentée				
	<i>Parablennius gattorugine</i>	Blennie cabot	C	<i>Blennius gattorugine</i> / AC		rare
	<i>Parablennius pilicornis</i>	Blennie bouquet		signalée pour la première fois en Bretagne par Quéro et al. (2010) / C (JM Crouzet)		

	<i>Parablennius sanguinolentus</i>	Blennie baveuse	signalée pour la première fois en Bretagne par Quéro et al. (2010) / C (JM Crouzet)		
Callionymidae	<i>Lipophrys pholis</i>	Blennie mordocet	C	<i>Blennius pholis</i> / C	
	<i>Callionymus lyra</i>	Callionyme lyre	C	TC	
	<i>Callionymus maculatus</i>	Callionyme tacheté	C		
	<i>Callionymus reticulatus</i>	Callionyme réticulé			1 ind.
Gobiidae	<i>Crystallogobius linearis</i>	Gobie cristal			
	<i>Aphia minuta</i>	Gobie nonnat			
	<i>Lebetus scorpioides</i>	Gobie nain			
	<i>Gobius cobitis</i>	Gobie céphalote	C		
	<i>Gobius niger</i>	Gobie noir	C	C	
	<i>Gobius paganellus</i>	Gobie paganel	PC	C	
	<i>Gobius cruentatus</i>	Gobie ensanglanté	signalée pour la première fois en Bretagne par Quéro et al. (2010) / C (JM Crouzet)		
	<i>Thorogobius ephippiatus</i>	Gobie léopard	C		
Luvaridae	<i>Buenia jeffreysii</i>	Gobie chauve			
	<i>Gobiusculus flavescens</i>	Gobie nageur	JM Crouzet/bassin à flot Port Tudy	<i>Gobius ruthensparri</i> / TC	
	<i>Potamoschistus pictus</i>	Gobie varié	C	douteux	
	<i>Potamoschistus microps</i>	Gobie tacheté			
	<i>Potamoschistus minutus</i>	Gobie buhotte		<i>Gobius minutus</i> / TC sables et herbiers	
	<i>Potamoschistus lozanoi</i>	Gobie rouillé			
	<i>Luvaris imperialis</i>	Louvereau			1 ind. en 1902
	<i>Ruvettus preciosus</i>	Rouvet		très rare	
	<i>Trichiurus lepturus</i>	Poisson-sabre commun		très rare	
	<i>Lepidopus caudatus</i>	Sabre argenté		très rare	rare (avant 1880)
Xiphiidae	<i>Xiphias gladius</i>	Espadon		très rare	rare
Scombridae	<i>Scomber japonicus</i>	Maquereau espagnol	C		
	<i>Scomber scombrus</i>	Maquereau commun	C	<i>S. scomber</i> / TC	
	<i>Auxis rochei</i>	Bonitou		extrêmement rare	
	<i>Katsuwonus (=Euthynnus)</i>	Bonite à ventre rayé		<i>Thynnus pelamys</i> / peu fréquente	rare
	<i>pelamis</i>				
	<i>Sarda sarda</i>	Bonite à dos rayé	PC	<i>Pelamys sarda</i> / rare	
	<i>Thunnus thynnus</i>	Thon rouge	vu en 2016	extrêmement rare	rare
	<i>Thunnus alalunga</i>	Germon		<i>Thynnus germon</i> / très abondant	
Centrolophidae	<i>Centrolophus niger</i>	Centrolophe noir		<i>C. pompilus</i> / TR	

Pleuronectiformes	Scophthalmidae	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Barbue	C, diminution des effectifs	<i>Rhombus laevis</i> / jeunes C - adultes R		
		<i>Scophthalmus maximus</i> (= <i>Psetta maxima</i>)	Turbot	PC, diminution des effectifs	<i>Rhombus maximus</i> / jeunes C - adultes R		
		<i>Zeugopterus punctatus</i>	Targeur	C	PC		
		<i>Zeugopterus</i> (= <i>Phrynorhombus</i>) <i>regius</i>	Targie royale	PC	<i>Z. megastoma</i> / C		juvéniles
		<i>Phrynorhombus norvegicus</i>	Targie naine	R			
		<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Cardine franche				1ère mention en 1997
	Bothidae	<i>Arnoglossus thori</i>	Arnoglosse tacheté	C	<i>A. grohmanni</i> / jeunes C - adultes R		
		<i>Arnoglossus laterna</i>	Arnoglosse lanterne		jeunes C - adultes R		
	Pleuronectidae	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Flétan de l'Atlantique		<i>H. vulgaris</i> / R		
		<i>Microstomus kitt</i>	Limande-sole commune	PC	<i>Pleuronectes microcephalus</i> / AR		
		<i>Limanda limanda</i>	Limande commune	C	<i>Pleuronectes limanda</i> / C		
		<i>Platichthys flesus</i>	Flet commun	C, diminution des effectifs	<i>Pleuronectes flesus</i> / C		
		<i>Pleuronectes platessa</i>	Plie commune	C, diminution des effectifs	TC		
		<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Plie cynoglosse		<i>Pleuronectes cynoglossus</i> / AR		
	Soleidae	<i>Microchirus variegatus</i>	Sole-perdrix commune	C	<i>Solea variegata</i> / PC		1 ind. en 1998
		<i>Buglossidium luteum</i>	Petite sole jaune		<i>Solea lutea</i> / douteux	<i>Monochirus luteus</i>	
		<i>Dicloglossa cuneata</i>	Céteau		<i>Solea cuneata</i> / C		
		<i>Pegusa</i> (= <i>Solea</i>) <i>lascaris</i>	Sole-pole claire	C	<i>Solea lascaris</i> / TC		
		<i>Solea solea</i> (= <i>vulgaris</i>)	Sole commune	C	TC		
Tétraodontiformes	Balistidae	<i>Balistes capriscus</i>	Baliste cabri	C, présent à partir des années 80 (A Stéphant)	de temps en temps, à quelques miles des côtes	<i>Balistes carolinensis</i>	1ère mention en 1930, puis 1953, en augmentation depuis ca. 1990
	Tetraodontidae = Lagocephalidae	<i>Lagocephalus lagocephalus</i>	Compère tête de lièvre		<i>Tetrodon lagocephalus</i> / TR		1 ind. (1907)
	Molidae	<i>Mola mola</i>	Poisson-lune	PC, si on le voit à la surface, c'est signe de mauvais temps (A Stéphant)	<i>Orthogoriscus mola</i> / assez commun		occasionnel, en augmentation depuis ca. 1980

Nombre total d'espèces par ordre

Myxines	1
Lamproies	2
Chondrichthyens	34
Chimères	1
Ostéichthyens	
Acipensériformes	1
Anguilliformes	3
Clupéiformes	6
Osmériformes	2
Salmoniformes	4
Gadiformes	18
Lophiiformes	2
Gobiesociformes	5
Athériniformes	1
Béloniformes	4
Béryciformes	1
Zéiformes	2
Gastérostéiformes	3
Syngnathiformes	10
Scorpaeniformes	12
Perciformes	85
Pleuronectiformes	17
Tétraodaontiformes	3
Total	179
Total	216

Groix

0
1
22
0
1
2
5
1
13
2
1
1
2
1
5
6
52
13
2
108
131

Concarneau

Guérin-Ganivet, 1912

0
2
34
1
1
3
6
2
2
14
1
3
1
3
1
2
3
9
13
51
17
3
135
172

Roscoff

Le Danois, 1913; Le
Gall & Cantacuzène,
1955

1
1
27
1
1
2
6
2
2
13
1
4
1
3
2
2
7
8
45
13
2
112
141

Dinard

Le Mao, 2009

0
2
24
0
1
3
6
4
15
1
4
1
3
2
3
9
12
70
15
3
152
178