


AR VRAN

29/S

N°4



SOMMAIRE

- 1° Résultat du recensement BIROE de janvier 1982 le long du littoral du Sud-Finistere
..... Michel COSSEC
- 2° Etat provisoire des stationnements de Bernaches Cravants, saison 1981/1982
..... Roger MAHEO
- 3° Note sur l'hivernage d'un Milan Royal dans le Sud-Finistere (hiver 80/81)
..... Roland PERON
- 4° Un nichoir à Sternes à Pont-Croix
..... Pierre LE FLOC'H
- 5° Données de baguages parvenues à AR VRAN 29/S
- 6° Resultat du recensement des oiseaux marins échoués des 27 et 28 fevrier 1982
..... Alain THOMAS
- 6° Résumé d'un article de GL. ATKINSON-WILLES portant sur les "Effectifs et distribution des Canards Marins dans le NO. de l'Europe, janvier 1967/1973"
..... Michel COSSEC

I RESULTAT DU RECENSEMENT "LIMICOLES" DE JANVIER 1982
LE LONG DU LITTORAL DU SUD FINISTERE

Liste des observateurs:

BARGAIN Bruno; BECHAUD Jean François; BERNICARD Annie;
CARDIET Raymond; CANEVET Paul; COSSEC Michel; HENRY Jacques;
MOULIN Loic; PERON Roland; THOMAS Alain.

Découpage de la zone prospectée:

La zone littorale recensée en janvier s'étend de la baie de Douarnenez à Douëlan et est arbitrairement découpée en sept secteurs schématisés à la page n° 2.

Resultat du recensement par zone:

	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Mitrier Pie	250		169	50	150			619
Pluvier Argenté	40		337	75			11	463
Grand Gravelot	40		255	2/3000	50/100		57	2402/ 3452
Gravelot "Alex"			4					4
Tournepierrre	+		443	30	120		30	623+
Courlis Cendré	70		343					396
Barge Rousse	5		24				1	30
Ch. Gambette			309		20/30			329/339
Ch. Stagnatile			1					1
Ch. Guignette	5		1				30	36
Bec. Maubéche	30		30					60
Bec. Violet	30		194		5		19	218
Bec. Variable	300	150	2880	6/8000	54		75	9463/ 11463
Bec. Sanderling	250		230	50	20		2	552
Vanneau Huppé			2600					
Pluvier Doré	300 +	+	10	75				

Total "Limicoles" hors Vanneaux Huppés et Pluviers Dorés : 15 196 / 18 256

DECOUPAGE DE LA ZONE LITTORALE COUVERTE
PAR AR VRAN / 29 S



1 SECTEUR DE DOUARNENEZ

baie de Douarnenez et pointe du Raz

2 SECTEUR D'AUDIERNE

baie d'Audierne

3 SECTEUR SUD-BIGOUDEN

de la pointe de la Torche à Loctudy, rivière de Pont l'Abbé

4 SECTEUR DE BENODET

de l'île Tudy à Beg Meil, baie de Kerogan

5 SECTEUR DE CONCARNEAU

de Beg Meil à la pointe de Trevignon

6 SECTEUR DE PONT-AVEN

de la pointe de Trevignon à Moëlan

7 SECTEUR DE QUIMPERLÉ

de Moëlan à Douëlan

II RESULTAT DU RECENSEMENT "CANARDS" DE JANVIER 1982
 LE LONG DU LITTORAL DU SUD-FINISTERE

Liste des observateurs et découpage de la zone recensée:

Même chose que pour les resultats du recensement "Limicoles"

Resultat du recensement par zones:

	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Pl. arctique	5		1	7	7		3	23
Pl. imbrin	13			3	2			18
Pl. catmarin	12						4	16
Plongeon SP.	8			5			1	14
Gr. huppé	6		2		19		3	30
Gr. jougris					1		1	2
Gr. esclavon	3	1	2	2	2		2	12
Gr. à cou noir		1	5		8		2	16
Gr. castagneux			19		10		1	30
Grébe SP.	6			1				7
Gd cormoran	100	20	150	100/200	40		1	411/511
Heron cendré	17		71		19			107
Spatule blche			4					4
Cygne tuberculé		1			1		1	3
Oie cendrée		5						5
Oie "grise"	17							17
Bernache crvt			355					355

	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Tadorne de Bel.			400	121			1	522
Can. colvert		25	167	40	4		500	736
Sar. d'hiver		20	200				24	244
Can. chipeau			8				4	12
Can. siffleur			1300				20	1320
Can. pilet			30				5	35
Can. souchet		18	2				5	25
Ful. milouin		100		50/100			4	154/204
Ful. morillon		163	32	5/600	10		6	711/811
Ful. milouinan			8					8
Eider à duvet	23		16	15				54
Macreuse noire	450/500						1	450/500
Macreuse brune	9							9
Garrot oeil d'or			1		10			11
Harle huppé			48	36	14		1	99

La Rivière constitue un site sud-finistérien important d'hivernage pour les Limicoles et pour les "Canards". Aussi profiterons nous de ces quelques pages pour faire une description rapide et sommaire de son statut.

1) Description de la Rivière:

C'est un estuaire compris entre Pont-l'Abbé d'une part, et Loctudy et l'Ile-Tudy d'autre part. Il couvre une surface approximative de 450 ha. dont un tiers est en Réserve de Chasse Maritime depuis le 25 juillet 1973.

La présence de la mer littorale en fait un estran vaso-sablonneux avec des herbiers à zostères.

2) Limicoles hivernants et leurs effectifs en jan. 82

Huitrier Pie	42	Ch. Stagnatile	1
Pluvier Argenté	250	Ch. Guignette	1
Grand Gravelot	10	Bec. Maubé che	30
Courlis Cendré	300	Bec. Variable	2/3000
Barge Rousse	20		
Ch. Gambette	200		

3) "Canards" hivernants et leurs effectifs en jan. 1982

Gr. Huppé	2	C. Chipeau	2
Gr. à cou noir	5	C. Siffleur	1300
Gr. Castagneux	12	C. Pilet	30
Grd Cormoran	10	C. Souchet	2
Heron Cendré	65	F. Morillon	32
Spatule Blche	4	F. Milouinan	8
Bernache Crvt	350	Harle Huppé	15
Tadorne de B.	400		
C. Colvert	50		
Sarcelle d'h.	200		

4) A propos de Chevalier Stagnatile (Tringa stagnatilis)

L'espèce a été observée à 2 reprises cet hiver, par 2 observateurs différents, ce qui rend probable l'hivernage d'un indi-

-vidu en Rivière de Pont-l'Abbé:

1 ind. le 17/01/82

1 ind. le 14/02/82

Nous rappellerons ici les données de Chevalier Stagnatile en Bretagne (données "Ar Vran", recherchées par A. THOMAS):

1 ind. le 04/10/69 sur le réservoir de Vioreau (44)

1 ind. à Goulven le 21/08/70

1 ind. dans le Golfe du Morbinan le 21/09/70

1 ind. à Séné (56) le 30/04/71

1 ind. à Vioreau (44) le 31/10/72

1 ind. dans les marais de Guérande (44) les
19/08/73 et 10,12,22/09/73

1 ind. en baie d'Yffiniac (22) le 16/11/75

1 ind. à Goulven le 01/09/77

2 ind. en Rivière de Pont-l'Abbé le 01/09/80

IV LA MER BLANCHE EN FOUESNANT

Durant la période de recensement de janvier une forte concentration de Limicoles a pu être observée en Mer Blanche (Fouesnant). Les quelques 2 à 3000 Grands Gravelots (*Charadrius hiaticula*) se trouvaient parmi une concentration de 8 à 10 000 Limicoles, essentiellement constituée de Becasseaux Variables (*Calidris alpina*). Cette concentration représente une observation tout à fait remarquable, d'autant que l'estimation faite à marée haute a permis un maximum de précision. Sans doute s'agit-il là de mouvements à mettre en relation avec la vague de froid du début de janvier.

Estimation de l'eff. français d'après les données de jan. 1980	Estimation de l'effectif	
	"Breton jan. 80"	Sud-Fin. jan. 80
		16
2750	Sud-Fin. jav. 82	2353
	1450	2353

tableau réalisé d'après l'ouvrage de R. MAHEO "Inventaire des Limicoles hivernant en France en janvier et mars 1980".

Michel COSSEC
60, rue de la Marine
29 115 LE GUILVINEC

Bernache cravant Saison 1981/82

localité	octo	nove	dece	janv	fevr	mars
Bassin d'Arcachon	0	1500	5000	5000	5000	
Bonne Anse			640	850		
Oléron-Marennes	1950	9400	9004	8450		
Baie d'Yves		3200	2500	980		
Ile de Ré		9450	8500	9000		
Baie de Aiguillon-Arçay	0	77	200	328	352	
Baie de Bourgneuf	0	2700	4000	2850	1471	
Traicts du Croisic		480	1000	890		
Estuaire Vilaine	120	1040	2000	520	440	
Golfe du Morbihan	1480	17000	9400	1600	460	
Baie de Quiberon	0	45	980	370	130	
Mer de Gâvres			25			
Rivière de Pont l'Abbé			87	350	2	
Baie de Goulven	1	140	240	364	260	
Estuaire Penzé	28	400	400	600		
Baie de Morlaix			85	175		
Estuaire Jaudy					410	
Estuaire Trieux					240	
Baie de Paimpol	0	80	300	150	290	
Anse d'Yffiniac	105	320	1550	3160	2600	
Baie de St Jacut/Rance	32	180	571	680	347	
Baie du Mont St Michel	21	340	1350	2400	2000	
Iles Chausey				92		
Hâvres côte W Cotentin				135		
Baie des Veys	400	2	90	72		

coordination : Roger Mahéo

Station Biologique
de l'Ile Bailleron
56860 Séné

NOTE SUR L'HIVERNAGE D'UN MILAN ROYAL (Milvus milvus)
DANS LE SUD-FINISTÈRE (Hiver 80/81)

Oiseau rarement observé dans l'Ouest de la Bretagne jusqu'à ces dernières années où seulement quelques individus ont été notés lors des migrations, un immature de cette espèce a, par contre, passé l'hiver 80-81 dans le sud-Finistère, plus exactement à Kerminaouët en TREGUNC, près de Concarneau.

Je l'ai personnellement observé à 12 reprises entre le 10 novembre 1980 et le 31 janvier 1981 (10/11/80; 6/12/80; 7/12/80; 9/12/80; 24/12/80; 28/12/80; 04/01/81; 17/01/81; 18/01/81; 19/01/81; 24/01/81; 31/01/81.)

L'oiseau chassait surtout par beau temps (vu seulement 2 fois par temps gris ou pluvieux), et rarement avant 10-11 h. du matin, sur un domaine de 100 hectares environ, mêlé de bois (40 ha.), bocage, jeunes plantations de sapins et de terres cultivées (40 ha. environ). La plus proche décharge se situe à 1 km. (à vol d'oiseau) mais je ne l'y ai jamais vu! En chasse, il décrivait des orbites beaucoup plus importantes que le Milan Noir, que j'ai pu observer dans les Vosges en juillet 80. Chez l'individu en question, la queue ressemblait à celle d'un Milan Noir, et ne formait un V net qu'une fois quasiment fermée. Par contre les tâches blanchâtres visibles sous les ailes du Milan Royal frappèrent l'œil immédiatement et étaient sans commune mesure avec celles que l'on peut trouver chez le Milan Noir immature.

Ce Milan Royal était si peu farouche que je l'ai vu, le 24 décembre 80, se perchait "royalement" sur le tas d'ensillage de la ferme de Kerminaouët (à 30 m. des bâtiments de la ferme) en train de manger un restant de délivrance de vache.

En conclusion, la présence de ce Milan Royal en hiver dans le Sud-Finistère n'est peut-être que la conséquence d'un retour de l'espèce en France, et un début d'hivernage régulier en Bretagne. Il est à noter au passage que l'oiseau n'a pas été tiré par les chasseurs, alors qu'il y a une forte pression de chasse sur ce domaine. Est-ce une reconnaissance de l'utilité de l'espèce et des Rapaces en général, ou bien le fait de voir pour la première fois l'espèce à Trégunc? Pourtant, dans ces cas là, les chasseurs ont plutôt tendance à tirer!

Roland PERON
Beg-Postillon
29 128 - TREGUNC

Informateurs:

CAHEVET Paul; COSSEC Michel; PERON Roland.




Les données reçues concernent:

- 1 Canard colvert (Anas platyrhynchos)
- 4 Grands cormorans (Phalacrocorax carbo)
- 2 Cormorans huppés (Phalacrocorax aristotelis)
- 1 Goeland brun (Larus fuscus)
- 2 Petits pingouins (Alca torda)

BAGUE	ESPECE	SEXE - AGE STATUT	BAGUAGE	REPRISE	CONDITIONS DE REPRISE	BAGUEUR	INFORMATEUR
41001 0239 plaque alaire métallique rouge	Anas p acyrhynchos canard colvert huppé	2 ? volant (élevé)	01.06.1981 Lowestoft Suffolk Angleterre	21.12.1981 Trégunc Finistère France	Canard colvert é levé par chasseur	Roland Peron, 29120 Trégunc	29120 Trégunc
10000 5 081 884	Phalacrocorax carbo Grand cormoran	? poussin	27.06.1981 St Margaret's Island, Tenby Dyfed Pays de Galles	01.12.1981 (lettre du 08.12.81) Belle d'Andernne Finistère France	? Preprise - n° de la base transmise à M. Cossec	Michel Cossec, 30 rue de la Prairie 29115 Le Gullivnac	29115 Le Gullivnac
				47.57 N 4.28 W 410 km			

Veuillez nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

BAGUE	LONDON 5 108 039 	LONDON 5 106 168 	LONDON 5 081 900 
ESPECE	Phalacrocorax carbo Grand cormoran	Phalacrocorax carbo rand cormoran	Phalacrocorax carbo Grand cormoran
SEXE - AGE STATUT	? poussin	? poussin	? poussin
BAGUAGE	27.06.1981 St Margaret's Island, Tenby Dyfed Pays de Galles 51.38 N 4.42 W	31.05.1981 Little Saltee Dorset Angleterre 52.07 N 6.35 W	27.06.1981 St Margaret's Island, Tenby Dyfed Pays de Galles 51.38 N 4.42 W
REPRISE	07.07.1981 (lettre du 27.10.81) baie d'Audierne Finistère France 47.57 N 4.28 W 410 km	25.10.1981 baie d'Audierne Finistère France 47.57 N 4.28 W 410 km	25.10.1981 baie d'Audierne Finistère France 47.57 N 4.28 W 410 km
CONDITIONS DE REPRISE	Cormoran trouvé noyé dans un filet de pêche par un marin	Cormoran trouvé noyé dans un filet de pêche par un marin	Cormoran trouvé noyé dans un filet de pêche par un marin
BAGUEUR	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine
INFORMATEUR	29115 Le Guilvinic	29115 Le Guilvinic	29115 Le Guilvinic

Veuillez nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

BAGUE	PARIS CF 21 128 + bagues en couleur	PARIS CF 21 116 + bagues en couleur	PATTE DROITE: ROUE VERT PÂLE PATTE GAUCHE: Noir METAL
ESPECE	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> Cormoran huppé	<i>Larus fuscus</i> Goéland brun
SEXE - AGE STATUT	? poussin	? poussin	? adulte + d'un an
BAGUAGE	01.06.1981 Milinau - <u>Goulien</u> Finistère France 48.03 N 4.36 W	30.05.1981 Karreg Kara/ <u>Co Ue</u> Finistère France 48.03 N 4.36 W	18.05.1981 Stirling Refuse tip (décharge) arrowmeadow, <u>Stirling</u> Ecosse 50.07 N 5.50 W
REPRISE	01.09.1981 (lettre du 27.10.81) baie d'Audierne Finistère France 47.57 N 4.28 W	24.09.1981 (lettre du 27.10.81) baie d'Audierne Finistère France 47.57 N 4.28 W	19.08.1981 (lettre du 27.10.1981) Plover Finistère France 47.50 N 4.17 W
CONDITIONS DE REPRISE	Cormoran L: 72 env. 110 trouvé noyé dans un filet de pêche par un marin	Cormoran - L: 66 env. 100 trouvé noyé dans un filet de pêche par un marin	Goéland brun contrôle à vue
BAGUEUR	J.Y. Monnet	J.Y. Monnet	Dr. P. Monaghan, Dept of Zoology Univ of Glasgow
INFORMATEUR	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine 29115 Le Guilvinec	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine 29115 Le Guilvinec	M. Michel Cossec, 60 rue de la Marine 29115 Le Guilvinec

Veuillez nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

NUMERO	LONDON N 36 921		LONDON N 25 256
ESPECE	Alca torda Petit pingouin		Alca torda Petit pingouin
SEXE - AGE STATUT	7 poussin		7 poussin
LANGAGE	28.06.1981 Fair Isles Ecosse		26.06.1981 Skomer Dyfed Pays de Galles
REPRISE	01.12.1981 (lettre du 03.12.81) bale d'Audierne Finistère France		17.10.1981 bale d'Audierne Finistère France
CONDITIONS DE REPRISE	? Epervier - n° de 1: bagués français à N. Corsec		? pingouin (bordage?? pris dans un filet de pêche
BAGUEUR			
INFORMATEUR	Michel Corsec, 29 rue de la République 29115 L. Ulliviane		Michel Corsec, 29 rue de la République 29115 L. Ulliviane

Veuillez nous signaler S. V. P. toute erreur constatée sur cette fiche

Epervier d'Europe (Accipiter nisus)

Un oiseau mort a été trouvé à proximité de Ploneour-Lanvern (29 120 Pont-l'Abbé) par un garde de chasse, au début de cette année. L'Epervier avait été bagué à la station biologique d'Heligoland. Les coordonnées du baguage ne nous sont pas encore revenues.


JOURNEE EUROPEENNE DE RECENSEMENT DES OISEAUX MARINS ECHOUES
RESULTAT DU RECENSEMENT BUD-FINISTERIEN DES 27 ET 28/02/1982

La S.E.P.N.B. et AR VRAN organisent ce recensement sur l'ensemble des côtes bretonnes, dans le cadre du recensement européen coordonné par le R.S.P.B. (Société royale pour la protection des Oiseaux/Grande Bretagne)

Le tableau récapitulatif des résultats obtenus peut être consulté à la page suivante.



La synthèse de ce recensement paraîtra dans le numéro d'avril ou de mai du bulletin de liaison de la S.E.P.N.B.



Alain THOMAS
Kernelbet KERLAZ
29 100 DOUARNENEZ

	Pétrel Culblanc	Fou de Bassan	Grand Cormoran	Cormoran Huppé	Limicole SP	Grand Labbe	Goel. Marin	Goel. Brun	Goel. Argenté	Mouette rieuse	Mouette Tridac.	Laridé SP	Ping. Torda	Mergule Nain	Guil. de Troil	Macareux Moine	Alcidé SP	Divers	TOTAL	Km.	N/Km.	N. maz.	% maz.	
Presqu'île de CROZON	1 ¹	1 ¹			1				1	1	1	1	3 ³		4 ²		1		10	14	0,7	6	60	
Baie de DOUARNENEZ		1 ¹							1	1	2 ¹	3	4	3	3			1 ¹	17	7,7	2,2	2	12	# Grand Carbeau 1 Globicephale
Cap Sizun									1				5 ¹	2 ²					8	5,7	1,4	3	37,5	
Baie de LAUDIERNE	1	3 ¹		1		2		2	2	4 ¹	5 ²	4	13 ¹	10 ⁵	2				4,9	18	2,7	13	26,5	1 Narvaire 3 Dauphins S.P.
Isle d'Yeu		1	3 ¹	3 ¹	1		2 ¹	2	9 ²		5 ⁵	3 ²	5 ³	1	5 ²	3 ²		1	4,4	20	2,2	20	45,4	1 Phoque gris
Isle de MOUDET			1								1 ¹			1 ¹					3	6	0,5	2	66,6	
Plages de TREGUNC			2 ²					1					4 ¹	1 ¹					8	4	2	7	87,5	
TOTAL	1	6 ³	6 ¹	4 ¹	2	2	2 ¹	5	13 ²	5 ¹	12 ¹	12 ³	34 ⁵	1	26 ¹²	5 ²	1	2	139	75,4	1,8	52	37,5	

1. Résultats généraux : 259,15 km ont été couverts cette année contre 338,4 en 1981. 80 personnes environ ont participé à l'opération.

Nombre d'oiseaux recensés: 261 / Nombre d'individus mazoutés: 69.

Soit 1 cadavre / km et 26,4 % de mazoutés.

2. Comparaison avec les résultats des années précédentes: (N/km, % maz., Nmaz./km)

1980	1,88	50,7 %	0,94
1981	1,2	34 %	0,41
1982	1	26,4 %	0,27

Soit une baisse progressive du % d'oiseaux mazoutés depuis 3 ans.

3. Résultats par secteurs:

Secteur prospecté	N km	N ind.	N maz.	N/km	%/Total	% maz.
Baie du Mont Saint-Michel	9.25	38	0	4.1	14.5	0
Saint-Malo / Paimpol	35.80	12	1	0.3	4.6	8.3
Trégor	25.00	12	0	0.5	4.6	0
Baie de Morlaix / Léon	89.00	28	11	0.3	10.7	39.3
Presqu'île de Crozon / Odet	65.40	128	44	1.9	49.0	34.4
Odet / Presqu'île de Quiberon	26.50	38	12	1.4	14.5	31.6
Mor-Bras	8.20	5	1	0.6	1.9	20.0

4. Résultats par espèces:

	Fou	GC	CH	Anas	Limi	GLab.	GM	GB	GA	MR	MT	Lar.sp	PP	GT	MN	MM	Alc.sp
N	8	7	5	11	16	4	4	6	37	18	15	16	47	41	1	10	6
%	3	2.6	2	4.2	6.1	1.5	1.5	2.3	14	6.8	5.7	6.1	18	15.6	0.3	4	2.3

Remarques: 1. L'ensemble des laridés trouvés (96) constitue 36,8 % du total des cadavres recensés (38 % en 1981).

2. L'ensemble des alcidés trouvés (105) constitue 40,2 % du total (41 % en 1981).

3. Le pourcentage d'individus mazoutés chez les alcidés est de 40,9 % contre 68 % en 1980 et 74 % en 1981.

4. Parmi les autres espèces trouvées, à signaler un pétrel cul-blanc, un grand corbeau et un blaireau (non compté dans le total, of course).

LES RESULTATS DE CETTE ENQUETE SERONT PUBLIES DE FACON PLUS DETAILLEE DANS UN PROCHAIN NUMERO DE PENN AR RED. Informez toujours, SVP, les participants à cette enquête au moyen de cette circulaire.

NOTES D'ORNITHOLOGIE BRETONNE

- PUFFIN DES ANGLAIS : Après la découverte d'un nid en 1978, ce sont 40 couples qui ont été localisés aux Sept-Iles (22) en 1981; un couple a également été trouvé à Taveeg / Perros - Guirec (22) en 1981.
- GRAND CORMORAN : Installé au Verdelet / Pléneuf (22) depuis 1980; 10 couples en 1981. 7 couples au moins ont niché à Grand Lieu (44) en 1981.
- HERON CRABIER
HERON GARDE-BOEUF
SPATULE BLANCHE } Reproduction probable ou certaine à Grand-Lieu en 1981.
- BERNACHE NONNETTE : En baie du Mont St-Michel, 2 le 2 octobre 1981 et 4 le 23 janvier 1982.
- HARLE PIETTE : 2 femelles à l'étang du Pas-du-Houx / Paimpont (35) le 15 janvier 1982.
- TADORNE : 1 à l'étang de Comper / Concoret (56) le 13 janvier 1982.
- ERISMATURE ROUSSE : 2 femelles le 21 décembre 81; 1 mâle et 1 femelle le 24 janvier 81 à Brech (56).
- MILAN ROYAL : 1 le 8 avril 1981 au Cap Sizun (298); 1 le 12 avril 1981 près de Caulnes (22) et 1 le 22 février 1982 à Liffré (35).
- MILAN NOIR : 1 le 4 juin 1981 à Langourla (22); 1 couple pendant le printemps 1981 à Montauban (35).
- CIRCAËTE : 1 le 4 juin 1981 à Boquen (22).
- FAUCON PÈLERIN : 1 le 27 avril 1981 en baie du Mont St-Michel (35).
- FAUCON HOBEREAU : 1 le 28 mars 1981 en baie du Mont St-Michel (35).
- GUILLEMOT À MIROIR : 1 le 20 février 1982 à Landéda (29N).
- PIC NOIR : 1 le 9 avril 1981 à Corbinières / Guipry (35).
- GUËPIER : 3 couples tout au long du printemps, des terriers creusés et une tentative infructueuse de reproduction à Plougastel (29N) en 1981.
- ROUSSEROLLE TURDOÏDE : 1 chanteur observé les 1er, 5 et 13 juin 1981 à l'étang de la Tournerais / Goven (35).

- FAUVETTE BABILLARDE : Plusieurs chanteurs notés à trois semaines d'intervalle en juin 1981 à la pointe du Meinga / la Guimorais (35); 1 ind alarmant près de Blinc (22) en juillet 1981.
- BRUANT FOU : 1 mâle le 7 avril 1981 à Tréguier (22).
- GRAND CORBEAU : 1 couple nourrit le 5 avril 1981 à Etables (22).

Ont participé à ces notes : Jean-Pierre Cochin, J.P. Coco, Michel Ittelet, Thierry Thomas, L. Thébaud, G. Gélinaud, P. Boudarel, Joseph Le Lannic, Vincent Schricke, P. Boisneau, C. Ménesson, Bernard Le Garff, Jacques Henry, Jean-Yves Monnat, Yves Chépeau, Fañch Pustoc'h et d'autres observateurs de Loire-Atlantique et des Côtes-du-Nord, Loïc Marion et Jacques Maout.

liste des numéros d'Ha Vicin

encore disponibles

(10 F le numéro)

Tome	fascicule	nombre d'exempl.	ARTICLES
I	4	16	statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne - IV côtes Nord du Finistère par J.P. L'HARDY - V La Loire atlantique par J. BAUDOUIN-BODIN Actualités ornithologiques du 15 Mars au 15 Juillet 69
II	3	6	Observations ornithologiques en Atlantique Nord durant les années 1964, 1966, 1967 et 1968. Actualités ornithologiques du 15 Novembre au 15 Mars 1969 (Fin) Bibliographie ornithologique bretonne.
II	4	14	Linotte mélodieuse en Bretagne méridionale: essai d'interprétation des observations et résultats de bagage. Nidification du Hibou moyen-duc dans la région de Langonnet. Actualités ornithologiques du 16 Mars au 15 Juillet 69
IV	2	29	Nidification du Herle à plastron dans les Tjonts d'Arée Remarques à propos de l'observation estivale de Nouvelles pygmées immatures sur le littoral du Finistère Actualités ornithologiques du 16 Novembre au 15 Mars 71 Problèmes posés par les actualités ornithologiques.
IV	3	56	Trise au point sur l'extension de la bourscaule de Cetti (Cettia Cetti) en Bretagne. Actualités ornithologiques du 16 Mars au 16 Juillet 71
IV	4	26	Quinze ans de baguage à Guessant. II interprétation par espèce. Actualités Ornithologiques du 16 Juillet au 15 Novembre 71
V	2	6	Actualités ornithologiques du 16 Mars au 15 Juillet 72 Bibliographie ornithologique bretonne.
V	3	3	Dispersion hivernale du Gâtaud argenté sur le littoral atlantique de l'estuaire de la Loire au pays basque Observation en milieu pélagique du Galf de Gascogne à l'Irlande au cours de l'été 1970. Actualités ornithologiques du 15 Mars au 15 Juillet 72 (suite)
V	4	44	Actualités ornithologiques du 16 Juillet au 15 Novembre 72.
VI	1	15	Statut actuel des oiseaux marins nicheurs de Bretagne IX Procellariiformes. Actualités ornithologiques 16 Novembre 72 au 15 Mars 73
VI	2	76	Actualités ornithologiques du 16 Mars au 15 Juillet 73 Premières nidifications du Fuligule Morillon en Bretagne

VI	3	15	Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne X Pelecaniformes Recherches sur l'écologie des oiseaux. I L'avi-faune nicheuse dans une plantation de résineux de la forêt de Paimpont.
VI	4	111	La Rousserolle verderolle niche-t-elle en Bretagne? Actualités ornithologiques du 16 Juillet au 15 Novembre 73
VII	1-2	107	La Gorgebleue nicheuse en Bretagne. Actualités ornithologiques du 16 Novembre 73 au 15 Mars 74
IX		57	Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. Limicoles. La Trauette mélanocéphale en Bretagne. Hivernage et alimentation d'oiseaux insectivores. Le Bécasseau variable a niché en Bretagne. Nidification du grand corbeau dans l'intérieur du Léon. Prédation de Cormorans huppés par un goéland marin.